

Más de 5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo

EDICIONES  
OMEGA

MANUALES DE IDENTIFICACIÓN


# INSECTOS

ARAÑAS Y OTROS ARTRÓPODOS TERRESTRES

La guía visual más clara y precisa para conocer e identificar más de 300 familias de insectos y otros artrópodos

Contiene más de **650 fotografías e ilustraciones** de una asombrosa claridad, con anotaciones concretas para que la identificación sea segura y sencilla

Un texto conciso y **sin científismos** indica con todo rigor las características clave de cada familia y da una **información rápida y accesible**



EDICIONES  
OMEGA, S.A.

MANUALES DE  
IDENTIFICACIÓN

INSECTOS

ARAÑAS Y OTROS  
ARTRÓPODOS TERRESTRES

EDICIONES  
OMEGA

MANUALES DE  
IDENTIFICACIÓN

# INSECTOS

ARAÑAS Y OTROS ARTRÓPODOS TERRESTRES

George C. McGavin



Esfécido



Insecto hoja



Crisomélido



Erésido



Mosca cernidora



Cercópido




Cigarra



Mutílido





—MANUALES DE—  
IDENTIFICACIÓN

# INSECTOS

ARAÑAS Y OTROS ARTRÓPODOS TERRESTRES

GEORGE C. MCGAVIN



*Fotografías de*  
**STEVE GORTON**

*Asesor editorial*  
**WILLIAM FOSTER**  
*Universidad de Cambridge*



**EDICIONES OMEGA, S.A.**  
BARCELONA





A DORLING KINDERSLEY BOOK

La edición original de esta obra ha sido publicada en inglés con el título  
*INSECTS, SPIDERS AND OTHER  
TERRESTRIAL ARTHROPODS*

Traducido por Manuel Pijoan

Director del proyecto Peter Frances  
Director artístico del proyecto  
Vanessa Hamilton

Jefe de producción Michelle Thomas  
Diseñador DTP Robert Campbell  
Búsqueda de ilustraciones Andy Sansom  
Gerente de edición Jonathan Metcalf  
Gerente artístico de edición Bryn Walls



Director Ann Kay  
Director artístico Sharon Rudd

Copyright © 2000  
Dorling Kindersley Limited, London  
Text copyright © 2000 George C. McGavin  
y para la edición española  
Copyright © 2000  
Ediciones Omega, S.A., Barcelona



## ÍNDICE

### INTRODUCCIÓN • 6

- Introducción del autor 6
- Cómo utilizar este libro 9
- ¿Qué es un artrópodo? 10
- ¿Qué es un insecto? 12
- ¿Qué es un arácnido? 16
- ¿Qué es un crustáceo? 18
- ¿Qué es un miriápodo? 19
- Ciclo vital 20
- El sistema sensorial 24
- Alimentos y alimentación 26
- Comportamiento 28
- Insectos sociales 30
- Hábitats 32
- Estudiar los insectos 34
- Clave de identificación 36



### INSECTOS • 46

- Arqueognatos 46
- Pececillos de plata 47
- Efemeras 48
- Caballitos del diablo y libélulas 51
- "Moscas" de las piedras 56
- Grilloblátidos 59
- Grillos y saltamontes 60
- Insectos palo e insectos hoja 66
- Tijeretas 69



- Mántidos 71
- Cucarachas 74
- Tejedores 77
- Termes 78
- Zorápteros 80
- Psocópteros 81
- Piojos 83
- Chinches, cigarras y afines 85
- Trips 101
- Megalópteros 103
- "Moscas" serpiente 104
- Hormigas león, crisopas y afines 105
- Escarabajos 109
- Estrepsípteros 132
- "Moscas" escorpión 133
- Pulgas 135
- Mosquitos y moscas 136
- Frigáneas 156
- Mariposas 158
- Abejas, avispas, hormigas y avispas  
portasierra 178



### HEXÁPODOS NO INSECTOS • 207

- Colémbolos 207
- Proturos 210
- Dipluros 211



### CRUSTÁCEOS • 212

- Isópodos 212

### ARÁCNIDOS • 213

- Escorpiones 213
- Pseudoescorpiones 215
- Solífugos 217
- Uropigios 219
- Amblipigios 220
- Opiliones 221
- Garrafas y otros ácaros 223
- Arañas 228



### MIRIÁPODOS • 238

- Paurópodos 238
- Sínfilos 239
- Ciempíes 240
- Milpiés 242



Glosario 244

Índice alfabético 246  
Agradecimientos 256



## INTRODUCCIÓN DEL AUTOR

*Los insectos son los animales más numerosos de la Tierra. Pertenecen a un grupo de invertebrados, los artrópodos, caracterizados por sus extremidades articuladas, cuerpos segmentados y esqueletos externos duros.*

*Desempeñan un papel esencial en todos los ecosistemas del planeta. Aunque son menos conspicuos que otros animales, su variedad es increíble y su vida extraordinaria.*

LOS PRIMEROS SIGNOS de vida fueron organismos unicelulares que vivieron en los océanos hace unos 3.500 millones de años. Luego aparecieron en el mar las medusas, los gusanos más simples y otros animales multicelulares, seguidos por otros que tenían la parte exterior dura, como los crustáceos y los trilobites: los artrópodos primitivos. Estos artrópodos primitivos fueron los primeros que emergieron a tierra firme como detritívoros hace unos 420 millones de años, acaso para escapar a los depredadores. A medida que las plantas terrestres se hicieron más complejas, dieron espacio vital y recursos para el creciente número de artrópodos.

Hoy los invertebrados (sin espina dorsal) forman casi todas las especies conocidas; los vertebrados (con espina dorsal) suman menos del 3%. Dentro de los invertebrados, el inmenso grupo de los artrópodos eclipsa a los otros, y los insectos, a su vez, son el grupo dominante entre los artrópodos. Se estima que han existido unos 10 trillones—10.000.000.000.000.000—de insectos en la historia de este grupo.

### ¿PLAGAS INOPORTUNAS?


Las personas que viven en ciudades suelen considerar los artrópodos plagas molestas. Es cierto que algunos son destructores. Se estima que casi el 20% de los cultivos destinados al consumo son devorados por insectos herbívoros. Los insectos también transmiten enfermedades que afectan a los animales y al hombre—una de cada seis personas vivas hoy está afectada por una enfermedad transmitida por un insecto—. El veneno de algunos

### Δ▷ EVOLUCIÓN

Las libélulas modernas evolucionaron a partir de especies que empiezan a aparecer en los fósiles de hace unos 250 millones de años. Libélulas muy primitivas volaban por las frondosas selvas del carbonífero hace unos 300 millones de años.

• esta libélula moderna es similar a las formas primitivas

• fósil con 150 millones de antigüedad en caliza litográfica



artrópodos puede ser mortal y muchas personas sufren fobias con grupos como las arañas y las mariposas nocturnas.

### ¿BENEFICIOS REALES?

La mayoría de los artrópodos son inofensivos. Menos del 1% de las especies de cucarachas son plagas. Muchas personas pasan por alto los beneficios que aportan los insectos. Los productos útiles derivados de ellos incluyen miel, seda, ceras, aceites, medicinas naturales y pigmentos.

### CONTROL DE PLAGAS


Los insectos depredadores pueden ayudar a controlar otras especies dañinas. Las mariquitas, depredan especies de cuerpo blando como los pulgones.



• mariquita que trepa por la vegetación para encontrar pulgones

### CAMBIAR EL CURSO DE LA HISTORIA

Los insectos transmisores de enfermedades han dejado una profunda impronta en la historia. Tres epidemias de peste bubónica, transmitida por las pulgas, mataron millones de personas. Hasta el uso de los insecticidas en la segunda guerra mundial, morían dos veces más personas por esta causa que en el campo de batalla. La mayoría de los soldados de Napoleón, murieron del tifus transmitido por el piojo humano en 1812 en Rusia. A finales del siglo XIX, la fiebre amarilla transmitida por los mosquitos mató a 20.000 trabajadores en las obras del canal de Panamá.



### MALARIA LETAL

Se estima que la malaria, una enfermedad que es transmitida por ciertos mosquitos, mata a un ser humano cada 12 segundos.



## EQUILIBRIO NATURAL

Los artrópodos ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas y de las cadenas alimentarias. Éstos son complejos entramados que dependen de la energía del sol. La energía es "captada" por las plantas verdes y convertida en carbohidratos, que luego ingerirán los herbívoros y transformarán en tejidos corporales. Éstos son devorados por los carnívoros. La mayoría de las cadenas alimentarias depende de los insectos ya que casi todos los animales comen insectos para sobrevivir y muchos de ellos no existirían sin ellos. Las aves son en su mayoría insectívoras. Un solo pollo de golondrina puede consumir unos 200.000 escarabajos, chinches y moscas antes de plumarse, y las especies de aves que se alimentan de semillas dan a sus crías una dieta nutritiva rica en insectos.

Los excrementos animales sirven de alimento a ciertos escarabajos y moscas, y muchos insectos comen materia en descomposición. Así, los insectos mantienen en circulación el suministro de nutrientes de la Tierra. Por último, aunque los insectos causan

## ▷ POLINIZADORES

*Sin polinizadores vitales como las abejas, muchas plantas no podrían producir frutos y semillas y por tanto reproducirse.*

## Δ▷ PLAGAS DE INSECTOS

*Las enfermedades vegetales transmitidas por insectos causan daños como el que se muestra a la derecha. Un enjambre de Langostas peregrinas (arriba) puede contener hasta 50 mil millones de individuos, que podrían ingerir hasta 100.000 toneladas de comida al día.*

- *lengua larga para capturar insectos*

## DEPREDADOR EN ACCIÓN

*Las cadenas alimentarias dependen de los insectos. Las ranas, en su mayor parte insectívoras, son cazadas por depredadores más grande.*

graves daños a los cultivos, también pueden controlarlos. Al menos un 25% de las especies de insectos son parásitos o depredadores de otros insectos, y algunas se crían para controlar las plagas agrícolas.

## UN MUNDO DE INSECTOS

Con unas 1.500 familias de artrópodos terrestres, sería imposible incluirlos todos en este libro. Hemos escogido una amplia gama de familias de todo el mundo por su importancia, su abundancia o sus particularidades.



## CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO

ESTE LIBRO SE divide en 41 secciones, cada una de las cuales cubre un orden de artrópodos terrestres. Éstas se subdividen en fichas en las que se describen las características de una familia con fotografías de especies representativas. Las fichas están

ordenadas alfabéticamente según el nombre científico. Algunas de las secciones de órdenes están subdivididas alfabéticamente; ello se explica en la introducción al orden. La página que aparece bajo estas líneas muestra una ficha de familia.

nombre común de la familia

112 • INSECTOS

nombre científico de la familia

nombre científico de la familia

número total de especies conocidas en la familia

Orden: COLEOPTERA	Familia: CARABIDAE	N.º de especies: 29,000
-------------------	--------------------	-------------------------

**CARÁBIDOS**

Alargados y algo planos, pueden ser apagados o brillantes; suelen ser pardos o negros, a menudo con un brillo metálico. La cabeza, el tórax y el abdomen tienden a estar bien diferenciados, y los élitros suelen tener estrías muy visibles. La mayoría son caradores nocturnos.

• **CICLO VITAL.** Ponen sus huevos en el suelo, en la vegetación, en la madera en descomposición o en hongos. Aparte de cazar, las larvas comen caraña; unas pocas especies son parcialmente herbívoras.

• **DISTRIBUCIÓN.** Cosmopolitas. En el suelo, bajo piedras y troncos caídos, entre detritus y hojarasca. Algunas especies viven en el follaje de arbustos y árboles.

• **OBSERVACIÓN.** Unas pocas especies disuaden a los depredadores con chorros de sustancias calientes y clásticas que expulsan por el extremo del abdomen.

**ANATOMÍA Y CARACTERÍSTICAS:**

- mandíbulas oscuras, serradas y en forma de pala
- patas amarillentas en las expansiones del tronco
- estomas muy largos y filiformes
- mandíbulas afiladas y curvas
- patas largas y delgadas para correr con rapidez

**ESPECIES DESTACADAS:**

- ANTHRA THORACICA:** es un depredador que vive en el suelo. Como es típico del género Anthra, pulveriza a sus agresores con sustancias químicas defensivas.
- MORPHOLEX PHYLLOIDES:** o Escarabajo violín, vive en los bosques del sudeste de Asia y se alimenta de larvas y de caracoles.
- MEGACEPHALA AUSTRALIS:** tiene una coloración brillante y metálica. Caza después del ocaso, como todas las especies de Megacephala.

**CLAVE DE LOS SÍMBOLOS DE ALIMENTACIÓN**

Para una explicación más detallada, ver págs. 26-27

- ☛ Depredador
- ☙ Herbívoro
- ☞ Saprófago
- ☞ Fungívoro
- ☞ Hematófago
- ☞ Parasitoide o parásito
- ☞ Xilófago
- ☞ Coprófago
- ☞ Melífago
- ☞ Pseudopulcradentado



## ¿QUÉ ES UN ARTRÓPODO?

LOS BIÓLOGOS CLASIFICAN los seres vivos en cinco divisiones llamadas reinos, el mayor de los cuales es el animal. Los reinos se dividen en filums o tipos. Los artrópodos forman el mayor filum del reino animal. Constituyen un grupo muy diverso, con tamaños que abarcan de ácaros de una fracción de milímetro al enorme Cangrejo isleño japonés, *Macrocheira kaempferi*, que puede alcanzar 4 m. Los artrópodos se

encuentran en cualquier hábitat de la Tierra, desde las profundidades de los océanos hasta los más altos picos, desde los áridos desiertos hasta las más húmedas selvas pluviales, y en las zonas muy pobladas. Los insectos son los únicos artrópodos con alas, y son los más exitosos en supervivencia. Bajo estas líneas se incluye un "árbol" sencillo que muestra las subdivisiones del filum Arthropoda.

### Filum

Una subdivisión principal de un reino (en este caso, del reino Animalia).

#### ARTHROPODA

Animales con exoesqueleto duro, cuerpo segmentado y patas articuladas

### Subfilum

Una subdivisión principal de un filum (en este caso del filum Arthropoda).

#### MANDIBULATA

Artrópodos con antenas y mandíbulas muy modificadas para morder

### Superclase

Una subdivisión de un subfilum, compuesta de clases de animales que comparten características comunes.

#### HEXAPODA

Artrópodos principalmente terrestres, con 6 patas y 2 antenas

#### COLÉMBOLO

*Isotoma viridis* (pág. 207)



#### PORCELIÓNIDO

*Porcellio scaber* (pág. 212)



#### JÚLIDO

Especie del género *Julus* (pág. 242)



#### CHELICERATA

Artrópodos con piezas bucales a modo de pinzas y sin antenas



### Clase

Un grupo formado por órdenes de animales similares.

#### INSECTA

Los únicos artrópodos con alas

#### HEXAPODA NO INSECTOS

3 clases:  
COLLEMBOLA  
PROTURA  
DIPLURA

#### 6 clases:

REMIPEDIA  
CEPHALOCARIDA  
BRANCHIOPODA  
OSTRACODA  
MAXILLOPODA  
MALACOSTRACA

#### 4 clases:

PAUROPODA  
SYMPHYLA  
CHILOPODA  
DIPLOPODA

#### 3 clases:

ARACHNIDA  
PACNOGONIDA  
MEROSTOMATA

CHINCHE  
HEDIONDA  
*Eurydema dominulus*  
(pág. 2)



### Orden

Un grupo compuesto por familias muy emparentadas.

29 órdenes

3 órdenes

37 órdenes

16 órdenes

14 órdenes

Familia, género, especie  
Una familia consta de especies similares. Un género, de especies muy emparentadas.

949 familias  
1.000.000 especies

31 familias  
7.700 especies

540 familias  
34.000 especies


144 familias  
13.700 especies

470 familias  
76.500 especies

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTRÓPODOS

Los artrópodos tienen rasgos comunes:

- El cuerpo con simetría lateral.
- Un exoesqueleto protector y rígido (o cutícula) compuesto de quitina. Los músculos se unen al exoesqueleto, que se muda a medida que el animal atraviesa sus estadios de desarrollo.
- Pares de patas articuladas que salen de los segmentos corporales.
- Segmentos corporales que forman unas pocas secciones principales. Los miriápodos tienen cabeza y tronco; los crustáceos y los artrópodos, una cabeza separada, tórax y abdomen. En los arácnidos, la cabeza y el tórax se han fusionado para formar un segmento único: el cefalotórax.





## ¿QUÉ ES UN INSECTO?

**M**UCHA GENTE CONFUNDE los insectos y otros artrópodos. Los insectos, al igual que todos los demás artrópodos, tienen patas articuladas y una dura cutícula, pero sólo seis patas y por lo general tienen alas. El término "insecto" proviene del latín y significa


"cortado", en alusión a las secciones que los componen: cabeza, tórax y abdomen. La cabeza lleva las piezas bucales, antenas y ojos. El tórax tiene tres segmentos con patas y a veces con alas. El abdomen tiene hasta 11 patas visibles y puede llevar "colas" terminales (cercos).

### PARTES DE UN INSECTO

Las partes corporales básicas de los insectos han evolucionado de forma distinta entre ellos. Así, las piezas bucales pueden estar adaptadas para morder o masticar o para chupar sangre, néctar o jugos vegetales. Las antenas son órganos sensoriales vitales que responden a estímulos químicos como el olor de un compañero sexual, o a estímulos físicos como el movimiento de un huésped dentro de una planta. Las patas están modificadas para saltar, cavar, nadar, capturar presas e incluso oír y cantar. Las alas no sólo sirven para volar; pueden ser resistentes y protectoras, reflejar el sol o almacenar aire. Su coloración puede ser de camuflaje, o ser útil para el cortejo o espantar a los depredadores.

### INSECTO DISECCIONADO

Este *cerambícido* de América Central, *Xixuthrus heros*, tiene antenas largas, mandíbulas fuertes y élitros duros que protegen sus alas posteriores membranosas.



### DENTRO DE UN INSECTO


El sistema nervioso central consiste en un cerebro conectado con masas nerviosas: los ganglios. El periférico se compone de nervios sensoriales que almacenan información de los receptores sensoriales y nervios motores que controlan los músculos.

El sistema respiratorio es un entramado de tubos. El aire es inspirado por los espiráculos, unas aberturas sobre el abdomen o sobre el tórax. Los estadios inmaduros de las especies acuáticas respiran a través de branquias.

El sistema circulatorio es abierto; los órganos están irrigados por hemolinfa, la cual transporta nutrientes y desechos por todo el cuerpo.

El sistema digestivo es un tubo abierto en la punta con zonas para triturar y acumular comida, producir enzimas y absorber nutrientes.

Para reproducirse, los machos transfieren su espermatozoides al órgano receptor de la hembra con el pene (el aedagus), y los huevos son fecundados al bajar por el oviducto de la hembra.



### ÓRGANOS INTERNOS DE UNA ABEJA DE LA MIEL

### INSECTOS NO HEXÁPODOS

Los insectos pertenecen a los hexápodos (ver págs. 10-11). Este grupo incluye otras tres clases —con el nombre colectivo de hexápodos no insectos— que suelen distinguirse de los insectos: Diplura (dipluros), Protura (proturos) y Collembola (colémbolos).

La mayoría de los hexápodos no insectos viven en el suelo o en la hojarasca. Todos ellos carecen de alas y algunos incluso de ojos y antenas. Sin embargo, la principal diferencia entre ellos y los insectos son sus piezas bucales. Contrariamente a los insectos, estos hexápodos las tienen encerradas en una bolsa situada en la parte inferior de la cabeza. Cuando las usan, las sacan de la bolsa para rascar, morder o perforar los alimentos.



### COLÉMBOLOS

Estos artrópodos constituyen la más numerosa y difundida de las clases de hexápodos no insectos. Son alargados o redondeados, como este colémbolo (ver págs. 207-211).



## TIPOS DE INSECTOS

Los insectos pueden dividirse en tres grupos, en función de su desarrollo. Los primitivos, carentes de alas, como los pececillos de plata, se desarrollan hasta la fase adulta mudando periódicamente durante su vida. Los insectos con alas cambian gradualmente (metamorfosis incompleta) o de una forma más súbita (metamorfosis completa) que conlleva un estadio pupal (ver págs. 20-23).

Los primeros insectos con alas se desarrollaban por metamorfosis gradual. El estadio pupal no apareció hasta el pérmico (hace de 290 a 245 millones de años), quizás en respuesta a condiciones climáticas (la pupa sobrevive al frío). Con la evolución los estadios larvales dejaron de ser versiones en miniatura de los adultos. Las larvas se convirtieron en "máquinas de comer" y los adultos en "máquinas de reproducirse". El éxito del estadio larval es evidente. El 85% de las especies conocidas de insectos vivos se desarrollan de este modo y la mayoría pertenecen a uno de estos cuatro órdenes: coleópteros, dípteros, lepidópteros e himenópteros.



## Δ LOS MÁS PRIMITIVOS

Los primeros insectos eran saprófagos sin alas que vivieron hace más de 400 millones de años. Los insectos actuales más primitivos, los arqueognatos (arriba) y los pececillos de plata, tienen un aspecto y función similares.

## Δ LOS MÁS AVANZADOS


Los himenópteros (ver págs. 178-206), como las abejas (arriba), son muy avanzados. Muchos viven en colonias, a menudo con castas que realizan tareas específicas.

## LOS MÁS GRANDES

En la prehistoria, los insectos eran mucho más grandes, pero hay especies actuales muy grandes. Esta avispa cazadora de arañas que puede alcanzar 7 cm, es una de las mayores especies. Las más pequeñas pueden posarse en uno de sus pies.

## LOS MÁS PEQUEÑOS

Algunas avispa parásitas (arriba) son muy diminutas y miden menos de 1 mm.



## ALAS Y VUELO

Uno de los factores clave en el éxito de los insectos fueron las alas. Fueron los primeros animales que surcaron el aire, lo cual les permitió escapar de los depredadores, y hallar pareja y alimentos de un modo más eficiente. Los insectos ya habían adquirido alas antes del carbonífero (hace 350-290 millones de años) pero no podían plegar sus alas hacia atrás. Hacia mediados de este período, algunos insectos habían adquirido esta capacidad y ello les permitió utilizar una gama mucho más amplia de microhábitats, como grietas y hendeduras en la madera muerta, la hojarasca o debajo de las piedras. También pudieron esconderse de los depredadores. Los descendientes tuvieron un gran éxito evolutivo y hoy los únicos insectos que no pueden plegar las alas son las libélulas y las efemerías.



## SECUENCIA DE VUELO

Esta secuencia muestran un Escarabajo sanjuanero antes y durante el vuelo. A diferencia de las aves, los insectos necesitan calentar sus músculos de vuelo antes de despegar y para ello toman el sol o hacen vibrar sus alas.

## LOS SECRETOS DEL ÉXITO

A lo largo de su evolución, varios factores se han combinado para que los insectos hayan sido el más exitoso de todos los grupos de seres vivos. Más de la mitad de las especies que hoy viven son insectos.

Aunque hay varias razones para ello, las principales son su capacidad de volar y de reproducirse con rapidez, su tamaño pequeño, su cutícula protectora y el aislamiento de su sistema nervioso central.

FACTOR	EFFECTO
CUTÍCULA (EXO-ESQUELETO EXTERNO)	Resistente e impermeable, la cutícula los protege de la depredación y también de la deshidratación.
VUELO	Les permite escapar de sus enemigos, encontrar nuevos hábitats y alimento con rapidez, y establecer nuevas colonias.
REPRODUCCIÓN RÁPIDA	Los insectos evolucionan con gran rapidez y se adaptan enseguida a los cambios ambientales.
AISLAMIENTO DEL SNC	Permite que los nervios funcionen con eficiencia y la supervivencia en lugares muy calientes o secos.
TAMAÑO	El pequeño tamaño permite acceder a muchos microhábitats: un árbol puede albergar centenares de especies de insectos.



## ¿QUÉ ES UN ARÁCNIDO?

LOS ARÁCNIDOS, que incluyen las arañas, los escorpiones y los ácaros, difieren de los insectos porque su cuerpo se divide en dos en lugar de tres segmentos. Sus ancestros eran animales marinos similares a los escorpiones



TARÁNTULA MEXICANA DE PATAS ROJAS


actuales que florecieron en el silúrico (435-400 millones de años); algunos medían más de 1 m. Las especies marinas desaparecieron hace unos 250 millones de años, pero siguen viviendo en tierra firme.

### EL CUERPO DE UN ARÁCNIDO

El cuerpo de los arácnidos se divide en dos partes. La cabeza y el tórax, fusionados, forman un cefalotórax o prosoma, unido al abdomen u opistosoma. En algunos el abdomen está segmentado y puede tener una expansión a modo de cola; en las arañas contiene glándulas serígenas. El cefalotórax tiene seis pares de apéndices. El primer par (quelíceros) puede tener forma de pinza o de un par de "colmillos" y se utiliza para la alimentación. El segundo par (pedipalpos) tiene varias funciones, entre ellas la de capturar presas y fecundar a la hembra, y puede tener forma de patas o estar dilatado y terminar en pinzas. Los otros cuatro pares son las patas andadoras; el primer par puede llevar órganos sensoriales. Los gases se intercambian a través de la tráquea o de las filotráqueas o pulmones. La mayoría digieren sus alimentos fuera del cuerpo con enzimas que introducen o vierten sobre sus alimentos y chupando el líquido resultante.

### ▷ DENTRO DE UN ARÁCNIDO

El cefalotórax alberga el cerebro y los órganos sensoriales, el estómago chupador y la glándula de veneno. En el abdomen ocurre la digestión, el intercambio de gases, la reproducción y —en las arañas (como a la de la figura), los pseudoscorpiones y algunos ácaros— la producción de seda.



◁ **SEGADOR**  
El cefalotórax y el abdomen de los segadores están unidos de tal modo que parece que tengan una única sección corporal.

▷ **GARRAPATA**  
La estructura que sobresale en la parte frontal alberga unas piezas bucales con púas, para penetrar en la piel del huésped.



### TIPOS DE ARÁCNIDOS

Los arácnidos forman un grupo numeroso y diversificado. Se dividen en 11 órdenes, con características propias. Los solífugos tienen grandes quelíceros dirigidos hacia delante. Los escorpiones se reconocen por su larga "cola" abdominal provista de un aguijón, y por sus grandes pedipalpos a modo de pinzas. Los uropigios tienen grandes pedipalpos, pero sin forma de pinzas, y su cola a modo de látigo carece de aguijón. Las arañas y los ácaros son los que más se diferencian. Las arañas abarcan desde las diminutas arañas enanas con proyecciones provistas de ojos en el cefalotórax hasta las enormes y peludas especies de tarántulas. Los numerosos ácaros abarcan desde especies formadoras de agallas, los artrópodos más pequeños del mundo (menos de 0,1 mm), hasta las garrapatas chupadoras de sangre, que pueden superar los 30 mm. Algunos ácaros tienen un cuerpo aplanado o esbelto para introducirse en un folículo capilar humano o arar a través de las capas de piel.

los jóvenes escorpiones se arraciman en el dorso de la madre para estar protegidos



### TELAS DE ARAÑA

Las arañas producen seda para envolver sus huevos, tapizar madrigueras, construir refugios y capturar presas. (No todas capturan sus presas con seda; algunas se basan en su buena vista y su sigilo.) Las arañas constructoras de telas han desarrollado ingeniosas técnicas de captura de presas, varias de las cuales se muestran bajo estas líneas.



#### TELA ORBITAL

Estas espirales de seda pegajosa se construyen en espacios abiertos. Algunas pueden incluso capturar aves.



#### TRAMPA

Es un túnel tapizado de seda con una tapa. La araña se refugia en él mientras espera a la presa.



#### TELA ARROJADIZA

Algunas arañas elaboran pequeñas telas que sujetan con las patas y arrojan a las presas.



#### TELARAÑAS

Las que se ven en los edificios pueden ser de fólidos. Otras especies las construyen en la vegetación.

### CUIDADOS MATERNALES

Muchos arácnidos vigilan y defienden sus huevos de los depredadores. Los escorpiones, uropigios, ambipigios y algunas arañas llevan un tiempo a sus crías sobre el dorso cuando emergen de la bolsa de los huevos o de la cámara de incubación.



## ¿QUÉ ES UN CRUSTÁCEO?

**M**UY DIVERSOS en aspecto, los crustáceos abarcan desde las pulgas y bellotas de mar hasta los camarones, cangrejos y langostas. El tamaño varía desde el del plancton microscópico hasta el de los bogavantes gigantes de más de 75 cm. Son en general acuáticos y tienen un caparazón duro. Se encuentran en hábitats de agua dulce y marina de todo el mundo.

### PARTES DE UN CRUSTÁCEO

El caparazón es similar al exoesqueleto de otros artrópodos pero suele estar endurecido con depósitos de carbonato cálcico. La cabeza y el tórax están a menudo cubiertos con un caparazón único. Los crustáceos tienen un segundo par de antenas y sus apéndices están especializados para diversas funciones, desde captar información sensorial hasta el movimiento, respirar e incubar los huevos. Sus apéndices son bífidos, con una porción basal que lleva una parte interior apta para andar y otra externa que se utiliza para nadar.

Algunas especies se han adaptado a la vida en tierra firme: las cochinillas de la humedad son sólo terrestres. La mayoría de los crustáceos son saprófagos, pero hay especies depredadoras y herbívoras y algunas, como las bellotas de mar, filtran partículas alimenticias del agua con sus patas en forma de colador.



**Δ ARMADILLIDIUM ALBUM**  
Las cochinillas de la humedad se enrollan pero no pueden esconder la cabeza como los milipés.

**◁ PORCELIÓNIDO**  
Descendiente de una especie acuática, prefiere los lugares muy húmedos.



### CRUSTÁCEOS MARINOS

La mayoría de crustáceos viven en el mar y pertenecen a la clase Malacostraca, que incluye a cangrejos, langostinos y langostas. La parte frontal de la cabeza forma una proyección hacia delante, los ojos son pedunculados y compuestos, y el abdomen termina en un telson en forma de cola. En los cangrejos, el abdomen es corto y se enrosca para caber bajo el caparazón.



KRILL



**Δ BOGAVANTE COMÚN**  
En muchas especies grandes, como el bogavante común (arriba), las patas torácicas del primer par son muy grandes, con fuertes pinzas para defenderse, manipular alimentos y el cortejo.

## ¿QUÉ ES UN MIRIÁPODO?

**L**os miriápodos son similares a los insectos en muchos aspectos, y se considera que están muy emparentados. Ambos grupos tienen mandíbulas y carecen de las patas ramificadas y del segundo par de antenas que poseen los crustáceos. Tienen órganos internos similares como el sistema traqueal y los

tubos de Malpighi. Pese a ello, es posible que los insectos estén más próximos a los crustáceos, y que sus patas y antenas hayan evolucionado de un modo distinto por vivir en tierra firme.

### PARTES DE UN MIRIÁPODO

Estos animales terrestres y alargados se diferencian de otros artrópodos por sus numerosos pares de patas y el tronco, que no está dividido en un tórax y un abdomen. Tienen un par de antenas y mandíbulas. La cutícula no es tan impermeable como la de un insecto y no pueden cerrar las aberturas espiraculares del sistema traqueal; a causa de ello, habitan sobre todo en microhábitats húmedos, como el suelo y la hojarasca, y por lo general son nocturnos. Las especies corredoras se diferencian de las cavadoras por su modo de andar, determinado por la longitud y el número de patas.



### Δ CIEMPIÉS

Los ciempiés, que suelen ser depredadores de movimientos rápidos, llevan dos patas en cada segmento del tronco.

### ◁ MILPIÉS

Suelen ser excavadores y de movimientos lentos. Los segmentos del tronco están fusionados en pares (diplosegmentos), cada uno con dos pares de patas.



### DEFENSA PROPIA

Los ciempiés se defienden con sus uñas de veneno (la picadura puede producir vómitos y fiebre). Los milpiés gloméridos pueden enrollarse escondiendo la cabeza bajo la última tergita (placa abdominal).

### ◁ SÍNFILOS

Parientes próximos de los ciempiés, estos animales de cuerpo blando viven en el suelo y en la hojarasca. Tienen antenas bastante largas y 12 pares de patas.



### ▷ PAURÓPODOS

Parientes próximos de los milpiés, estos miriápodos viven en la hojarasca y en el suelo. Tienen el cuerpo blando, antenas cortas y ramificadas, nueve pares de patas y carecen de ojos.



la tergita cubre las patas



GLOMÉRIDOS



## CICLO VITAL

**T**ODOS LOS ARTRÓPODOS tienen que desprenderse de su exoesqueleto a intervalos para poder crecer, pero los grupos tienen desarrollos distintos. Los miriápodos y los arácnidos mudan durante toda su vida, y sus estadios inmaturos parecen adultos en pequeño. Los insectos, salvo los arqueognatos y los

## METAMORFOSIS INCOMPLETA

Los estadios inmaduros se llaman ninfas. Son muy similares a los adultos pero carecen de alas y de estructuras reproductivas. Las alas crecen gradualmente en el exterior del cuerpo, dentro de brotes o almohadillas alares. Tras una serie de mudas en función de las especies, la muda final al estadio adulto se produce con la expansión de las alas. En los órdenes acuáticos como los odonatos (libélulas y caballitos del diablo), las ninfas son menos parecidas a los adultos.

el macho sujeta la hembra con los órganos de la punta del abdomen


## 1. APAREAMIENTO

En este zigoptero, Coenagrion puella, el macho transfiere espermatozoides de sus órganos genitales primarios a los genitales secundarios del tercer segmento abdominal. Sujeta la hembra por detrás de la cabeza, y ella enroscas su abdomen para unirlo a los genitales secundarios del macho. El espermatozoide se transfiere por el pene al órgano de almacenamiento de espermatozoides de la hembra. La puesta se realiza dentro de plantas acuáticas.

## 2. EMERGENCIA DE LA NINFA

Después de emerger, la pálida ninfa atraviesa una serie de estadios (instars) cuyo número varía según la especie, la temperatura y el suministro de alimento. Los dos primeros instares no tienen brotes alares visibles, que se aprecian mejor en ninfas de más edad. Aunque son depredadoras, son presa de muchos animales, como escarabajos acuáticos y peces.

pececillos de plata (ver pág. 23), cambian de aspecto en su desarrollo. En los insectos más primitivos, el cambio es gradual y la metamorfosis es "incompleta" (ver más abajo); en los avanzados, el cambio es muy espectacular y la metamorfosis es "completa" (ver págs. 22-23).



## 5. ZIGOPTERO ADULTO

Una vez libre de la piel ninfal, el adulto puede extender su abdomen y sus alas bombeando hemolinfa en ellos. La cutícula se endurecerá en unas pocas horas, pero la coloración adulta tarda varios días. La hembra no está lista para aparearse enseguida; se alimenta una semana o dos antes de que maduren sus ovarios.

## 4. EMERGENCIA DEL ADULTO

Anclado por la piel ninfal, el adulto que emerge empuja hacia arriba y se agarra a un tallo con las patas.

Primero saca sus alas de los brotes alares y luego extrae su abdomen. En esta fase, el tórax aún no ha adquirido su forma final, el cuerpo es blando y las alas están arrugadas y no extendidas.



## 3. INSTAR FINAL

Cuando una ninfa está completamente desarrollada, empieza a emerger cada vez más tiempo del agua hasta que la abandona.

Un incremento de la presión de la hemolinfa en el tórax produce una escisión a lo largo del dorso de la cutícula ninfal entre las almohadillas alares. La cabeza y el tórax del adulto se separan de la vieja piel y emergen.





## METAMORFOSIS COMPLETA

El estadio inmaduro, llamado larva, tiene un aspecto muy distinto del adulto. Las larvas de algunas moscas reciben el nombre de ceras y las de las mariposas se llaman orugas. Las larvas se alimentan continuamente y atraviesan varias mudas hasta alcanzar el último estadio larval. Entonces dejan de alimentarse y buscan un lugar seguro para pupar. En el estadio pupal, tiene lugar la reorganización y la transformación de los tejidos larvales. Los tejidos del insecto inmaduro se disgregan al tiempo que crecen unos pequeños grupos de células (discos imaginales) que han estado

presentes desde la eclosión del huevo, y se desarrollan hasta formar los tejidos orgánicos del adulto. Para proteger la pupa, el último estadio larval teje a menudo un capullo o construye una celda con partículas del suelo o con fibras de madera masticadas. Las pupas de algunas especies tienen mandíbulas móviles y pueden defenderse en cierta medida. El adulto se libera de la piel pupal y/o del capullo con sus mandíbulas o patas, o inflando partes de su cuerpo.

### 1. APAREAMIENTO

En el cortejo pueden producirse olores sexuales, sonidos e incluso exhibiciones. En esta mariquita, *Coccinella septempunctata*, el macho se engancha al dorso de su pareja. El esperma puede ser transferido en pocos minutos, pero al seguir adherido, se asegura de que otros machos no se aparecen con su pareja.

el macho se engancha al dorso de la hembra



### 2. EMERGENCIA DE LAS LARVAS

La hembra pone sus huevos en series bastante pequeñas sobre las hojas de las plantas, y después de una semana más o menos emergen las diminutas larvas de primer instar. La cutícula es blanda pero no tarda en endurecerse y oscurecerse. Las larvas tienen que encontrar presas de cuerpo blando, en esta especie pulgones.

la cáscara vacía se queda enganchada a la superficie de la hoja



series de huevos puestos en el follaje

la larva se libra sola de la cáscara del huevo

### 3. ÚLTIMO ESTADIO LARVAL

Las alargadas y oscuras larvas tienen púas y proyecciones bien desarrolladas y patas fuertes. Pueden observarse sobre los tallos y en el envés de las hojas, donde haya pulgones. Una larva de mariquita puede comer muchos centenares de pulgones durante su desarrollo. Sus pintas pálidas indican a los depredadores que tiene mal sabor.

púas y proyecciones en el cuerpo



las pintas anaranjadas disuaden a los depredadores

la coloración roja se oscurece al cabo de varios días



los élitros son blandos y vulnerables

tórax negro con puntos amarillos pálidos en esta especie



coloración pálida

### 6. MARIQUITA ADULTA

El adulto hemisférico y distintivo queda protegido de los depredadores por sus brillantes colores advertidores y por su capacidad de exudar líquidos de sabor desagradable por las articulaciones de sus patas. Como las larvas, los adultos se alimentan de insectos de cuerpo blando y son útiles en el control biológico de plagas. Muchas especies invernan en grupos, en lugares abrigados fuera o dentro de edificios, y emergen en primavera para poner sus huevos.

### 5. NUEVO ADULTO

Cerca de una semana después, la pupación se completa. La cutícula pupal se escinde a todo lo largo del dorso y emerge el adulto pálido y blando. En la hora o dos horas siguientes, éste debe levantar los élitros, extender las alas posteriores desde debajo y endurecerlos antes de poder plegarlos otra vez, listos para el vuelo. Los colores brillantes y los puntos contrastados de la mariquita adulta tardan un par de días en aparecer.

### 4. PUPACIÓN

Unas cuatro semanas después, en función de la temperatura y el suministro de alimentos, la larva pupa. Se engancha al envés de una hoja y se desprende de su última piel larval. Permanece inmóvil y la cutícula pupal de debajo se endurece y se vuelve oscura.

la cutícula se endurece y se torna oscura



## INSECTOS AMETÁBOLOS

En los insectos que no sufren cambios de forma y cuya muda continúa incluso después de alcanzar la madurez sexual, el desarrollo se denomina ametábolo. Los arqueognatos y los pececillos de plata, con

menos del 0,1 % de las especies de insectos, se desarrollan así. Además de las patas torácicas, estas primitivas especies detritívoras tienen cortos apéndices en algunos segmentos abdominales.

PECECILLO DE PLATA  
Debe su nombre a su forma aerodinámica.





## EL SISTEMA SENSORIAL

AUNQUE LOS ARTRÓPODOS suelen ser muy pequeños, poseen sistemas sensoriales muy sofisticados que les permiten responder a una amplia gama de estímulos internos y externos. Son

### CÓMO VEN LOS INSECTOS


Salvo algunas especies que viven en cuevas, algunos grupos parásitos, y las castas obreras de algunas hormigas y termites, los órganos visuales principales de los insectos son los ojos compuestos (ver abajo). Los diurnos perciben puntos diminutos de distinta intensidad luminosa que forman la imagen. Los de vuelo crepuscular y nocturno tienen ojos adaptados a la luz escasa, con imágenes menos nítidas. Muchos insectos adultos y algunos inmaduros tienen ojos simples, los ocelos, en vez o además de ojos compuestos. Los ocelos sólo captan la luz o la oscuridad, y son importantes para determinar ciertos ritmos conductuales, como buscar alimentos o hibernar. La visión de los colores se da en todos los órdenes de insectos. Por lo general, ven mejor en el extremo azul del espectro que en el rojo. Algunos captan el ultravioleta.

### ▼ OJOS DE CAZADOR

Los ojos son importantes para encontrar pareja y alimento. Los depredadores aéreos suelen ver muy bien y a veces sus ojos ocupan toda la cabeza. Los insectos que se aparean en enjambres suelen tener también ojos grandes. Los de los tábanos, como el que aquí se muestra, son muy grandes e iridescentes.




capaces de recibir estímulos visuales, químicos y mecánicos, muchos de ellos tienen sensores de temperatura y de humedad y algunos detectan campos magnéticos y la radiación infrarroja.



### Δ VISIÓN DE ABEJA

Las flores pueden tener unos dibujos que reflejan la luz ultravioleta y sólo son visibles para las abejas y algunas otras especies. Esta fotografía se hizo con una película sensible a los UV.



### Δ OJO COMPUESTO

Los ojos compuestos de un insecto constan de hasta 20.000 unidades receptoras, los omatidios. Cada uno tiene varias lentes que dirigen la luz sobre el rabdoma, una estructura en forma de bastón formada por las porciones internas de las células fotosensibles de la retina.

### TACTO, OLOR Y SABOR

Los insectos tienen órganos sensoriales químicos, o quimiosensores, en las piezas bucales, antenas, tarsos y otras partes del cuerpo. Les permiten detectar alimentos, hallar un buen lugar para poner sus huevos, o seguir senderos marcados en el suelo. Captan los olores con unas células olfativas situadas sobre todo en las antenas; si son abundantes, pueden detectar olores a concentraciones bajísimas. Los insectos emiten sustancias químicas volátiles, las feromonas, que tienen varias funciones pero suelen estar relacionadas con el comportamiento sexual. Las feromonas de atracción actúan a distancia para que ambos sexos se detecten; con frecuencia es la hembra la que emite el olor y espera a que los machos la encuentren. Una vez juntos, segregan otras feromonas denominadas de cortejo.



### COMUNICACIÓN

Los insectos se comunican de varias formas. Algunas especies usan el sonido o señales luminosas, pero el tacto y el sabor son más comunes. Estas dos hormigas obreras podrían estar intercambiando información sobre su colonia y sobre nuevas fuentes de alimento.

### DETECCIÓN DEL SONIDO

Muchos insectos tienen unos pelos que responden a las vibraciones, a las corrientes de aire, al tacto y a las ondas sonoras. Pueden tener unas estructuras auditivas especiales, los órganos timpánicos, en varias partes del cuerpo (patas, alas, abdomen o antenas). Según la especie, responden a frecuencias de sonido que abarcan desde menos de 100 Hz (ciclos por segundo) hasta más de 200 KHz. Los machos de las cigarras emiten sonidos muy graves que se oyen a más de 1 km de distancia; los órganos timpánicos de ambos sexos se sitúan en el abdomen.

Los insectos pueden utilizar el sonido para atraer y encontrar una pareja, para detectar presas y para evitar a los depredadores. Muchas mariposas nocturnas, mantis religiosas y otras especies tienen órganos sensibles a los ultrasonidos, lo que les permite oír a los murciélagos que cazan.

### POSICIÓN DE LOS "OÍDOS"

Los órganos auditivos se encuentran en varias partes del cuerpo. En los grillos y saltamontes, se sitúan en las tibia de las patas anteriores. Como su cuerpo es bastante pequeño, esta situación les permite orientarse mejor. Se hallan entre dos hendiduras de la pata y están conectados con unas tráqueas acústicas especiales que conducen al tórax.





## ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN

**L**OS ARTRÓPODOS tienen una alimentación muy variada. A veces, los estadios inmaduros tienen las mismas costumbres alimentarias que los adultos, pero lo más común es que sean



### ESPECIES DEPREADORAS

Los depredadores matan y comen otros animales. La mayoría dependen de más de un tipo de presas, si bien algunos son especialistas. No tienen que comer tanto como los herbívoros, ya que su comida es más nutritiva y proteínica. A veces, los adultos capturan presas y las almacenan para sus larvas. Para eludir los depredadores, muchos artrópodos han desarrollado distintos mecanismos de defensa, entre ellos púas y pelos, coloraciones crípticas y secreciones tóxicas.

### MANTIS RELIGIOSA ▷

*La visión binocular permite a la mantis calcular la distancia exacta hasta su presa. El ataque dura menos de 100 milisegundos. Extiende las tibias y luego los fémures, mientras captura la presa.*

muy distintas. En ocasiones, los adultos pueden no alimentarse y depender de sus reservas. A continuación se esbozan los principales tipos de alimentación y los símbolos que aparecen en este libro.



### ESPECIES HERBÍVORAS

Se alimentan de flores, semillas u hojas, o dentro de los tejidos vegetales. Un caso especial son los formadores de agallas, que inducen químicamente la formación de una excrescencia en una planta (la agalla), dentro de la cual se alimentan.

Muchos tienen piezas bucales chupadoras y se alimentan sólo de savia o del contenido de las células vegetales.

### ORUGA

*Las orugas, unos de los herbívoros más conocidos, se agarran a las hojas con sus patas torácicas y sus pseudópodos abdominales.*

*esta oruga mordisquea el follaje con sus mandíbulas*



### ESPECIES SAPRÓFAGAS

Se alimentan de materia orgánica en descomposición y se denominan también detritívoros. Algunas comen sobre todo restos de plantas, y otras principalmente restos de animales. En la práctica, resulta difícil distinguir con precisión quién come qué, y pocas especies dependen de un solo tipo de alimento; por lo tanto, todas las especies "carroñeras" se han clasificado como saprófagas en este libro.



### ESPECIES FUNGÍVORAS

Se nutren de hongos (los cuerpos fructificantes o carpóforos y las hifas escondidas). Son ejemplos los colémbolos y las larvas de muchos escarabajos y moscas, que pueden hallarse dentro de los carpóforos. Las hormigas cortadoras de hojas y algunas especies de termitas cultivan hongos para alimentarse.



### ESPECIES HEMATÓFAGAS

Las garrapatas, las pulgas, muchas moscas y algunas chinches necesitan la sangre de los vertebrados para sobrevivir o para que sus huevos maduren. Algunos insectos ingieren sólo sangre de mamíferos y otros se nutren de diferentes huéspedes, como aves y reptiles. Su picadura produce picor y a veces infecciones graves o incluso la muerte. El principal peligro es la transmisión de enfermedades provocadas por microorganismos y protozoos. La malaria, la fiebre amarilla y la oncocercosis afectan a millones de personas en las regiones tropicales; en las templadas, las garrapatas son importantes vectores.



### PARASITOIDES Y PARÁSITOS

Los parasitoides son depredadores especializados que viven en o sobre el cuerpo de un animal huésped. Un parasitoide coloniza sólo un huésped, al que acaba matando. Algunos se alimentan internamente (endoparasitoides) y otros externamente (ectoparasitoides). Esta estrategia alimentaria se observa en algunas avispas y moscas parásitas. En este libro, se usa el mismo símbolo para los parásitos verdaderos, como pulgas y piojos, que se alimentan de la sangre, la piel o el pelaje de un animal pero sin matar a su huésped.



### MEMBRÁCIDO INFESTADO

*Este membrácido (ver pág. 98) está infestado de ácaros rojos parásitos. Los ácaros se alimentan de la hemolinfa penetrando en la cutícula con sus piezas bucales, sobre todo en las articulaciones y donde la cutícula es más fina.*



### ESPECIES XILÓFAGAS

Se alimentan de madera, un recurso abundante aunque de escaso poder nutritivo. Por ello, muchas son de crecimiento lento. Algunas atacan la madera viva o recién muerta, y otras la madera en descomposición. Muchos xilófagos tienen en su interior microorganismos simbióticos que les ayudan a digerir la celulosa; también comen hifas fungales y otros materiales.

### ESCARABAJO DEL RELOJ DE LA MUERTE

*Pone sus huevos en hendiduras de la madera. Las larvas la excavan y tardan varios años en madurar.*

*los túneles de alimentación de la larva dañan la madera*



### ESPECIES COPRÓFAGAS

Viven en las deyecciones de otros animales. Los escarabajos estercoleros comen sólo estiércol y en África, donde hay muchos animales pacedores, hay miles de especies de estos escarabajos que alimentan a sus crías con los excrementos de distintos animales. Las larvas de muchas moscas también comen estiércol.



### ESPECIES MELÍFAGAS

Salvo las hierbas polinizadas por el viento, la mayoría de las plantas de flor dependen de los insectos para su polinización. Para atraerlos los recompensan con néctar rico en azúcares y polen muy proteínico. Los insectos aportan estos alimentos a sus celdas larvales; a su vez, polinizan las flores.



### ESPECIES PSEUDOPLACENTARIAS

Las larvas de algunas moscas (ver Tsé-Tsé, pág. 147), después de eclosionar, permanecen en una cámara de cría de la madre, quien las alimenta de sus secreciones. Poco antes de emerger, el abdomen de la madre está muy abultado. Suelen pupar en cuanto emergen.



## COMPORTAMIENTO

**LOS ARTRÓPODOS TIENEN** el cerebro pequeño. Una langosta adulta cuenta con un millón de células nerviosas para suplir sus necesidades sensoriales y motrices. Los insectos más

### CORTEJO Y APAREAMIENTO

En general, el macho y la hembra tienen que aparearse para que ésta ponga sus huevos. Los sexos pueden encontrarse en buenos emplazamientos para alimentarse o para poner los huevos, o ser más activos para buscar pareja atrayéndose con cantos, olores e incluso exhibiciones luminosas. El cortejo suele ser complicado: los insectos, pueden mover sus alas, patas y/o antenas, segregar feromonas y dar o recibir regalos nupciales (por lo general trozos de alimentos). No obstante, las hembras de muchas especies de artrópodos son capaces de poner huevos viables sin necesidad de machos.



una luz fría, producida por una reacción química especial, brilla a través de la cutícula transparente

### Δ ATRACCIÓN POR LA LUZ

Las hembras de algunos escarabajos, como la Luciérnaga europea, *Lampyris noctiluca* (arriba), atraen a los machos con destellos de luz. A veces, atraen a machos de otras especies para decorarlos.

### ▷ CONTACTO FÍSICO

En muchos artrópodos, la transferencia de esperma a la hembra es indirecta. Los insectos (aquí, unos escarabajos coraceros), siempre copulan.

pequeños tienen muchas menos células nerviosas. Pese a ello, cuenta con un comportamiento muy sofisticado en el modo de moverse, evitar a los depredadores, alimentarse, aparearse y cuidar la prole.



las mandíbulas, grandes y dentadas, rodean el tórax del rival

### Δ LUCHA DE CIERVOS VOLANTES

Las hembras de los artrópodos son a menudo muy selectivas y los machos tienen que competir por ellas. Aquí, estos machos de Ciervo volante luchan para acceder a las hembras. El ganador deja a su oponente panza arriba.

macho a punto de introducir su esperma en la hembra



### CUIDAR DE LAS CRÍAS

Los ciempiés, arañas e insectos suelen cuidar de sus huevos y crías. Las arañas hembra envuelven los huevos en seda y los transportan encima o los vigilan hasta que eclosionan. Los escorpiones y los grupos emparentados incuban sus huevos y luego llevan las crías en su dorso. En los insectos, suele ser la hembra la que "cuida de los niños", pero los machos pueden contribuir en algunas familias.

### MONTAR GUARDIA

Algunas especies de hemípteros vigilan a sus ninfas e incluso las conducen a buenos lugares de alimentación. Aquí, una chinche hembra vigila su puesta posada sobre una hoja de abedul.



las ninfas se apretujan cuando les amenaza algún peligro

### MÉTODOS DE AUTODEFENSA

La mejor defensa de un artrópodo es su cutícula, que puede ser muy resistente o correosa. Las afiladas púas cuticulares y las protuberancias (verrugas e hinchazones), o la capacidad de enrollarse, incrementan la protección que brinda el exoesqueleto. Las mandíbulas y las extremidades sirven para golpear a los enemigos: la pata posterior de una langosta puede herir a muchos depredadores.

Los métodos físicos de defensa pueden complementarse con la emisión de sonidos desagradables, o de olores o sustancias repelentes. Muchas chinches segregar compuestos de fuerte olor con sus glándulas torácicas. Los hemípteros que chupan savia, como los pulgones, se rodean de hormigas; éstas se sienten atraídas por la ligamaza rica en azúcares, el excremento de los pulgones, y, a cambio, los protegen de los depredadores. Algunos artrópodos tienen colores brillantes que advierten de su toxicidad; algunas especies muestran bruscamente ocelos u otras manchas para asustar.



expansiones a modo de hoja

### < CAMUFLAJE

Muchos insectos se confunden con el entorno, o imitan hojas secas, ramitas, espinas, deyecciones de aves, piedras, o incluso mimetizan a otras especies más peligrosas.



las púas y los pelos disuaden a los depredadores

### Δ PÚAS VENENOSAS

Las sustancias tóxicas se producen dentro del cuerpo o se obtienen de una planta nutricia venenosa. Suelen almacenarse en partes externas del cuerpo.



la coloración de la Gitana advierte de su mal sabor

### Δ COLORES VIVOS

Los colores vivos y contrastados (aposemáticos) avisan sobre la presencia de defensas químicas. Algunas especies "engañan" porque no son venenosas.



## INSECTOS SOCIALES

**L**A MAYORÍA DE LOS artrópodos son solitarios y sólo se reúnen para aparearse. Algunos, que son gregarios, se agrupan para defenderse o para compartir un recurso alimenticio. Las

### AVISPAS Y ABEJAS SOCIALES

Las hembras reproductoras o reinas fundan y dirigen las colonias. Ponen huevos y luego crían unas pocas obreras (hembras estériles). A partir de entonces, delegan la construcción del nido, la defensa de la colonia y la alimentación y cuidado de las crías al creciente número de obreras. Las reinas pueden determinar el sexo de su progenie reteniendo el esperma si prefieren machos (los machos se producen con huevos no fertilizados y las hembras con huevos fertilizados).



especies sociales (todas las hormigas y termes, algunas avispas y abejas) colaboran en la colonia para cuidar de las crías, se dividen el trabajo y tienen un solapamiento de las generaciones.



una obrera amplía el avispero

**<PANAL DE MIEL**  
El nido de la abeja de la miel tiene panales de cera verticales divididos en celdas hexagonales donde se crían las larvas y se acumula la miel.

### Δ AVISPERO

Las avispas sociales y los avispones construyen nidos con fibras de madera masticadas. Las celdas horizontales contienen las larvas en desarrollo.

### INSECTOS MIGRADORES

Algunos artrópodos realizan migraciones periódicas de un lugar a otro para hallar alimentos o lugares para la puesta. Las hormigas legionarias (ver pág. 184) y la Langosta migratoria *Locusta migratoria* (Acrididae, ver pág. 64) son insectos migradores. La migración más larga entre los insectos es la de la Mariposa de los cardos, *Cynthia cardui* (Nymphalidae, ver pág. 174), que puede recorrer hasta 6.440 km de Norteamérica a Islandia. Algunas arañas son transportadas a centenares de kilómetros por el viento.



### VIAJEROS DE LARGA DISTANCIA

La Mariposa monarca (*Danaus plexippus*), viaja desde sus cuarteles de invierno en México hasta EE UU y Canadá.

### HORMIGAS

Pertenecen a la gran familia Formicidae, son muy abundantes y tienen un gran impacto sobre los ecosistemas terrestres. En la mayoría de hábitats, son los depredadores principales.

Viven en colonias que varían de un puñado de individuos hasta decenas de millones. Por lo general tienen castas hembra (reina), macho y obrera. Las obreras son siempre hembras estériles y ápteras; las más grandes también hacen de soldados que defienden la colonia. La reproducción suele darse entre los machos alados y las hembras. Después de aparearse, los machos suelen morir y las hembras pierden sus alas. La casta se determina sobre todo por la comida que las larvas reciben: una dieta baja en proteínas produce una obrera y una alta en proteínas una reina. La cabeza y las mandíbulas de los soldados están a menudo modificadas según la casta y la especie, y pueden estar especializadas en triturar semillas o desmembrar enemigos.

transportando una hoja

### Δ HORMIGAS

#### CORTADORAS DE HOJAS

En América Central y del Sur, son unos de los principales herbívoros y también los peores insectos plaga. Sus nidos subterráneos pueden tener más de 5 m y contener millones de obreras.



### TERMES

Contrariamente a otros insectos sociales, los termes pueden digerir celulosa. En algunas regiones tropicales son muy abundantes y destructores, y pueden devorar un tercio de la producción anual de madera muerta, hojas y hierba. Viven en colonias sociales permanentes con castas bien diferenciadas. En general, tienen una sola reina, un rey y unos pocos machos reproductores más. Puede haber termes reproductores suplementarios, que se tornan activos si algo le sucede a la reina. Los soldados, a diferencia de las hormigas, son machos y hembras estériles. Las obreras parecen ninfas y son la casta más numerosa. Su función es construir y reparar el termitero, ir en busca de alimentos y alimentar a las ninfas.



### TERMITERO

Una colonia de termes puede ser desde diminuta hasta una estructura que se extiende tanto por encima como bajo tierra.

chimenea de aire central

almacén de comida  
cámara de producción de huevos



### DENTRO DEL NIDO

La estructura interna de muchos termiteros grandes permite que el aire circule para que la temperatura interior se regule con una oscilación inferior a 1°C. El aire viciado y rico en dióxido de carbono sale al exterior.



## HÁBITATS

**L**OS INSECTOS Y OTROS artrópodos terrestres se encuentran por todo el planeta, desde las cimas nevadas hasta los tórridos valles desérticos, pero su distribución no es uniforme. Aparte de algunas especies de ácaros y mosquitos

del Antártico y de algunos insectos chupadores de sangre, como los mosquitos culícidos, muy pocos viven cerca de los polos. Cuanto más se acerca uno al ecuador, más abundan, tanto en cantidad como en diversidad.

### ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

La supervivencia y la persistencia de la mayoría de artrópodos se deben a su tamaño pequeño, su cutícula protectora y su capacidad de reproducirse con rapidez (ver pág. 14), pero muchos tienen también estrategias especiales para sobrevivir. Cuando las condiciones son demasiado calurosas o secas, muchos se aletargan y otros hibernan en las zonas frías. Varios insectos, y sobre todo algunas hormigas, pueden funcionar con temperaturas muy altas de más de 65°C. Así mismo, algunos pueden soportar muy bien el frío y sobreviven a temperaturas de -40°C.

### CONSERVACIÓN

Antes se creía que sólo valía la pena proteger a los mamíferos y las aves, pero esta actitud está variando al conocer cada vez mejor la importancia de los insectos en los ecosistemas del mundo. Algunos insectos raros están hoy protegidos por leyes internacionales y muchos países están empezando a dictar leyes. Pero primero hay que evitar la destrucción de los hábitats para que las especies sobrevivan.



#### MONTAÑAS

Las especies que viven en montañas están adaptadas al frío, la lluvia y el viento. La vegetación disminuye con la altitud y, por ello, los artrópodos menguan.



PÉRLIDO



#### SELVA TROPICAL

Estos hábitats exuberantes y húmedos cubren una parte muy pequeña del planeta (6% aprox.), pero se estima que contienen más o menos el 50 % de las especies de artrópodos del mundo.

ORNI-  
TÓPTERA  
DE PRÍAMO

#### BOSQUES TEMPLADOS

Los bosques templados tienen una fauna rica y variada. El fértil suelo, los árboles de hoja ancha, la honda hojarasca y la madera en descomposición son ideales para los artrópodos.



AGELÉNIDO



#### PRADERAS TEMPLADAS

Albergan a muchas especies de insectos pero, si se usan intensamente para los cultivos, la diversidad disminuye.


CHINCHE DE  
LAS PLANTAS

#### SABANA

Las copas de los árboles albergan una diversificada fauna de artrópodos, sobre todo de hormigas y termitas. El pastoreo excesivo es una amenaza.



BRACÓNIDO



#### CUEVAS Y DESIERTOS

Las especies que viven en cuevas soportan la oscuridad y la humedad. Muchas son ciegas y apteras. Las que viven en desiertos soportan una temperatura y aridez extremas.



BOTRIÚRIDO



#### AGUAS DULCES

Albergan una fauna de artrópodos única. Tan sólo un 5 % de las especies de insectos son acuáticas en parte de su ciclo vital pero influyen mucho en las cadenas alimentarias acuáticas.



BARQUERO



#### COSTAS MARINAS

Muchos insectos habitan entre las rocas, las plantas de la arena y las algas marinas en descomposición. Abundan los escarabajos y moscas. Unos pocos insectos pueden bucear de vez en cuando.

COCHINILLA  
DE LA  
HUMEDAD

#### CIUDADES Y JARDINES

Muchos artrópodos medran en las ciudades. Algunos viven en edificios o están asociados con las basuras. El jardín puede albergar a numerosas especies de artrópodos.



ABEJORRO



## ESTUDIAR LOS INSECTOS

**EL LECTOR PODRÁ** aprender mucho sobre los insectos en las obras de referencia, pero si desea comprender su mundo tendrá que observarlos pacientemente. Para saber cómo

### QUÉ NECESITARÁ

No es necesario un gran desembolso para estudiar a los insectos. Pueden fabricarse varios tipos de redes de recolección (ver pág. opuesta). He aquí otros artículos que necesitará o le serán útiles:

- Una lupa de bolsillo (de 10 aumentos) y una lupa de mano de pocos aumentos.
- Una cámara y un cuaderno para tomar notas y dibujar los ejemplares.
- Una cinta métrica y un cronómetro para medir las velocidades a la carrera o en vuelo.
- Un tamiz para cribar la hojarasca.
- Un aspirador (ver página opuesta), para recoger pequeños insectos sin dañarlos.
- Un salobre, un par de botas de goma y unos pocos contenedores de plástico para observar las especies acuáticas.

teje su tela una araña, lo mejor es sentarse y esperar. Los insectos son una fuente inagotable de fascinación y merece la pena observar sus ajetreadas vidas.



### IDENTIFICAR INSECTOS


Identificar el orden a que pertenece un insecto es bastante fácil con un poco de práctica, pero identificar la especie es mucho más difícil. Algunos insectos son muy distintivos, pero muchos se parecen bastante a otras especies y sólo se diferencian por características que únicamente son observables con una lupa.



### FOTOGRAFÍA

Una cámara reflex de una lente (SLR) con un objetivo macro de 50 o 100 mm es lo ideal. La mayoría de los zooms con una posición de macro no bastan para fotografiar pequeños insectos. El flash maximiza la profundidad de campo.

cuaderno de notas para los bocetos y dibujos y para las notas



### BOCETOS

El dibujo es un medio excelente de registrar lo que ve y también aprenderá mucho con una observación detallada. No olvide registrar cuándo y dónde encontró el insecto.

las flores son buenos lugares para fotografiar insectos

### LA RECOLECCIÓN DE INSECTOS

En general, hay que interceptar los insectos con redes de mano, salobres o aspiradores mientras vuelan, nadan o reptan. Capturarlos con trampas, con algún cebo, también es efectivo. En las regiones tropicales, la fruta que está en fase de descomposición atraerá muchos insectos, como las mariposas; el estiércol atraerá centenares de escarabajos. Un trozo de pescado podrido en una botella de plástico le permitirá capturar moscas y algunas avispas parásitas.

Si desea descubrir cuán abundante es una especie en una zona específica en comparación con otro lugar, debe realizar pruebas idénticas en cada zona para que los resultados sean precisos. Asegúrese de cubrir la misma superficie, usar el mismo número de trampas o de tamizar el mismo volumen de hojarasca. No olvide lavarse las manos después.



**BANDEJA RECOLECTORA**  
Una bandeja o una tela blanca colocada bajo una rama es un buen sistema para capturar insectos: basta con agitarla.



**RED DE MARIPOSAS**  
Debe ser de malla fina y capturar cualquier insecto volador. La que aquí se muestra tiene un mango extensible.



### EL ASPIRADOR

Con él podrá recoger pequeños insectos de una bandeja recolectora, aspirándolos con un tubo hacia un contenedor.



### TRAMPA EN EL SUELO

Para capturar insectos corredores y otros artrópodos, hunda una taza de plástico en el suelo como se muestra en la foto.

### ATRAER INSECTOS HACIA SU JARDÍN

Un jardín con zonas descuidadas atraerá muchas más formas de vida salvaje que uno muy bien cuidado. La variedad también es buena: una amplia gama de hábitats y microhábitats atraerá una fauna diversificada de insectos y otros animales. No use nunca pesticidas.

Intente no podar o desbrozar en exceso la vegetación que podría atraer a los insectos. Deje que la madera se descomponga naturalmente y construya un montón de compost con los restos vegetales de la cocina y del jardín. Muchas especies viven en la materia vegetal en descomposición y el compost es bueno para su jardín. Las flores ricas en néctar, como por ejemplo las de lavanda, atraen a las mariposas, las moscas cernidoras y las abejas.



### CREAR UNA ZONA DE VIDA SALVAJE

Un estanque rodeado de plantas herbáceas es ideal para atraer a la fauna salvaje y en él se refugiarán muchos artrópodos. Hágalo tan grande como pueda: los insectos acuáticos lo colonizarán enseguida.



## CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

ESTA CLAVE sirve para identificar los especímenes hasta el nivel taxonómico del orden. Primero conteste las preguntas de las claves 1 y 2. Éstas le conducirán al catálogo de familias y

especies de este libro, ya sea directamente o ya a través de los órdenes que aparecen en las claves 3 a 6. En general hará falta una inspección a fondo con una lupa de bolsillo.

## CLAVE 1: ARTRÓPODOS TERRESTRES

## ¿TIENE PATAS?

Aquí, "patas" significa extremidades que se usan sobre todo para andar.

NO

Podría ser la larva o la pupa de un insecto. O también un gusano o algún otro tipo de invertebrado no contemplado en esta obra.

Sí

## ¿CUÁNTOS PARES?

Observe bien el espécimen. Si es de tamaño pequeño, use una lupa.

3 PARES

## HEXÁPODOS

Ir a Clave 2  
(pág. 37)

4 PARES

## ARÁCNIDOS

Ir a Clave 6  
(págs. 44-45)

7 PARES

## COCHINILLA DE LA HUMEDAD (Isopoda)

- 0,5-1,5 cm de longitud
  - cuerpo plano
  - 7 segmentos principales (6 terminales más pequeños)
  - muchas especies se enrollan
- Ver pág. 212



8 PARES O MÁS

## PAURÓPODOS (Pauropoda)

- menos de 2 mm de longitud
  - ciegos
  - cuerpo blando
- Ver pág. 238



## SÍNFILOS (Symphyla)

- 1-8 mm de longitud
  - ciegos
  - cuerpo blando
- Ver pág. 239



## MILPIÉS (Diplopoda)

- 0,5-30 cm de longitud
  - 2 pares de patas en cada segmento que lleva patas (después del cuarto)
- Ver pág. 242



## CIEMPIÉS (Chilopoda)

- 0,5-25 cm de longitud
  - un par de patas por segmento con patas
  - primer par de patas modificado en uñas de veneno
- Ver pág. 240



## CLAVE 2: HEXÁPODOS

## ¿TIENE ALAS?

Fíjese bien, las alas pueden ser muy pequeñas o estar ocultas bajo los élitros.

Sí

## INSECTO ALADO

Ir a Clave 4  
(págs. 40-43)

NO

## HEXÁPODOS NO INSECTOS

Estos pequeños artrópodos de seis patas son bastante primitivos. Se distinguen de los insectos por sus piezas bucales.

## INSECTO INMADURO

Podría no ser un espécimen adulto. En muchos órdenes, los estadios inmaduros parecen adultos pequeños pero sin alas ni genitales.



## INSECTO SIN ALAS

Puede ser un insecto adulto áptero. Ir a Clave 3 (págs. 38-39)

## COLÉMBOLOS (Collembola)

- menos de 5 mm de longitud
  - a veces tienen un órgano saltador (fúrcula) que pliegan bajo su abdomen
  - forma del cuerpo alargada o globular
- Ver pág. 207



## DIPLUROS (Diplura)

- 0,5-5 cm de longitud
  - ciegos
  - un par de apéndices a modo de cola o de pinzas al final del abdomen
- Ver pág. 211



## PROTURROS (Protura)

- menos de 2 mm de longitud
  - ciegos
  - pálidos
  - cuerpo blando
  - antenas muy cortas o ausentes
  - cabeza puntiaguda
- Ver pág. 210





## CLAVE 3: INSECTOS SIN ALAS

Algunos insectos son siempre ápteros (p. ej., pulgas, piojos, arqueognatos y pececillos de plata). Pero en muchos órdenes donde casi todas las especies tienen alas bien desarrolladas, también

las hay con alas muy pequeñas o ausentes. Las que viven en cuevas y en islas oceánicas suelen carecer de alas. Además, un espécimen sin alas puede ser un insecto alado inmaduro.

## SIEMPRE SIN ALAS

PULGAS  
(Siphonaptera)

- 1-8 mm de longitud
  - pardas con el cuerpo aplanado lateralmente
  - a menudo se encuentran sobre animales o dentro de nidos
  - pueden saltar con agilidad
- Ver pág. 135

PIOJOS  
(Phthiraptera)

- 0,1-1 cm de longitud
  - cuerpo plano
  - se encuentran en el pelo o en las plumas de los animales huéspedes
  - ojos pequeños o ausentes
  - patas modificadas para agarrarse al huésped
- Ver pág. 83

PECECILLOS DE PLATA  
(Thysanura)

- 0,2-2 cm de longitud
  - tres filamentos caudales
  - segmentos abdominales con pequeñas proyecciones ventrales
  - ojos pequeños que no se tocan
  - no saltan
- Ver pág. 47

ARQUEOGNATOS  
(Archaeognatha)

- 0,7-1,5 cm de longitud
  - tres filamentos caudales
  - segmentos abdominales con infimas proyecciones
  - los ojos se tocan
  - cuerpo arqueado
  - pueden saltar
- Ver pág. 46



## CASI SIEMPRE SIN ALAS

TERMES  
(Isoptera)

- 0,3-2 cm de longitud
  - cuerpo pálido
  - viven en colonias
- Ver pág. 78



## OCASIONALMENTE SIN ALAS

ABEJAS Y HORMIGAS  
(Hymenoptera)

- 0,25-70 mm de longitud
  - a menudo con poca "cintura"
  - primer segmento abdominal fusionado con el tórax
  - muchas viven en colonias
  - a menudo tienen un aguijón
- Ver pág. 178

INSECTOS PALO  
(Phasmatodea)

- 1-30 cm de longitud
  - cuerpo con aspecto de palo
  - patas muy separadas
- Ver pág. 66

PSOCÓPTEROS  
(Psocoptera)

- 1-9 mm de longitud
  - cuerpo blando y rechoncho
  - dorso giboso de frente
  - cabeza grande y frente bulbosa
  - ojos saltones o algo atrofiados
- Ver pág. 81

CHINCHES, CIGARRAS  
Y AFINES (Hemiptera)

- 0,1-10 cm de longitud
  - las piezas bucales forman un tubo debajo de la cabeza
  - las antenas tienen menos de diez artejos
- Ver pág. 85

"MOSCAS" ESCORPIÓN  
(Mecoptera)

- 0,3-3 cm de longitud
  - cabeza alargada hacia abajo formando un pico
- Ver pág. 133

TRIPS  
(Thysanoptera)

- 0,5-12 mm de longitud
  - cuerpo esbelto y alargado
  - grandes ojos con facetas
- Ver pág. 101

MOSCAS  
(Diptera)

- 0,5-60 mm de longitud
  - protórax muy pequeño
  - a menudo alas vestigiales (balancines)
- Ver pág. 136

MARIPOSAS NOCTURNAS  
(Lepidoptera)

- cuerpo cubierto de escamas
  - trompa usualmente en espiral
- Ver pág. 158





## CLAVE 4: INSECTOS CON ALAS

Estos órdenes contienen sobre todo insectos alados, aunque hay algunos sin alas. Algunos escarabajos y hemípteros pueden parecer ápteros hasta que se examinan con detalle.

Las alas son a menudo muy pequeñas o están ocultas. Además del color y la forma el modo en que se llevan también ayuda a la identificación.

## COMUNES EN TODOS LOS HÁBITATS

## MARIPOSAS DIURNAS Y NOCTURNAS (Lepidoptera)

- 0,3-30 cm de envergadura
- cuerpo y alas cubiertos de escamas
- trompa a menudo enrollada en espiral
- antenas largas y filiformes

Ver pág. 158



## MOSCAS (Diptera)

- 0,5-60 mm de longitud
- sólo un par de alas (alas posteriores modificadas como balancines; algunas veces difíciles de ver)
- protórax muy pequeño

Ver pág. 136



## NOTA

Fíjese bien: si las alas anteriores y las posteriores están unidas por diminutos ganchos o pelos, el espécimen pertenece al orden Hymenoptera (ver pág. 178).

## ESCARABAJOS (Coleoptera)

- hasta 18 cm de longitud
- alas anteriores endurecidas, formando élitros
- los élitros pueden dejar parte del abdomen al descubierto

Ver pág. 109



## ABEJAS, AVISPAS Y HORMIGAS (Hymenoptera)

- 0,25-70 mm de longitud
- a menudo con "cintura"
- alas anteriores más anchas o más largas que las posteriores
- alas unidas en vuelo por unos ganchos diminutos
- muchas especies viven en colonias

Ver pág. 178



## CHINCHES, CIGARRAS Y AFINES (Hemiptera)

- 0,1-10 cm de longitud
- las piezas bucales forman un corto tubo bajo la cabeza
- alas anteriores más largas que las posteriores
- a veces glándulas "apestosas"

Ver pág. 85



## NOTA

Fíjese bien: las piezas bucales pueden ser difíciles de ver en algunas especies.

## SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN TORNO A AGUAS DULCES

## EFEMERAS (Ephemeroptera)

- 0,5-4 cm de longitud
- alas anteriores grandes, triangulares y dispuestas verticalmente
- abdomen con 2 o 3 filamentos (colas)

Ver pág. 48



## FRIGÁNEAS (Trichoptera)

- 0,2-4 cm de longitud
- cuerpo esbelto, con pelos, de mariposa nocturna.
- antenas delgadas y filiformes

Ver pág. 156



## "MOSCAS" DE LAS PIEDRAS (Plecoptera)

- 0,3-5 cm de longitud
- alas plegadas en torno al cuerpo
- cercos conspicuos
- ojos saltones
- cuerpo rectangular

Ver pág. 56



## ZIGOPTEROS Y LIBÉLULAS (Odonata)

- 4-15 cm de longitud
- abdomen largo y cilíndrico
- ojos grandes
- alas de igual tamaño
- segmentos torácicos inclinados hacia atrás

Ver pág. 51



## MEGALÓPTEROS (Megaloptera)

- 1-15 cm de longitud
- al descansar, pliegan las alas en tejadillo
- alas largas de tamaño similar
- abdomen blando

Ver pág. 103





## CLAVE 4: INSECTOS ALADOS

## OTROS INSECTOS ALADOS

**TERMES**  
(Isoptera)

- 0,3-2 cm de longitud
  - alas con venas longitudinales y finas venas transversales
  - sólo los reproductores tienen alas y éstas se desprenden después del corto vuelo nupcial
  - cercos muy pequeños
  - viven en colonias
- Ver pág. 78

**"MOSCAS" SERPIENTE**  
(Raphidioptera)

- 0,6-3 cm de longitud
  - al descansar pliegan las alas en tejadillo
  - cefalotórax alargado
- Ver pág. 104

**HORMIGAS LEÓN, CRISOPAS Y AFINES**  
(Neuroptera)

- 0,2-9 cm de longitud
  - pliegan las alas en tejadillo
  - venación reticular, con muchas venas transversales
- Ver pág. 105

**PSOCÓPTEROS**  
(Psocoptera)

- 1-9 mm de longitud
  - cuerpo blando y rechoncho
  - dorso giboso cuando se ve de frente
  - cabeza grande con una frente bulbosa
  - ojos saltones o algo atrofiados
- Ver pág. 81

**GRILLOS Y SALTAMONTES**  
(Orthoptera)

- 0,5-15 cm de longitud
  - alas anteriores resistentes y correosas
  - patas anteriores a menudo grandes
  - el pronoto se extiende hacia abajo por los lados
  - a menudo emiten sonidos con sus alas o sus patas
- Ver pág. 60

**CUCARACHAS**  
(Blattodea)

- 0,3-10 cm de longitud
  - cuerpo plano y ovalado
  - pronoto en forma de escudo que a menudo cubre la cabeza
  - alas anteriores endurecidas
  - alas posteriores membranosas
- Ver pág. 74

**INSECTOS PALO E INSECTOS HOJA**  
(Phasmatodea)

- 1-30 cm de longitud
  - forma de palo o de hoja
  - patas muy separadas
- Ver pág. 66

**MÁNTIDOS**  
(Mantodea)

- 0,8-15 cm de longitud
  - patas anteriores modificadas para la captura de presas
  - protórax alargado
  - alas anteriores endurecidas
  - alas posteriores grandes y membranosas
- Ver pág. 71

**TIJERETAS**  
(Dermaptera)

- 0,5-5 cm de longitud
  - pinzas en el extremo del abdomen
  - cuerpo plano y alargado
  - alas anteriores cortas y duras
  - alas posteriores plegadas cuando descansan
  - abdomen telescópico y móvil
- Ver pág. 69

**"MOSCAS" ESCORPIÓN**  
(Mecoptera)

- 0,3-2,8 cm de longitud
  - cabeza alargada hacia abajo formando un pico
  - alas de tamaño similar
- Ver pág. 133



## CLAVE 5: OTROS ÓRDENES

Algunos insectos son muy pequeños y no es probable encontrarlos en el campo. Las hembras de algunas especies pasan su vida ocultas en un insecto huésped.

**TEJEDORES**  
(Embioptera)

- 0,3-2 cm de longitud
  - segmento de las patas anteriores engrosado
  - viven gregariamente en túneles de seda
- Ver pág. 77

**ESTREPSÍPTEROS**  
(Strepsiptera)

- hasta 3,5 cm de longitud
  - las hembras son ápteras y viven dentro de otros insectos
  - los machos tienen las alas posteriores en forma de abanico y unos ojos que parecen moras
- Ver pág. 132



HEMBRA



MACHO

**ZORÁPTEROS**  
(Zoraptera)

- menos de 5 mm de longitud
  - aspecto de termes
  - pueden ser alados o ápteros
- Ver pág. 80

**GRILLOBLÁTIDOS**  
(Grylloblattodea)

- 1,2-3 cm de longitud
  - se encuentran en las regiones frías del oeste de Norteamérica y del este de Asia
- Ver pág. 59






## CLAVE 6: ARÁCNIDOS

Son artrópodos ápteros con cuatro pares de patas. Aunque tienen aspectos muy diversos, los grupos principales son fáciles de reconocer. Las arañas son las más conocidas. Tienen hileras (órganos que segrega seda) y algunas

se identifican por el tipo de tela. Los escorpiones tienen unas pinzas distintivas en la punta de sus potentes pedipalpos y una "cola" abdominal móvil con aguijón. Los pseudoscorpiones se les parecen, pero son

#### ARAÑAS (Araneae)

- hasta 9 cm de longitud
  - pedipalpos relativamente cortos
  - primer par de patas similar en tamaño a los otros pares
  - el abdomen no segmentado lleva el órgano productor de seda
- Ver pág. 228



#### AMBLIPIGIOS (Amblypygi)

- hasta 4,5 cm de longitud
  - cuerpo rechoncho con el cefalotórax ancho
  - pedipalpos grandes y espinosos
  - primer par de patas muy largo
- Ver pág. 220



#### SOLÍFUGOS (Solifugae)

- hasta 7 cm de longitud
  - pedipalpos a modo de patas
  - grandes quelíceros dirigidos hacia delante
- Ver pág. 217



#### OPILIONES (Opiliones)

- hasta 15 cm de longitud
  - los pedipalpos tienen seis segmentos
  - patas generalmente largas y delgadas
  - abdomen segmentado (algunas veces difícil de ver)
- Ver pág. 221



#### ESCORPIONES (Scorpiones)

- hasta 18 cm de longitud
  - cuerpo aplanado
  - pedipalpos grandes y provistos de pinzas
  - el abdomen tiene una "cola" larga, articulada y provista de aguijón
- Ver pág. 213



#### GARRAPATAS Y OTROS ÁCAROS (Acari)

- hasta 3 cm de longitud
  - el cuerpo no tiene divisiones aparentes
  - patas por lo general cortas
  - abdomen no segmentado
- Ver pág. 223



#### UROPIGIOS (Uropygi)

- hasta 7,5 cm de longitud
  - pedipalpos poderosos
  - el abdomen tiene una cola a modo de látigo
- Ver pág. 219



#### PSEUDOESCORPIONES (Pseudoscorpiones)

- hasta 1,2 cm de longitud
  - cuerpo aplanado
  - pedipalpos como pequeñas pinzas de escorpión
  - abdomen ovalado con 11 o 12 segmentos
- Ver pág. 215



mucho más pequeños y sin "cola". Los uropigios tienen una "cola" en forma de látigo, y en los amblipigios el primer par de patas es muy largo y en forma de látigo. Las garrapatas y los demás ácaros son redondeados. Dada la

peligrosidad de varias especies, evite manipularlas si no está seguro de cuál se trata. De hecho, la gran mayoría son inofensivas. Los escorpiones y otros arácnidos peligrosos sólo pican al hombre para defenderse.



# INSECTOS

## ARQUEOGNATOS

**E**L ORDEN DE LOS ARQUEOGNATOS comprende 2 familias y 350 especies. Estos insectos primitivos y carentes de alas parecen jorobados cuando se los observa lateralmente. Tienen piezas bucales simples, tres ocelos y grandes ojos (compuestos) que se tocan en lo alto de la cabeza. El abdomen tiene en el extremo tres colas largas, siendo la mediana la más larga. Debajo,

tiene unas pequeñas protuberancias, los estilos, para desplazarse mejor por superficies empinadas.

Son ametábolos y continúan mudando durante toda su vida. Los machos depositan un paquete de esperma que la hembra recoge con sus genitales. Éstas ponen pequeños grupos de huevos en grietas y hendeduras, y los jóvenes tardan dos años en alcanzar la madurez.

Orden	ARCHAEOGNATHA	Familia	MACHILIDAE	N.º de especies	250
-------	---------------	---------	------------	-----------------	-----

### ARQUEOGNATOS SALTADORES

Estos insectos alargados están cubiertos con escamas que forman dibujos de tono pardo apagado o gris oscuro. Muchos corren con rapidez y saltan.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos en pequeños grupos, en grietas y hendeduras, y los jóvenes tardan unos dos años en madurar. Se alimentan de líquen, algas y detritos vegetales.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En herbazales de zonas boscosas o costeras, bajo las piedras, en la hojarasca y en la materia vegetal en descomposición.



colas abdominales



Δ Las especies del género *PETROBIUS* se encuentran en zonas costeras, principalmente por encima de la marea alta.

*PETROBIUS MARITIMUS* es una especie de coloración apagada común en las costas rocosas. Cuando se le molesta, salta hacia arriba impulsándose con el abdomen.

Longitud Hasta 1,2 cm

Alimentación de la ninfa

## PECECILLOS DE PLATA

**L**AS 4 FAMILIAS Y 370 ESPECIES de pececillos de plata que forman el orden de los tisanuros son insectos primitivos y sin alas, con un cuerpo plano y alargado que puede tener escamas. Tienen piezas bucales simples y pueden tener ojos compuestos pequeños y muy separados, o no tener ninguno. La mayoría carecen de ocelos. Las tres colas abdominales son de igual longitud y, como en los ar-

queognatos, los segmentos abdominales tienen estilos. Este orden muestra más variación morfológica que los arqueognatos y ocupa más hábitats.

Los machos depositan esperma en hilos de seda que colocan en el suelo para que las hembras los recojan con sus genitales. Éstas ponen sus huevos en grietas y hendeduras. Sus ninfas son holometábolos y se desarrollan sin metamorfosis aparente.

Orden	THYSANURA	Familia	LEPISMATIDAE	N.º de especies	190
-------	-----------	---------	--------------	-----------------	-----

### LEPISMÁTIDOS

Tienen el cuerpo parduzco, fusiforme, algo aplanado, y, en general, con escamas grisáceas o plateadas. Tienen ojos compuestos sin ocelos y son nocturnos. Algunos prefieren los lugares frescos y húmedos, y otros los secos y calientes.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos en grietas y hendeduras.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas.

En las bóvedas arbóreas, bajo las piedras y en cuevas; algunas viven en las casas o en nidos de aves, hormigas o termitas.


• **OBSERVACIÓN** Las especies domésticas comen harina, telas húmedas, tapas de libros y engrudo del papel de paredes.



Δ LOS LEPISMÁTIDOS (este espécimen es de una especie no identificada) tienen el cuerpo parduzco y escamoso. Alcanzan la madurez después de diez o doce mudas.

escamas moteadas

*THERMOBIA DOMESTICA*, el Insecto del fuego, vive en todo el planeta. Prefiere los hábitats cálidos, como zonas cercanas a hornos y tuberías calientes. Las antenas son tan largas como el cuerpo, y los pelos más largos de la parte dorsal se agrupan en los márgenes posteriores de los anillos corporales.



Longitud 0,8-2cm

Alimentación de la ninfa



## EFEMERAS

**L**AS 23 FAMILIAS y 2.500 especies del orden de los efemerópteros –las efemer– comprenden los insectos alados más primitivos y antiguos, y los únicos que mudan después de haberles crecido alas funcionales. Son comunes en mayo aunque muchos pueden encontrarse en otras épocas del año.

Las efemeras tienen el cuerpo blando, las patas largas y por lo general dos pares de alas. Las alas anteriores son grandes y triangulares; las posteriores son pequeñas y pueden estar ausentes. Las efemeras no pueden plegar sus alas hacia atrás, sino que las llevan hacia arriba o hacia abajo. Los adultos no se alimentan


y viven muy poco, y de ahí su nombre; algunas especies sobreviven apenas un día. Los apareamientos se producen en enjambres, al alba o al atardecer, y las hembras dejan caer sus huevos en el agua. La metamorfosis es incompleta. Las ninfas acuáticas, que tienen branquias abdominales laterales y tres colas terminales, comen plantas sumergidas. Cuando completan su desarrollo, ascienden a la superficie y mudan en una forma con alas de colores apagados, el estadio subimago, y abandonan el agua. Después de un período que varía entre una hora y varios días, la muda final revela el adulto de alas brillantes.

Orden EPHMEROPTERA	Familia BAETIDAE	N.º de especies 900
--------------------	------------------	---------------------


### EFEMERAS PEQUEÑAS

Pueden ser de color claro u oscuro o negro, con marcas amarillentas o grises. Las alas anteriores son alargadas y redondeadas, y en algunas especies las alas posteriores son pequeñas o están ausentes.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el agua. Las ninfas son nadadoras e hidrodinámicas, o levemente planas y se arrastran. Comen algas de la superficie.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolita. En arroyos, ríos, charcas y lagos.
- **OBSERVACIÓN** Viven en lugares más altos y fríos que otros miembros del orden.



**BAETIS RHODANI** prefiere los arroyos de curso rápido. Este espécimen está en la fase subimago, cuyas alas tienen colores apagados.



**CLOEON DIPTERUM** es una especie europea que cría en diversos hábitats acuáticos, desde estanques y acequias hasta abrevaderos y tinas.

Longitud 0,3–1,4 cm; la mayoría 0,4–0,8 cm


Alimentación de la ninfa

Orden EPHMEROPTERA	Familia EPHEMERELLIDAE	N.º de especies 170
--------------------	------------------------	---------------------

### EFEMERÉLIDOS

Son medianos, con tres colas abdominales y una coloración apagada u oscura.

- **CICLO VITAL** Suelen poner los huevos en un amasijo, que se disgrega. Las ninfas suelen comer materia orgánica en descomposición.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas; raros en el hemisferio sur. En ríos, arroyos, charcas y lagos, entre los detritos o en el cieno.
- **OBSERVACIÓN** Estas efemeras se utilizan como modelos de “moscas” artificiales para pescar la trucha a la mosca.



Las especies de *EPHEMERELLA* son comunes en y en torno a los ríos y arroyos de curso rápido. Aquí se muestra un adulto recién emergido.

Longitud 0,6–1,4 cm

Alimentación de la ninfa


  

Orden EPHMEROPTERA	Familia EPHEMERIDAE	N.º de especies 150
--------------------	---------------------	---------------------

### EFEMÉRIDOS

Las alas de estas grandes efemeras son de coloración clara o parduzca, aunque en algunas especies están moteadas de oscuro. Hay dos o tres largas colas al final del abdomen.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el agua. Las ninfas cavan madrigueras en el cieno del fondo con la cabeza y las mandíbulas dentadas. Suelen comer finas partículas de materia orgánica que extraen del fondo cenagoso.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, excepto en Australia. En arroyos, ríos y lagos.
- **OBSERVACIÓN** Las “moscas” artificiales que se usan en la pesca de la trucha toman estas efemeras como modelo.



**EPHEMERA DANICA** es una especie europea muy grande. Cría en ríos y lagos con el fondo cenagoso o arenoso. Aquí, una hembra espera sobre una planta a unirse con un enjambre de apareamiento.

Longitud 1–3,4 cm

Alimentación de la ninfa



Orden	EPHEMEROPTERA	Familia	HEPTAGENIIDAE	N.º de especies	500
-------	---------------	---------	---------------	-----------------	-----

## HEPTAGÉNIDOS

Estas efemeras de cabeza plana son marrón oscuro, con alas transparentes y dos colas abdominales largas.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el agua. Las ninfas son activas y viven bajo las piedras y la vegetación, o sobre detritos. Algunas nadan mal y se aferran a las rocas y piedras en el fondo de su hábitat. La mayoría raspan algas o comen partículas finas de materia orgánica.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, excepto en Australia y Nueva Zelanda; raras en América del Sur. En y en torno a charcas, lagos y arroyos de curso rápido.



**LAS NINFAS** son planas y oscuras. Nadan y son muy móviles.



*ECDYONURUS DISPAR* es común en Europa. Prefiere las orillas de los lagos y ríos de fondo pedregoso. Este espécimen está en fase subimago de alas oscuras.

Longitud 0,4–1,5 cm; la mayoría 1 cm


Alimentación de la ninfa

Orden	EPHEMEROPTERA	Familia	LEPTOPHLEBIIDAE	N.º de especies	600
-------	---------------	---------	-----------------	-----------------	-----


## LEPTOFLÉBIDOS

La mayoría con venas oscuras longitudinales en las alas. Los ojos de los machos están divididos en una región dirigida hacia arriba con grandes facetas, y otra hacia abajo con facetas más pequeñas. El abdomen lleva tres largas colas.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el agua. Las ninfas se arrastran, son planas y viven bajo las piedras y en los detritos. La mayoría raspan algas o comen partículas finas orgánicas; unas pocas comen huevos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En arroyos y ríos; junto a charcas.
- **OBSERVACIÓN** Los adultos se utilizan como modelos de "moscas" artificiales para la pesca de la trucha.



**LAS NINFAS** parecen saltamontes vistas de lado. Tienen branquias bifurcadas.



*LEPTOPHLEBIA VESPERTINA* está muy difundida en Europa, cerca de lagos y arroyos. Aquí, una efemera en fase subimago antes de mudar al adulto de alas brillantes.

Longitud 0,4–1,4 cm; la mayoría 0,8 cm

Alimentación de la ninfa

## ZIGOPTEROS Y LIBÉLULAS

**L**AS 5.500 ESPECIES y 30 familias del orden de los odonatos se conocen como libélulas y zigopteros. Estos últimos están representados desde los calopterígidos hasta los pseudoestigmátidos. Luego, aparecen las libélulas, desde los ésnidos hasta los libelúlidos.

La cabeza de estos insectos tiene piezas bucales masticadoras, antenas cortas y ojos compuestos muy grandes. En los zigopteros, es ancha, ojos espaciados, y en las libélulas redondeada, con los ojos menos separados. Ambos pares de alas son parecidos en los zigopteros, mientras que las alas posteriores de las libélulas son

más anchas que las anteriores. Cuando descansan, los zigopteros pliegan las alas y las libélulas las dejan extendidas. Los primeros suelen posarse para esperar a las presas apropiadas y las libélulas cazan en vuelo.

Los machos curvan su abdomen para transferir el esperma desde una abertura genital en el noveno segmento abdominal hasta un órgano de acumulación en el segundo o tercero. Cuando se aparean, eliminan a veces el esperma de apareamientos anteriores. La puesta se realiza en el agua. La metamorfosis es incompleta. Las ninfas acuáticas son depredadoras y tienen un "labium" articulado.

Orden	ODONATA	Familia	CALOPTERYGIDAE	N.º de especies	150
-------	---------	---------	----------------	-----------------	-----

## ZIGOPTEROS DE ALAS ANCHAS

Son bastante grandes y tienen unas alas que se estrechan gradualmente sin pedúnculo aparente. Son a menudo oscuras y en los machos pueden tener marcas rojas en la base o distintivas franjas oscuras. Si lo tienen, el pterostigma es pequeño.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en los tejidos de varias plantas acuáticas. Una sola hembra puede poner hasta 300 huevos y a veces se sumerge en el agua. Las ninfas cazan presas en aguas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas; raras en Australia. En ríos y canales.
- **OBSERVACIÓN** Los adultos pueden cazar a cierta distancia del agua y prefieren las zonas boscosas.



**LAS NINFAS** tienen la cabeza pequeña y tres filamentos branquiales prominentes, en forma de solapa.



*CALOPTERYX VIRGO* tiene coloración metálica. El macho de la figura es azul verdoso con las alas oscuras; las hembras, verdes, tienen las alas de color pardoamarillento pálido.

Envergadura 5–8 cm

Alimentación de la ninfa




Orden Odonata	Familia COENAGRIONIDAE	N.º de especies 1.000
---------------	------------------------	-----------------------

## CENAGRIÓNIDOS


Estos esbeltos zigópteros son de color azul pálido con marcas oscuras. Se posan con sus alas relativamente estrechas plegadas sobre el cuerpo. Los machos suelen tener colores más brillantes que las hembras, que tienden a ser grisáceas o verdosas.

- **CICLO VITAL** La hembra pone sus huevos en el agua mientras el macho todavía la está agarrando por el cuello. Practica hendeduras en los tallos de las plantas acuáticas e inserta pequeñas series de huevos. Cuando cazan, las ninfas trepan por la vegetación.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones templadas. En charcas, estanques, ciénagas y arroyos, incluso en aguas salobres.



**LAS NINFAS** son esbeltas, con tres filamentos branquiales estrechos.

**COENAGRION PUEBLA** se encuentra a menudo cerca de aguas estancadas. Aquí se muestra la hembra verdosa.


Envergadura 2-4,5 cm      Alimentación de la ninfa 

Orden Odonata	Familia LESTIDAE	N.º de especies 160
---------------	------------------	---------------------

## LÉSTIDOS


Suelen ser verdes y azul brillantes, con un brillo metálico. Cada ala tiene una base estrecha y peduncular, y un pterostigma rectangular oscuro en el borde frontal. Cuando se posan, adoptan una postura vertical, con la cabeza hacia arriba y las alas extendidas. Los machos tienen unos apéndices en forma de pinzas en el extremo del abdomen.

- **CICLO VITAL** Las hembras ponen pequeñas series de huevos dentro de las partes aéreas de las plantas acuáticas. Las ninfas pueden encontrarse agarradas a la vegetación en aguas tranquilas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En zonas pantanosas o cenagosas y en charcas, estanques, lagos o arroyos de curso lento.



**LAS NINFAS** son alargadas y de verde claro a marrón oscuro.

**LESTES SPONSA**, o zigópteros esmeralda, tiene el cuerpo de color verde oscuro metálico. Se encuentra en Europa y en el centro y sur de Asia.


Envergadura 3-7,5 cm      Alimentación de la ninfa 

Orden Odonata	Familia PSEUDOSTIGMATIDAE	N.º de especies 20
---------------	---------------------------	--------------------

## ZIGOPTEROS GIGANTES


También llamados zigópteros helicópteros, tienen el abdomen muy largo. Además del pterostigma en el borde frontal del ala, hay una marca sobre varias celdas alares diferente en las alas anteriores y en las posteriores.

- **CICLO VITAL** Las hembras ponen los huevos —uno solo por cada emplazamiento— en huecos de árboles o en el agua que se acumula en las hojas de las plantas epífitas. En algunas especies, el macho vigila la puesta.
- **DISTRIBUCIÓN** América Central y del Sur. Bosques tropicales.
- **OBSERVACIÓN** En sus tierras natales, se cree que estos insectos son espíritus de los muertos.



**LAS NINFAS** son cortas y cilíndricas, con las patas esbeltas. Se nutren de larvas de insectos y crustáceos.

**MEGALOPREPUS COERULATUS** es el odonato que tiene mayor envergadura. Como todas las especies de su familia, apresa arañas y las devora.


Envergadura 6-17 cm; abdomen hasta 14 cm      Alimentación de la ninfa 

Orden Odonata	Familia AESHNIDAE	N.º de especies 420
---------------	-------------------	---------------------

## ÉSNIIDOS


Incluyen algunas de las libélulas más potentes y grandes. Tienen ojos grandes y oscuros, con marcas verdes o azules. Las alas tienen un largo pterostigma.

- **CICLO VITAL** Las hembras ponen pocos huevos en hendeduras que practican en la vegetación viva o muerta.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Cerca de aguas estancadas y de zonas pantanosas; en senderos, setos vivos y ciudades.



**LAS NINFAS** son robustas, con ojos grandes y el cuerpo cilíndrico.

**TETRACANTHAGYNA PLAGIATA** es un ésnido muy grande de Borneo. Es la mayor libélula que existe actualmente.

Envergadura 6-14 cm; la mayoría 6,5-9 cm      Alimentación de la ninfa 




Orden ODONATA	Familia CORDULEGASTERIDAE	N.º de especies 50
---------------	---------------------------	--------------------


## CORDULEGASTERÍDOS

Estas grandes libélulas son parduzcas o negras, con marcas amarillas. Los ojos se tocan en un punto y tienen un largo abdomen.

- **CICLO VITAL**  
Ponen sus huevos en el fondo de ríos de curso rápido. Las ninfas viven enterradas dejando expuestas la cabeza y las patas anteriores para capturar las presas que pasan. Pueden tardar hasta cinco años en madurar y muchas especies tienen una vida adulta de pocas semanas.
- **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte. En arroyos de montaña o de tierras arboladas; algunas veces sobre terrenos abiertos cerca de charcas.



**CORDULEGASTER BOLTONII** está ampliamente difundido por las tierras altas de Europa. Sus marcas abdominales doradas son distintivas.




Envergadura 8-12 cm Alimentación de la ninfa \*

Orden ODONATA	Familia CORDULIIDAE	N.º de especies 400
---------------	---------------------	---------------------


## CORDÚLIDOS

Con frecuencia muy peludos, son de color pardo oscuro o negro, o bien tienen un brillo metálico verde, rojo o azul. El abdomen puede ser largo y cilíndrico o bien aplanado. Los ojos se tocan y tienen una denticulación bien visible en el margen posterior.

- **CICLO VITAL** Después de aparearse, las hembras vuelan por encima del agua y sumergen su abdomen para liberar unos cuantos huevos dentro. Una sola hembra puede poner más de 2.000 huevos. Las ninfas suelen desarrollarse en aguas estancadas y cazan presas en el fondo.
- **DISTRIBUCIÓN**  
Cosmopolitas. Comunes en torno a aguas estancadas; algunas veces junto a torrentes.



**CORDULIA AENEA** se encuentra en gran parte de Europa, tiene el cuerpo peludo y el abdomen verde.



Envergadura 2-5 cm Alimentación de la ninfa \*


Orden ODONATA	Familia GOMPHIDAE	N.º de especies 950
---------------	-------------------	---------------------

## GÓNIFIDOS


Los machos, y a menudo las hembras, de estas libélulas relativamente grandes tienen un abdomen de forma inusual: está hinchado justo antes del ápice, lo que le da un aspecto de porra.

Tienen los ojos muy separados y presentan coloraciones brillantes en distintas combinaciones de negro, amarillo o verde.

- **CICLO VITAL** Se aparean entre la vegetación. La hembra realiza su puesta en aguas someras, azotando la superficie con el extremo del abdomen para liberar los huevos. Las ninfas viven en el fondo, por donde se arrastran o cavan para capturar sus presas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En charcas, estanques, lagos, ríos y arroyos.



**GOMPHUS VULGATISSIMUS** es una libélula que se encuentra en partes del norte y del centro de Europa.




Envergadura 6-12 cm Alimentación de la ninfa \*

Orden ODONATA	Familia LIBELLULIDAE	N.º de especies 1.300
---------------	----------------------	-----------------------


## LIBELÚLIDOS

Estas libélulas tienen un vuelo impredecible. Muchas especies tienen el cuerpo robusto y a menudo ostentan colores brillantes. Las alas pueden tener marcas oscuras e irregulares.

- **CICLO VITAL** Las hembras se ciernen sobre el agua y hunden su abdomen o lo agitan debajo de la superficie para liberar los huevos, que caen al fondo. Las ninfas cazan en el lodo o en las plantas.
- **DISTRIBUCIÓN**  
Cosmopolitas. En diversos hábitats, incluidos bosques y zonas montañosas, cerca de arroyos de curso lento, charcas y ciénagas.



**LIBELLULA DEPRESSA** es una especie europea que vuela en junio y julio. Sus ninfas tardan tres años en madurar.



Envergadura 2-9,5 cm Alimentación de la ninfa \*



## "MOSCAS" DE LAS PIEDRAS

**L**AS 15 FAMILIAS Y 2.000 especies de "moscas" de las piedras forman el orden de los plecópteros. El cuerpo de estos insectos es liso, aplanao y esbelto. El alargado abdomen termina en un par de colas (cercos), y las patas son robustas. Aunque los plecópteros tienen dos pares de alas, carecen de un vuelo potente y nunca se encuentran muy lejos del agua. Las piezas bucales están poco desarrolladas o ausentes. En muchas especies, los adultos tienen una vida breve y no se alimentan en absoluto.

En los rituales de cortejo de estos insectos, los machos de muchas especies atraen a las hembras tamborileando el

suelo con la parte inferior del abdomen o haciéndolo vibrar. En la mayoría de especies, los machos forman dúos con las hembras: emiten sonidos de cortejo y se contestan mutuamente. Después de aparearse sobre materia vegetal o en el suelo, las hembras ponen sus huevos en el agua. La mayoría de las ninfas acuáticas tienen penachos branquiales y dos filamentos en el extremo del abdomen. Las ninfas sufren más de 30 mudas.

Los plecópteros se encuentran en todo el mundo pero son especialmente comunes en las regiones templadas más bien frías. Hay cinco familias que sólo se encuentran en el hemisferio sur.

Orden PLECOPTERA	Familia CAPNIIDAE	N.º de especies 250
------------------	-------------------	---------------------

### CÁPNIIDOS

La mayoría de estos plecópteros esbeltos son oscuros, pardos o negros. Las colas abdominales y las antenas pueden ser tan largas como el cuerpo.

- **CICLO VITAL** Los adultos emergen en invierno para aparearse.
- **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte. Junto a arroyos y lagos.

**LAS NINFAS** varían del amarillo al pardo y tienen unos pelos cortos y unas largas antenas.

*antenas largas*  
*cuerpo esbelto y de coloración oscura*  
*colas abdominales largas en adultos y ninfas*

**CAPNIA BIFRONS** es una especie cuyo macho, que aquí se muestra, carece de alas.

Longitud 0,5–2,5 cm Alimentación de la ninfa

Orden PLECOPTERA	Familia LEUCTRIDAE	N.º de especies 200
------------------	--------------------	---------------------

### MOSCAS AGUJA

Cuando se posan, estos plecópteros esbeltos y pardos mantienen las alas plegadas o abarquilladas en torno al cuerpo.

- **CICLO VITAL** Los adultos suelen emerger al empezar el año para aparearse y poner sus huevos en el agua.
- **DISTRIBUCIÓN** En el hemisferio norte. A menudo junto a pequeños arroyos o lagos.

**LAS NINFAS** son esbeltas y de color amarillento.

*cabeza dirigida hacia abajo*  
*patas esbeltas*

Las especies del género **LEUCTRA** tienen una coloración apagada. Al posarse abarquillan las alas.

Longitud 0,6–1,3 cm; la mayoría menos de 1 cm Alimentación de la ninfa

Orden PLECOPTERA	Familia NEMOURIDAE	N.º de especies 400
------------------	--------------------	---------------------

### NEMÚRIDOS

Suelen tener el cuerpo robusto y de color pardo. Muchas tienen un dibujo alar moteado y unos cercos muy cortos.

- **CICLO VITAL** Suelen emerger como adultos, aparear y poner sus huevos en el agua en primavera y verano. Las ninfas tienen una coloración muy apagada, con espinas y pelos en el cuerpo. Suelen comer detritos y algas; algunas especies comen hojas.
- **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte. Junto a lagos, manantiales y arroyos de curso rápido.

**LAS NINFAS:** esbozos alares no paralelos al cuerpo.

*alas transparentes*  
*distintiva vena curva*  
*alas posteriores melladas*  
*cuerpo delgado y oscuro*

**NEMOURA CAMBRICA** es un plecóptero de cuerpo esbelto, común en Europa. Típico de esta familia, tiene una coloración parduzca y vive cerca de los arroyos.

Longitud 0,6–1,5 cm Alimentación de la ninfa

Orden PLECOPTERA	Familia PERLIDAE	N.º de especies 400
------------------	------------------	---------------------

### PÉRLIDOS

De coloración general amarilla o parda, conservan diminutos restos de los penachos branquiales en la parte inferior del tórax, cerca de la base de las alas.

- **CICLO VITAL** Ponen una pelota de huevos pegajosos en el agua. Las ninfas tardan años en madurar y son depredadoras en algunos hábitats.
- **DISTRIBUCIÓN** En todo el mundo excepto Australia. Sobre la vegetación, cerca de aguas corrientes.
- **OBSERVACIÓN** Algunas especies de esta familia toleran muy bien las altas temperaturas.

**LAS NINFAS** tienen branquias ramificadas en el tórax y también en el abdomen

*antenas largas*  
*coloración parduzca*  
*cercos largos*  
*cuerpo aplanado*  
*distintivo dibujo en "doble escalera" en las venas de las alas anteriores*  
*alas posteriores anchas*

**NEOPERLA CLYMENE** es común en los arroyos norteamericanos. Otras especies en ríos anchos.

**DINOCRAS CEPHALOTES** es una especie europea cuyas ninfas pueden mudar más de 30 veces y tardar cinco años en madurar.

Longitud 1–4,8 cm; la mayoría menos de 2,5 cm Alimentación de la ninfa



Orden PLECOPTERA

Familia PERLODIDAE

N.º de especies 250

## PERLÓDIDOS

Son de amarillo pálido a marrón oscuro. Tienen un pronoto oscuro y unas largas colas abdominales.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en arroyos, en primavera. Las ninfas emergen como adultos a fines de primavera o a principios de verano. Los adultos son activos de día, rara vez se alimentan y la mayoría mueren poco después de haber puesto los huevos. Las ninfas son depredadoras; de muy jóvenes, pueden comer materia vegetal o podrida.

• **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte. En y en torno a arroyos de tamaño mediano a grande, con el fondo pedregoso.



**LAS NINFAS** tienen un aspecto céreo, con un dibujo claro y oscuro y patas largas.

**HYDROPERLA CROSBY** es una especie norteamericana. Ambos sexos se intercambian mensajes con unos sonidos tamborileantes especiales.



lista central roja amarillenta en la cabeza y el pronoto

coloración parduzca

cercos multisegmentados

Longitud 0,8–5 cm; la mayoría menos de 2,5 cm

Alimentación de la ninfa

Orden PLECOPTERA

Familia PTERONARCYIDAE

N.º de especies 12

## “MOSCAS” DE LAS PIEDRAS GIGANTES

Los adultos de esta familia tienen el cuerpo ancho y corpulento. Su coloración es gris o parda. Estos plecópteros suelen ser activos después del ocaso.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos oscuros y redondeados en el agua. Las ninfas tardan hasta tres años en desarrollarse y desmenuzan plantas acuáticas y detritos. Los adultos no se alimentan.

• **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte.

En arroyos y ríos.

• **OBSERVACIÓN** *Pteronarcys californica* es la bien conocida “mosca salmón” que se usa para pescar truchas en Norteamérica.



**LAS NINFAS** pueden ser grandes, con expansiones laterales en el tórax y el abdomen.

ojos relativamente grandes

alas plegadas en torno al cuerpo cuando descansa

ALAS PLEGADAS



**PTERONARCELLA BADIA** es una especie muy difundida en parte del oeste de Norteamérica.



zona del ala posterior sin venas transversales

ALAS ABIERTAS

cercos

Longitud 3,5–6,5 cm

Alimentación de la ninfa

## GRILLOBLÁTIDOS

**E** L ORDEN DE LOS GRILLOBLÁTIDOS consta de una familia dividida en 25 especies. Estos insectos pequeños y sin alas se descubrieron en las Rocas Canadienses en 1906, y se consideraron una familia primitiva del orden de los ortópteros (ver págs. 60-65).

Los grilloblátidos tienen unos cercos finos en el extremo del abdomen. La pequeña cabeza lleva unas antenas filiformes con 22 a 40 segmentos y unas mandíbulas simples, mordedoras y dirigidas hacia delante. Los ojos pueden ser pequeños o inexistentes. Los primeros estadios recuerdan tijeretas inmaduras, y las hembras tienen un corto ovopositor.

Habitan en el este de Asia y en Norteamérica. La mayoría de especies son del género *Grylloblatta*, autóctono de EEUU y Canadá. Sus miembros están adaptados a la alta montaña y a las bajas temperaturas, y se encuentran en la madera en descomposición o moviéndose sobre las rocas, la nieve y el hielo después del ocaso.

Los grilloblátidos son buenos cazadores, tanto nocturnos como diurnos, y comen presas vivas, recién muertas, arrastradas por el viento o inactivas. También pueden comer musgo y materia vegetal, especialmente cuando son jóvenes. La metamorfosis es incompleta.

Orden GRILLOBLATTODEA

Familia GRILLOBLATTIDAE

N.º de especies 25

## GRILLOBLÁTIDOS

Estos insectos son de color marrón pálido, pardoamarillento o gris. El cuerpo está cubierto de pelos cortos, que pueden ser densos o ralos.

• **CICLO VITAL** El apareamiento puede durar hasta cuatro horas, y la hembra puede tardar varios meses en poner sus huevos en madera descompuesta, musgo, grietas rocosas o el suelo. La ninfa puede tardar más de cinco años en desarrollarse y tener hasta nueve estadios.

• **DISTRIBUCIÓN** En las zonas más frías del hemisferio norte. En bosques alpinos caducifolios, zonas montañosas y cuevas calcáreas.



cabeza plana

abdomen de color más claro a los lados

coloración general amarillón pálido

cercos

ovopositor más corto que los cercos

Δ **GRILLOBLATTA CAMPODEIFORMIS** vive a grandes altitudes, en Norteamérica y Canadá, cerca de glaciares, sobre rocas y en conos de desmoronamiento húmedos.



pronoto rectangular

palpos

mandíbulas dirigidas hacia delante

antenas

Las especies del género **GRILLOBLATTA** viven bajo las piedras y en terrenos abiertos en otoño y en primavera. Pasan los veranos bajo tierra.

Longitud 1,2–3 cm

Alimentación



## GRILLOS Y SALTAMONTES

**L**AS 28 FAMILIAS Y 20.000 especies de grillos, saltamontes y afines forman el orden de los ortópteros. Tienen piezas bucales masticatorias y patas posteriores adaptadas para el salto. La mayoría de especies tienen las alas anteriores endurecidas.

Estos insectos ocupan una amplia gama de hábitats terrestres. El canto es una pauta común, por lo general utilizada por los machos para atraer a las hembras, y la

metamorfosis es incompleta. Hay dos subórdenes: Ensifera y Caelifera. Los ensíferos, típicos de las regiones tropicales y subtropicales, comprenden los grillos y los saltamontes longicornios (la selección de este libro va de Gryllacrididae a Tettigoniidae). Los celíferos, que son dominantes en las regiones templadas, comprenden los saltamontes y las langostas (de Acrididae a Tettigidae).

Orden ORTHOPTERA

Familia GRILLACRIDIDAE

N.º de especies 600

## GRILLOS ENROLLADORES DE HOJAS

Muchos enrollan hojas para formar un nido donde se ocultan de día. Las antenas son largas y filiformes. En las hembras, el ovopositor es largo —más que el cuerpo— y se curva un poco hacia arriba.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en la corteza o en la vegetación y algunas veces en el suelo.

• **DISTRIBUCIÓN** En regiones tropicales. En árboles; a veces, en el suelo.



*HYALOGRYLLACRIS SUBDEBILIS* se encuentra en partes del sur y del norte de Australia.



Las especies de *GRYLLACRIS* cazan pequeños insectos después del ocaso.

Longitud 2–6 cm

Alimentación 兼

Orden ORTHOPTERA

Familia GRILLIDAE

N.º de especies 4.000

## GRILLOS VERDADEROS

Son algo aplanados, con la cabeza redonda y las antenas largas y filiformes. Cuando existen, llevan las alas plegadas sobre el cuerpo. La mayoría muestran varios tonos de negro o de pardo. Los machos emiten cantos de cortejo con las crestas de la base de las alas anteriores. En las hembras, el ovopositor es conspicuo y cilíndrico o en forma de aguja.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el suelo húmedo. Las especies carnívoras o grillos arbóreos los ponen en pequeños grupos dentro del tejido vegetal. Puede haber hasta 12 estadios ninfales.

• **DISTRIBUCIÓN**

Cosmopolitas. En bosques, prados, monte bajo y herbazales. La mayoría viven en el suelo.

• **OBSERVACIÓN**

Algunas especies son famosas por su canto y en algunos países las tienen como mascotas.



*GRYLLUS BIMACULATUS* es un grillo común en África, en el sur de Europa y en Asia.

El género *BRACHYTRUPES* incluye algunas especies plaga que pueden atacar las semillas de cultivos valiosos como el té, el tabaco y el algodón.

Longitud 0,5–5 cm

Alimentación 兼

Orden ORTHOPTERA

Familia GRYLLOTALPIDAE

N.º de especies 60

## GRILLOS TOPO

Excavadores y parduzcos —cubiertos de pelos aterciopelados y patas anteriores cortas y anchas, adaptadas para excavar— recuerdan topes en miniatura. Son robustos y tienen las alas anteriores cortas y correosas.

• **CICLO VITAL** Se aparean en la superficie y realizan la puesta en cámaras subterráneas. Hay unos diez estadios ninfales, y las ninfas permanecen bajo tierra, donde comen raíces, tallos de plantas y pequeñas presas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En túneles de hasta 20 cm de longitud, en la arena o el suelo húmedo cerca de arroyos.

• **OBSERVACIÓN** Los machos producen sonidos frotando ambas patas anteriores. Sus madrigueras tienen túneles acampanados que amplifican el canto hasta la superficie.



*GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA*, el Alacrán cebollero, puede ser una plaga para la hierba, las hortalizas y otros cultivos. Es una especie protegida en el Reino Unido.

Longitud 2–4,5 cm

Alimentación 兼



Orden ORTHOPTERA	Familia RAPHIPOPHORIDAE	N.º de especies 500
------------------	-------------------------	---------------------

## GRILLOS DE LAS CUEVAS

Son rechonchos, jorobados y carentes de alas, y tienen patas posteriores y antenas muy largas. Éstas se mueven hacia delante y hacia atrás para sondear el entorno en la oscuridad y detectar a los depredadores que se acercan. Tienen colores apagados, pardos o grises. Algunos adaptados a las cuevas tienen los ojos atrofiados y el cuerpo blando.

• **CICLO VITAL** Los huevos se depositan en el sustrato de la cueva y las ninfas buscan su alimento al eclosionar. Algunas ninfas comen plantas en las entradas de las cuevas.

• **DISTRIBUCIÓN** Muy difundidos, especialmente en las regiones cálidas. En cuevas y en otros lugares húmedos, bajo las piedras.

• antenas muy largas para detectar a los depredadores

fémur posterior grueso

• distintivo dorso jorobado

• patas posteriores largas, adaptadas para el salto

*DIESTRAMMENA MARMORATA* tiene las patas posteriores muy largas, con gruesos fémures y un moteado distintivo.



*PHOLEOGRYLLUS GEERTSI* es una especie autóctona del norte de África y de parte del sur de Europa.

Longitud 1,3–3,8 cm

Alimentación

Orden ORTHOPTERA	Familia STENOPELMATIDAE	N.º de especies 40
------------------	-------------------------	--------------------

## GRILLOS REALES

Algunos reciben el nombre de wetas o grillos de Jerusalén. En su mayoría son insectos grandes gruesos y ápteros, con la cabeza grande y las antenas cortas. Las patas son robustas y las tibiae tienen hileras de fuertes espinas que se utilizan para excavar. La mayoría de las especies son marrón oscuro o negras. Los adultos salen de sus madrigueras subterráneas sólo después del ocaso.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen los huevos en el suelo. Puede haber nueve o diez estadios ninfales.

• **DISTRIBUCIÓN** Regiones tropicales cálidas. En madera podrida y bajo tierra.

• patas robustas

• dos hileras de afiladas espinas tibiales

• cerros cortos

• patas posteriores mucho mayores que los otros dos pares

• ovopositor



Longitud 3,8–8 cm

Alimentación

Orden ORTHOPTERA	Familia TETTIGONIIDAE	N.º de especies 6.000
------------------	-----------------------	-----------------------

## SALTAMONTES LONGICORNIOS

También denominados saltamontes o langostas de matorral, lo más apropiado sería llamarlos grillos de matorral. Son pardos o verdes, con alas en pendiente a ambos lados del cuerpo. Muchos imitan hojas, corteza o líquen, y algunos muestran los colores brillantes de sus alas posteriores para asustar a los depredadores.

• **CICLO VITAL** Los machos cantan, usando un sistema de “rascador y lima” situado en la base de las alas anteriores. Las hembras ponen hileras de huevos en las plantas o en el suelo. Cinco o seis estadios ninfales.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en regiones tropicales. Sobre la vegetación y en bosques, desde el nivel del suelo hasta el dosel arbóreo.

▷ *SATHROPHYLLIA RUGOSA*, de la India, imita el aspecto de la corteza y es muy difícil de ver cuando reposa.

▽ *METRIOPTERA BRACHYPTERA* vive en prados húmedos y está muy difundido por Europa.

• los adultos de esta especie tienen las alas cortas



• la coloración pardo crema se confunde con la corteza



• el contorno irregular incrementa el parecido con las hojas

• ovopositor delgado y en forma de hoz para poner los huevos dentro del tejido vegetal

• antenas muy largas y multi-segmentadas

• alas muy cortas en ambos sexos

• piezas bucales dirigidas hacia abajo

△ *OMMATOPTERA PICTIFOLIA* vive en Brasil. Imita las hojas muertas y permanece muy quieto cuando algún depredador se acerca.

▽ *LEPTOPHYES PUNCTATISSIMA*, o Saltamontes verde punteado, es común en arbustos, árboles y herbazales. La hembra tiene un ovopositor grande y en forma de espada.

• coloración verde brillante

• ovopositor




Longitud 1,5–7,5 cm, la mayoría 3,5–5 cm

Alimentación



Orden ORTHOPTERA	Familia ACRIDIDAE	N.º de especies 10.000
------------------	-------------------	------------------------


  

<p><b>SALTAMONTES</b></p> <p>La mayoría con una coloración y un dibujo crípticos, aunque algunos tienen una brillante coloración "advertidora" y producen sustancias químicas nocivas. Las antenas son siempre cortas. Las hembras, que son casi siempre mayores que los machos, no tienen un ovopositor conspicuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Los machos cantan durante el día para atraer a las hembras. Después de aparearse, éstas ponen montones de huevos en el suelo, protegidos por una sustancia segregada por la hembra.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en zonas cálidas. En el suelo y entre la vegetación.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Muchos saltamontes son plagas agrícolas. Las especies plaga más notorias –las langostas– pueden formar enormes enjambres.</li> </ul> <p><i>SCHISTOCERCA GREGARIA</i>, la Langosta africana del desierto, es muy destructora. Los enormes enjambres pueden devorar hasta 100.000 toneladas de alimentos al día.</p>	
--	---

Longitud 1–8 cm, la mayoría 1,5–3 cm	Alimentación
--------------------------------------	--------------

Orden ORTHOPTERA	Familia EUMASTACIDAE	N.º de especies 1.200
------------------	----------------------	-----------------------


  

<p><b>EUMASTÁCIDOS</b></p> <p>La cabeza es alargada y forma un ángulo con el tórax. Muchas especies son brillantes, y otras parecen hojas o palos. Las patas posteriores son finas y alargadas, con distintivas espinas en la mitad inferior de las tibiae. Al posarse, extienden sus patas posteriores hacia los lados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Para aparearse, el macho monta sobre la hembra, que pone sus huevos en el suelo o en detritos.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Sudeste de Asia, India, África, América del Norte y del Sur, en regiones tropicales y subtropicales. En diversos hábitats, incluidos terrenos arbolados, bosques y herbazales.</li> </ul>	 <p><i>CHOROTYPUS GALLINACEUS</i> tiene una coloración parda y un aspecto de hoja que le dan un efectivo camuflaje.</p>
--	---

Longitud 1,5–5,8 cm	Alimentación
---------------------	--------------

Orden ORTHOPTERA	Familia PYRGOMORPHIDAE	N.º de especies 600
------------------	------------------------	---------------------


<p><b>PIRGOMÓRFIDOS</b></p> <p>Algunos tienen una coloración críptica o de camuflaje; otros presentan colores brillantes y se defienden produciendo sustancias espumosas y tóxicas. El cuerpo puede ser delgado, pero suele ser bastante robusto, con protuberancias torácicas romas. Algunos adultos viajan en pequeños enjambres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Las hembras ponen sus huevos en el suelo, en madera en descomposición, o en grietas de la corteza. Las ninfas pueden ser gregarias y migrar a varios kilómetros.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Regiones tropicales, en África y Asia. En zonas con mucha vegetación.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Algunas especies son plagas.</li> </ul> <p>◁ Las especies de <i>PYRGOMORPHA</i> están difundidas por África, desde el Sáhara hasta el Transvaal. Algunas son graves plagas.</p>	
---	--

Longitud 1–8,5 cm	Alimentación
-------------------	--------------

Orden ORTHOPTERA	Familia TETRIGIDAE	N.º de especies 1.200
------------------	--------------------	-----------------------

<p><b>SALTAMONTES DE TIERRA</b></p> <p>Tienen un distintivo pronoto que se extiende hacia atrás cubriendo el abdomen, y que a menudo acaba en punta. En algunas especies, el engrosado pronoto adopta la forma de hojas o piedras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Las hembras ponen sus huevos en el suelo húmedo. Cinco estadios ninfales.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, sobre todo en las regiones más cálidas. Sobre suelos desnudos escasamente recubiertos de vegetación, en zonas boscosas y húmedas, y a orillas de ciénagas y lagos.</li> </ul>	 <p><i>TETRIX SUBULATA</i> puede nadar bajo el agua y vive en Asia y Europa.</p>
---	---

Longitud 0,6–1,8 cm, la mayoría en torno a 1,5 cm	Alimentación
---	--------------



## INSECTOS PALO E INSECTOS HOJA

**H**AY 3 FAMILIAS Y UNAS 2.500 especies de insectos palo y hoja en el orden de los phasmatodeos. La mayor de las tres familias es la Phasmatidae.

Estos insectos alargados, herbívoros y de movimientos lentos suelen ser nocturnos. De día, se protegen de los depredadores por su parecido con hojas o palos. Cuando se sienten amenazados, se quedan inmóviles, con las patas muy pegadas al cuerpo. Los

machos son menores que las hembras. Muchos machos tienen alas, mientras que las hembras son ápteras. La mayoría de hembras dejan caer sus huevos o chasquean el extremo del abdomen para diseminarlos. Unas pocas ponen huevos en el suelo o los enganchan a las plantas. Algunos son muy parecidos a semillas y atraen a las hormigas, que los llevan a su nidos. La metamorfosis es incompleta.

Orden	PHASMATODEA	Familia	PHASMATIDAE	N.º de especies	2.450
-------	-------------	---------	-------------	-----------------	-------

### INSECTOS PALO

Se alimentan de noche y son pardos o verdes y espinosos o verrugosos. Las hembras suelen ser ápteras y los machos tener alas. Aunque pueden ser cortas o largas, las anteriores protegen unas alas posteriores mayores y en forma de abanico.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos en el suelo o adheridos a plantas. Las ninfas del primer estadio dependen de su coloración críptica para sobrevivir.

• **DISTRIBUCIÓN** En zonas tropicales y en algunas regiones templadas cálidas. Entre la vegetación o en el follaje de árboles y arbustos.

• **OBSERVACIÓN** Entre las tácticas de defensa se incluyen ruidos, olores, posturas y coloración críptica, o desprenderse de las patas cuando algún depredador las agarra (las patas vuelven a crecer).



Las especies del género *PHARNACIA* son insectos extremadamente esbeltos y en forma de palo. Mantienen las patas cerca del cuerpo cuando se asustan. Aquí se muestra una hembra sin alas. Este género se encuentra en la India.

Longitud 2,5–29 cm

Alimentación

Los machos de *EURYCANTHA CALCARATA* (en la imagen) tienen espinas grandes y afiladas en las patas posteriores. Estas patas tienen un potente reflejo que puede atrapar un dedo humano. Ambos sexos carecen de alas.



*ANISOMORPHA BUPRESTOIDES* puede regurgitar para disuadir a los depredadores. Los machos son transportados, durante largos períodos, por las hembras (en la ilustración).



*EXTATOSOMA TIARATUM*, o Espectro de Macleay, es una de las muchas especies fáciles de criar sobre hojas de zarzamora. La hembra, que aquí se muestra, pone una docena de huevos cada día de su vida adulta y utiliza su abdomen para arrojarlos a uno o dos metros de distancia.



*ANCHIALE MACULATA* es una especie esbelta de Papúa Nueva Guinea. Sus estrechas alas anteriores protegen las posteriores. Aquí se muestra el macho.



Orden PHASMATODEA

Familia PHYLLIIDAE

N.º de especies 30

## INSECTOS HOJA


El abdomen plano y expandido, los segmentos extendidos de las patas y la coloración verde y parda emulan las hojas, vivas o muertas. Cuando descansan, sus alas anteriores con venas bien marcadas pueden cubrir las posteriores transparentes, cuya textura, las manchas de color y su capacidad de ondear a la brisa completa el disfraz. Las antenas son cortas y lisas en las hembras, más largas y algo peludas en los machos.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos a modo de semillas en el suelo, donde eclosionan. Las ninfas comen de noche.

• **DISTRIBUCIÓN** Seychelles, sudeste de Asia, norte de Queensland (Australia) y Nueva Guinea. En hábitats con muchas vegetación.



◁ **PHYLLIUM BIOCULATA** es un "animal de compañía". Suele ser fácil de criar con una temperatura alta.



Longitud 3–11 cm

Alimentación

## TIJERETAS

EL ORDEN DE LOS DERMÁPTEROS es pequeño relativamente. Se divide en 10 familias que contienen alrededor de 1.900 especies. Estos insectos, denominados tijeretas, tienen unas alas anteriores cortas, sin venas, que protegen las alas posteriores grandes y en forma de abanico. El abdomen es móvil y telescópico, con un par de apéndices en forma de pinza, rectos en las hembras y curvos en los machos.

La metamorfosis es incompleta. Las hembras suelen poner sus huevos en el suelo, aunque algunas especies parásitas paren ninfas vivas. Tienen un gran instinto maternal ya que lamen y eliminan

las esporas fúngicas de sus huevos y los vigilan contra los depredadores. Estos cuidados continúan después de la eclosión. Alimentan sus ninfas trayéndoles comida al nido o regurgitando parte de su propia comida. Al final las ninfas tienen que dispersarse ya que, a medida que crecen, la madre empieza a considerarlas como un alimento potencial.

Las tijeretas mudan cinco veces. Aparte de aumentar de tamaño y el número de artejos en sus antenas en cada muda, son muy parecidas a sus progenitores.

A las tijeretas les gustan los lugares confinados. Su nombre alude a los dos apéndices en forma de pinza del abdomen.

Orden DERMAPTERA

Familia CARCINOPHORIDAE

N.º de especies 400

## CARCINOFÓRIDOS

La mayoría de estas especies de patas cortas carecen de alas posteriores, y en algunas también faltan las cortas y endurecidas alas anteriores. Coloración oscura, en tonos marrones oscuros, negros o rojizos, con marcas más pálidas rojas o amarillas. Las antenas tienen menos de 20 segmentos y las pinzas abdominales pueden no ser simétricas en los machos.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en madrigueras.

• **DISTRIBUCIÓN**

Cosmopolitas, en las regiones más cálidas. En una amplia gama de hábitats.

• **OBSERVACIÓN** Algunos son plagas significativas de flores y frutas cultivadas.



Las especies del género **CARCINOPHORA** viven sobre todo en Sudamérica y algunas en Norteamérica y en el Extremo Oriente. La especie representada tiene alas anteriores y posteriores.

▷ **TITANOLABIS COLOSSEA** es la tijereta de mayor tamaño. *Titanolabis* tiene cuatro especies, todas ellas nativas de Australia.

Longitud 0,7–5 cm

Alimentación



Orden	DERMAPTERA	Familia	FORFICULIDAE	N.º de especies	450
-------	------------	---------	--------------	-----------------	-----

## TIJERETAS COMUNES

Estas esbeltas tijeretas tienen formas variables, son pardas oscuras o pardo negruzcas, con las patas más pálidas y las antenas filiformes. Las pinzas abdominales de los machos son muy encorvadas y las de las hembras son rectas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el suelo, debajo de las piedras. Los defienden contra los depredadores y los limpian con saliva para evitar una infección por hongos. La dieta incluye materia vegetal, orugas, pulgones y otros insectos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas.

En la hojarasca y en el suelo, bajo la corteza o en grietas.

• **OBSERVACIÓN** Pueden ser plagas de los cultivos.

Las especies del género *ALLODAHLIA* se encuentran en India, Malasia y otras zonas del Extremo Oriente.



*FORFICULA AURICULARIA*, la Tijereta común, está hoy muy difundida y es una plaga notoria de las flores.

Longitud 1,2–2,5 cm

Alimentación \*

Orden	DERMAPTERA	Familia	LABIDURIDAE	N.º de especies	75
-------	------------	---------	-------------	-----------------	----

## LABIDÚRIDOS

Provistos de largas antenas, estos insectos robustos son pardorrojizos. Suelen tener alas, aunque algunas especies son ápteras. Las más comunes tienen listas oscuras en el pronoto y en los élitros.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos en hondos túneles que excavan en el suelo arenoso.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en las regiones más cálidas. En torno a costas, orillas fluviales y lodazales; en la hojarasca, la arena y los escombros, o debajo de piedras.

• **OBSERVACIÓN** Algunos pueden expeler un líquido nauseabundo producido por unas glándulas abdominales.

*LABIDURA RIPARIA* es cosmopolita. Vive en playas de arena, en costas y orillas fluviales.



► Hay 30 especies del género *FORCIPULA*. Viven en la arena húmeda y comen pulgas de mar.

Longitud 1,2–4 cm

Alimentación \*

## MÁNTIDOS

**E**L ORDEN DE LOS MÁNTIDOS comprende 8 familias y 2.000 especies. El nombre común de mantis religiosas alude al distintivo modo que tienen estos insectos de llevar las patas anteriores, levantadas y juntas, como si estuvieran rezando.

Aunque su forma varía, los mántidos presentan rasgos claramente reconocibles: la cabeza triangular con unos grandes ojos dirigidos hacia delante y un protórax alargado, y las patas anteriores modificadas para capturar presas vivas. Son excelentes cazadores. La cabeza es muy móvil: son los únicos insectos que pueden girar para "mirar por encima del hombro". Los ojos dirigidos hacia delante dan una auténtica

visión binocular y permiten un cálculo preciso de las distancias. Las patas anteriores están adaptadas para capturar la presa, en menos de una décima de segundo.

Los mántidos vuelan sobre todo de día y consumen artrópodos, e incluso ranas y lagartijas. Muchas especies evitan ser depredadas por los murciélagos gracias a un oído especial, detector de ultrasonidos, situado en la parte inferior del tórax.

Metamorfosis incompleta. La puesta se realiza dentro de una ooteca espumosa o de un material similar al papel, que se adhiere a las ramitas o a otras superficies. Las hembras de algunas especies defienden la ooteca frente a los depredadores.

Orden	MANTODEA	Familia	EMPUSIDAE	N.º de especies	30
-------	----------	---------	-----------	-----------------	----

## EMPÚSIDOS

Estos insectos suelen ser de gran tamaño y de formas esbeltas. La mayoría de especies tienen unas expansiones lobulares o en forma de hoja, muy distintivas, en los extremos de los fémures y a los lados del abdomen. Las tibias anteriores son distintivas, ya que tienen largas espinas alternadas con dos a cuatro espinas más cortas. La cabeza tiene una protuberancia lobular, y los machos tienen las antenas plumosas.


• **CICLO VITAL** Como es típico en los mántidos, las puestas se realizan dentro de una ooteca y las primeras ninfas mudan muy poco después de la eclosión.

• **DISTRIBUCIÓN** África, parte de la región mediterránea y Asia. Sobre flores, hojas y otra vegetación.

• **OBSERVACIÓN** Como sucede con todos los mántidos, el tamaño y la actividad de la presa se calibran con precisión.

Toda presa capaz de defenderse no es atacada si su tamaño es superior a la mitad del mántido.

Las especies del género *EMPUSA* son típicas, con sus expansiones y marcas en forma de hoja.



Longitud 4,5–9 cm

Alimentación \*



Orden MANTODEA

Familia HYMENOPIDAE


N.º de especies 50

## MANTIS FLOR

La viva coloración, incluidos los verdes y rosas brillantes, combinada con la ornamentación corporal, permite que se confundan con las flores sobre las que descansan. Algunas partes del cuerpo, como las patas, tienen anchas extensiones que parecen hojas. Las alas anteriores pueden tener espirales o franjas de colores, o bien marcas circulares y conspicuas en forma de ojo (ocelos). En las hembras, las alas son cortas.

• **CICLO VITAL** Los huevos son depositados en una ooteca que suele adherirse a la vegetación. Las jóvenes ninfas cazan pequeñas presas tan pronto como se endurece su cutícula.

• **DISTRIBUCIÓN** En regiones tropicales de todo el mundo, a excepción de Australia. En una amplia gama de vegetación.



◁ Las especies del género *Ctenopoma* tienen el aspecto típico de las mantis flor. Son abundantes en la India y el sudeste asiático.


la coloración se confunde con las flores

distintivas marcas en forma de ojo en las alas

ojos grandes y dirigidos hacia delante

expansiones a modo de hojas en las patas

ocelos brillantes con los márgenes negros



ornamentación puntiaguda en la cabeza

anchas extensiones a modo de hojas en las patas

marcas en las alas anteriores

patas anteriores bien desarrolladas

coloración bastante uniforme en conjunto

extremos alares más oscuros

Δ *Hymenopus coronatus* suele tener una coloración críptica que imita a las flores. Ésta varía mucho, en función del entorno inmediato en el que se desarrolla la ninfa; así, será roja si la ninfa pasa la primera parte de su vida en una flor roja.

◁ Las especies del género *Pseudocreobotra* tienen marcas de colores vivos en las alas, que pueden hacer destellar como advertencia cuando les amenazan.



Longitud 2-8 cm

Alimentación \*

Orden MANTODEA

Familia MANTIDAE

N.º de especies 1.400

## MANTIS RELIGIOSAS COMUNES

Muchos miembros de esta familia varían muy poco en cuanto a aspecto, y la mayoría son de color verde o pardo. Contrariamente a las mantis flor y otras familias (ver pág. anterior), las alas de estas mantis rara vez muestran un dibujo concreto.

• **CICLO VITAL** La hembra tiene fama de comerse al macho después de aparearse. No obstante, y si bien los machos pequeños corren cierto peligro, en realidad son cautos y rara vez son devorados por sus parejas. El número de huevos varía de unas pocas docenas a un par de centenares; están envueltos en una ooteca espumosa o parecida al papel.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, principalmente en las regiones más cálidas. Sobre todo tipo de vegetación abundante en presas.

▷ *Choeradodis stali* y otras especies grandes de este género depredan salamandras y ranas.



lados del pronoto muy dilatados

los grandes ojos ven muy bien

coloración críptica, verde con tonos pardos

venas como de hoja en las alas anteriores

espinas alternas, largas y cortas, en la tibia anterior

alas anteriores estrechas

pronoto dilatado hacia los lados

coloración parda de camuflaje

las alas parecen hojas muertas

alas posteriores más anchas que las anteriores

gran zona más oscura en las alas posteriores

*Deroplatys desiccata* tiene unas alas pardas que la camuflan entre las hojas muertas. Ante un depredador, levanta y separa las patas anteriores revelando unas pintas brillantes en el interior.

Longitud 2-15 cm

Alimentación \*



## CUCARACHAS

**E**L ORDEN DE LOS BLATTODEOS contiene 6 familias y 4.000 especies. Estos insectos correosos tienen una forma plana y ovalada que les permite deslizarse por estrechos resquicios. La cabeza está a menudo cubierta con un pronoto en forma de escudo. Tienen dos pares de alas. Las alas anteriores suelen ser resistentes y cubren las posteriores, grandes y membranosas.

La mayoría de las cucarachas vive en regiones tropicales. Menos del uno por ciento son especies plaga, adaptadas a los hábitats humanos, donde viven en condiciones cálidas y poco higiénicas, y a menudo transmiten enfermedades.

Comen sobre todo materia orgánica muerta o en descomposición. Su principal defensa contra los depredadores consiste en ser muy sensibles a la vibración y poder correr con rapidez, si bien algunas rocián con sustancias tóxicas.

Las hembras segregan feromonas y los machos pueden producir secreciones afrodisíacas para estimularlas. Los apareamientos tienen lugar dorso contra dorso, y el esperma se transfiere en un paquete. Las hembras ponen hasta 40 huevos protegidos por una cápsula u ooteca que pueden dejar caer, enganchar al suelo o bien transportar encima. La metamorfosis es incompleta.

Orden BLATTODEA

Familia BLABERIDAE

N.º de especies 1,000

### CUCARACHAS VIVÍPARAS

Estos grandes insectos tienen a menudo alas bien desarrolladas de color marrón pálido con marcas oscuras. En muchas de las especies grandes, las hembras son ápteras y excavan bajo la madera y las piedras.

• **CICLO VITAL** En algunas especies, los rituales de cortejo incluyen la producción de sonidos. Los machos de *Nauphoeta cinerea* emiten sonidos al frotar una parte articulada del ala anterior contra los vértices posteriores del pronoto. Se reproduce mediante huevos que se desarrollan en la ooteca. La hembra la extiende a partir del extremo del abdomen, la hace girar 90° y luego la introduce en el interior del cuerpo para incubarla.

• **DISTRIBUCIÓN** Regiones tropicales. En diversos hábitats, incluidos selvas pluviales y cuevas.

• **OBSERVACIÓN** Algunas especies se crían como animales de laboratorio.

Los machos de *GROMPHADORHINA PORTENTOSA* se pelean con sus grandes protuberancias torácicas. Esta especie espanta a los depredadores con el ruido que hace al expeler el aire de sus espiráculos.



*PYCNOSCELUS SURINAMENSIS* es una plaga tropical. Vive bajo tierra y se la encuentra en cuevas, en los excrementos de murciélago.



Longitud 2,5-6 cm, rara vez hasta 9,5 cm

Alimentación

Orden BLATTODEA

Familia BLATTIDAE

N.º de especies 600

### CUCARACHAS COMUNES

La mayoría de las especies son pardas, pardorrojizas o pardonegruzcas, con marcas diversas. Son muy activas, pueden correr muy deprisa y vuelan cuando el clima es cálido. Suelen esconderse de día y por la noche salen para alimentarse. Algunas segregan sustancias repelentes que provocan sarpullidos y ceguera temporal. Comen materia orgánica y restos de comida, regurgitando la comida y dejando sus heces tras de sí.

• **CICLO VITAL** Los machos tienen unas glándulas especiales en el dorso cuyas sustancias químicas inducen a la hembra a adoptar una posición idónea para la cópula. Las hembras pueden producir hasta 50 ootecas, cada una con 12 a 14 huevos. Las ootecas pueden ser depositadas, enterradas o enganchadas.


• **DISTRIBUCIÓN** Regiones tropicales y subtropicales. Las especies plaga se encuentran en puertos, almacenes, alcantarillas y vertederos.



◁ *NEOSTYLOPYGA RHOMBIFOLIA*, la Cucaracha arlequín, segrega acetato de amilo que huele como exudados de peral y que utiliza para defenderse de los depredadores.



ooteca protuberante que la hembra lleva hasta hallar un buen escondrijo



*PERIPLANETA AMERICANA*, la Cucaracha americana, se utiliza en los laboratorios debido a la facilidad de su cultivo. Originaria de África, vive hoy en todo el mundo.

Longitud 2-4,5 cm

Alimentación



Orden	BLATTODEA	Familia	BLATTELLIDAE	N.º de especies	1.750
-------	-----------	---------	--------------	-----------------	-------

## BLATÉLIDOS

Muchos de estos insectos son marrón pálido pero unos pocos son verde oliva. Son comunes las marcas de un marrón más oscuro, en las alas y en el pronoto. Son a menudo brillantes. Alas desarrolladas.

• **CICLO VITAL** Los adultos y las ninfas se alimentan de materia orgánica muerta. Las hembras se reproducen cinco o seis veces al año y producen unos 40 huevos cada vez. Muchas llevan los huevos en una ooteca que sobresale del abdomen y que dejan caer al suelo justo antes de la eclosión.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones más cálidas. En vertederos y edificios.



superficie corporal brillante  
sin alas  
márgenes laterales pálidos

Δ **LOBOPTERA DECIPIENS** es una especie áptera europea. Vive en la hojarasca y bajo las piedras y la corteza.



antenas largas y filiformes



marcas oscuras en el pronoto

coloración pardusca

Δ **BLATTELLA GERMANICA**, la Cucaracha alemana, es una plaga común de las casas, cocinas y almacenes. Las hembras producen miles de huevos.

machos y hembras con las alas completamente desarrolladas

Δ **MEGALOBLLATA LONGIPENNIS**, de Perú, Ecuador y Panamá, es la cucaracha de mayor tamaño del mundo. Tiene hasta 20 cm de envergadura.

Longitud 0,8–10 cm; la mayoría menos de 2 cm

Alimentación

Orden	BLATTODEA	Familia	CRYPTOCERCIDAE	N.º de especies	4
-------	-----------	---------	----------------	-----------------	---

## CUCARACHAS DE BOSQUE

Son las cucarachas más primitivas y pertenecen a un único género: *Cryptocercus*. Son bastante alargadas y de color marrón oscuro o negro brillantes.

• **CICLO VITAL** Viven en pequeños grupos familiares de dos adultos y hasta 20 ninfas. Excavan túneles en la madera muerta —enganchan sus huevos en el techo— y usan unos protozoos especiales, que viven simbióticos en el aparato digestivo, para descomponer la celulosa en azúcares. Cuando las ninfas mudan, comen deyecciones del grupo para reinfestarse de protozoos.

• **DISTRIBUCIÓN** Norteamérica y China. En madera muerta, en una variedad de hábitats.



cabeza oculta bajo el pronoto

**CRYPTOCERCUS PUNCTULATUS**, la Cucaracha de bosque americana, comprende varias especies distintas.

patas cortas y espinosas

Longitud 2–3 cm

Alimentación

## TEJEDORES

**E** L ORDEN DE LOS EMBÍOPTEROS es un grupo pequeño que contiene 8 familias y 300 especies. Son insectos gregarios cuyo nombre común alude a su capacidad de construir túneles de seda en el suelo, en la hojarasca y bajo la corteza para protegerse de los depredadores.

Las patas son cortas. Los adultos y jóvenes tienen un segmento tarsal lanudo en sus patas anteriores, que contiene glándulas serígenas. La seda se expelle a

través de las numerosas estructuras en forma de cerda de la cara inferior de los segmentos. A medida que el insecto mueve los pies anteriores contra una superficie, se va formando un manto de seda.

Las hembras carecen de alas, mientras que los machos suelen tener dos pares de alas estrechas. Las hembras y las ninfas no abandonan el interior de la colonia, y los machos adultos vuelan a otras colonias. La metamorfosis es incompleta.

Orden	EMBIOPTERA	Familia	CLOTHODIDAE	N.º de especies	14
-------	------------	---------	-------------	-----------------	----

## CLOTÓDIDOS

Suelen ser alargados y cilíndricos, con patas cortas. Piezas bucales simples y masticadoras. Las patas anteriores de adultos y jóvenes tienen unos segmentos tarsales engrosados con muchas glándulas serígenas. Los ojos son pequeños y las antenas tienen 10–35 artejos.

• **CICLO VITAL** Los machos no se alimentan pero utilizan sus mandíbulas para poder aferrarse a las hembras durante el apareamiento. Las hembras cubren sus huevos con seda y trozos de detritos. Después de la eclosión, las hembras pueden alimentar a sus crías con comida premasticada.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas en regiones tropicales y subtropicales. En hábitats, desde selvas pluviales hasta desiertos.



cercos sensitivos  
segmento tarsal abultado con una glándula serígena  
piezas bucales masticadoras

**CLOTHODA URICHI**, aquí dentro de su red de seda, es autóctona de Trinidad y puede ser comunal o solitaria. Vive en el mismo nido de seda que sus ninfas, pero las hembras comunales producen más huevos que las solitarias.

Longitud 0,5–2 cm

Alimentación

Orden	EMBIOPTERA	Familia	EMBIIDAE	N.º de especies	250
-------	------------	---------	----------	-----------------	-----


## EMBÍIDOS

Estos tejedores coloniales son bastante gruesos. Los machos tienen dos pares de alas que se doblan hacia delante para desplazarse hacia atrás por las galerías de la colonia.

Cuando vuelan, bombean una sustancia al interior de una vena para endurecer cada ala.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos en galerías tapizadas de seda y los defienden hasta que los jóvenes se dispersan.

• **DISTRIBUCIÓN** Sudamérica y África. En varios hábitats, en la corteza, en huecos de árboles y hendeduras rocosas, y bajo piedras.



cabeza dirigida hacia delante  
coloración oscura en esta especie  
alas desarrolladas en los machos

Las especies de la familia EMBIIDAE tienen unas características muy similares a las de la familia Clothodidae (ver arriba).

Longitud 0,5–2,2 cm

Alimentación



## TERMES

**L**AS 7 FAMILIAS Y 2.750 especies del orden de los isópteros no se hallan nunca a más de 50° al norte o al sur del ecuador. Son pálidos, blandos y ápteros, con mandíbulas masticadoras o mordedoras y con las antenas cortas, pero las castas de una colonia divergen. Los reproductores, incluidos los reyes y las reinas, tienen dos pares de largas alas, unos cercos cortos y la cabeza redondeada u ovalada. Los sol-

dados estériles tienen la cabeza mayor que las obreras. Los ojos están reducidos o ausentes. La metamorfosis es incompleta.

Los termes viven en nidos de barro o en extensos laberintos subterráneos con enormes chimeneas de ventilación. La mayoría comen madera en descomposición –todas las familias digieren la celulosa– y muchas atacan los cultivos o la madera de los edificios.

Orden	ISOPTERA	Familia	HODOTERMITIDAE	N.º de especies	19
-------	----------	---------	----------------	-----------------	----

### TERMES COSECHADORES

Estos termes tienen ojos y sus mandíbulas tienen dientes grandes y bien diferenciados. Son de color crema o marrón claro u oscuro. El pronoto tiene forma de silla de montar y se extiende hacia abajo por los lados.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el nido de la colonia, que se extiende hasta 6 m bajo tierra. Las obreras buscan hierba en el exterior para alimentar a los jóvenes.
- **DISTRIBUCIÓN** África y Asia. En regiones de sabana seca. En el suelo.
- **OBSERVACIÓN** Pueden ser plagas de los pastos abiertos y competir por el alimento con los grandes herbívoros y contribuir en la erosión del suelo.

mandíbulas dentadas • cabeza grande y dura • tres segmentos torácicos de tamaño similar



Las especies del género *HODOTERMES* están muy difundidas por las sabanas africanas y construyen nidos subterráneos. Pueden verse durante el día, recogiendo hierba y trozos de ramitas.

Longitud	0,4–1 cm – únicamente los soldados y obreras	Alimentación	
----------	--	--------------	--

Orden	ISOPTERA	Familia	RHINOTERMITIDAE	N.º de especies	345
-------	----------	---------	-----------------	-----------------	-----

### TERMES SUBTERRÁNEOS

El pronoto es redondeado en la parte posterior y en algunas especies adopta una forma casi como de corazón. Los soldados no tienen ojos. La coloración es crema o marrón.

- **CICLO VITAL** La puesta se realiza en las colonias, que se encuentran en el suelo o en la madera húmeda que toca el suelo.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas en regiones cálidas. En el suelo y la madera.
- **OBSERVACIÓN** Algunos son plagas de la madera. Una especie norteamericana es una plaga tan grave que existen regulaciones especiales en la edificación para ayudar a prevenir los daños.

cuerpo blando y pálido • segmentos torácicos pequeños • pronoto redondeado o acorazonado • antenas cortas



*RETICULITERMES LUCIFUGUS* construye su nido bajo tierra, dentro de la madera húmeda. Estos termes pálidos y de cuerpo blando, con antenas distintivas, se hallan en el sur de Europa.

Longitud	2–8 mm – únicamente los soldados y obreras	Alimentación	
----------	--	--------------	--

Orden	ISOPTERA	Familia	TERMITIDAE	N.º de especies	1.950
-------	----------	---------	------------	-----------------	-------

### TERMÍTIDOS

Esta familia muy variable, cuya coloración varía del crema pálido al marrón oscuro, comprende casi las tres cuartas partes de las especies del orden. Soldados y obreras sin ojos, y soldados con grandes mandíbulas mordedoras o una cabeza en forma de hocico con la que expulsan venenos pegajosos.

- **CICLO VITAL** Puesta en nidos que varían desde pequeñas estructuras en árboles y montones en el suelo hasta extensos laberintos subterráneos. Algunas reinas producen miles de huevos al día.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas en zonas subtropicales. En árboles o en el suelo.
- **OBSERVACIÓN** Muchos son plagas. Tienen un sistema de castas muy complejo.



*TRINERVITERMES GEMINATUS* tiene soldados que pueden producir una secreción repelente con una glándula de la cabeza. La utilizan contra sus principales enemigos, que son las hormigas.

Las especies de *MACROTREMES* atacan los cultivos de cacao y los cocoteros. A veces los adultos reproductores como éste emergen de la colonia a millares.

Longitud	0,4–1,4 cm – únicamente los soldados y obreras	Alimentación	
----------	--	--------------	--

Orden	ISOPTERA	Familia	TERMOPSIDAE	N.º de especies	20
-------	----------	---------	-------------	-----------------	----

### TERMÓPSIDOS

Su color varía del marrón pálido al oscuro. Pronoto aplanado más estrecho que la cabeza.

- **CICLO VITAL** La puesta se realiza, en madera en descomposición que está en el suelo.
- **DISTRIBUCIÓN** Regiones cálidas. Árboles en descomposición o en leños caídos.
- **OBSERVACIÓN** Unas pocas especies son plagas de la madera, sobre todo cuando está enterrada en el suelo, como los postes telegráficos.



*ZOOTERMOPSIS ANGUSTICOLLIS* es oriundo de Norteamérica, donde puede llegar a ser una problemática plaga de la madera húmeda que se encuentra por encima del suelo.

Longitud	3–6 mm – únicamente los soldados y obreras	Alimentación	
----------	--	--------------	--



## ZORÁPTEROS

**E**L ORDEN DE LOS ZORÁPTEROS consta de una única familia dividida en 29 especies. Descubiertos a principios del siglo XX, estos insectos pequeños, delicados y similares a los termitas, tienen una coloración que varía del pajizo claro al marrón oscuro o negruzco. Los adultos de la mayoría de especies presentan dos formas. Una de ellas no tiene ojos ni ocelos, y es pálida y áptera como las ninfas. La otra tiene ojos y tres ocelos, una coloración oscura y dos pares de alas con una venación mínima. Las formas aladas son las responsables de dispersarse a nuevas localidades cuando el hábitat se vuelve inapropiado por alguna razón. Cuando encuentran

un nuevo emplazamiento, pierden las alas. Los zorápteros tienen unos cercos abdominales cortos y unas piezas bucales no especializadas, dirigidas hacia abajo, que se parecen a las de los saltamontes y los grillos (ver págs. 60–65). Los tarsos están divididos en dos segmentos.

La metamorfosis es incompleta y las ninfas varían de aspecto según si tienen o no alas como los adultos. Autóctonos de América del Norte y del Sur, de África y de partes del este de Asia, estos insectos llevan una vida gregaria bajo la corteza de árboles en descomposición, en el polvo de madera y la hojarasca húmeda. Algunas especies se asocian con las colonias de termitas.

Orden ZORAPTERA	Familia ZOROTYPIDAE	N.º de especies 29
-----------------	---------------------	--------------------

## ZORÁPTEROS

Estos insectos son o bien pálidos y ápteros, o bien más oscuros y con alas. El abdomen es ovalado y la cabeza, que es triangular, lleva un par de antenas con nueve artejos a modo de cuentas.

• **CICLO VITAL** Las ninfas y los adultos comen filamentos de hongos y pequeños artrópodos, sobre todo ácaros. El comportamiento sexual puede ser bastante complejo y los machos de algunas especies hacen a las hembras regalos de apareamiento en forma de secreciones de sus glándulas cefálicas. En otras, luchan por sus compañeras, golpeándose con sus patas posteriores. El éxito en el apareamiento parece que aumenta con la edad y no sólo con el tamaño. La puesta se realiza donde viven, en madera en descomposición u hojarasca.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas en regiones tropicales y templadas cálidas, a excepción de Australia. En la madera en descomposición, en los montones de serrín y en la hojarasca, y bajo la corteza de los árboles.

• **OBSERVACIÓN** Todas las especies pertenecen al único género *Zorotypus*.



*ZOROTYPUS HUBBARDI* es de color marrón en la vida real; éste es un espécimen en un portaobjetos que ha sido teñido de rojo. Del este y sur de EEUU, esta especie vive en el serrín, en los leños en descomposición y bajo la corteza muerta.

Longitud 2–3 mm	Alimentación
-----------------	--------------

## PSOCÓPTEROS

**E**L ORDEN DE LOS PSOCÓPTEROS comprende 345 familias y 3.000 especies. Estos insectos de cuerpo blando y coloración apagada son comunes aunque pasan inadvertidos. La cabeza es grande, con una frente bulbosa, unos ojos salientes y unas antenas largas y filiformes. Visto de lado, el tórax aparece jorobado, con dos pares de alas membranosas que se pliegan en forma de tejadillo sobre el cuerpo.

Algunos paren crías vivas pero la mayoría ponen huevos. La metamorfosis es incompleta y hay cinco estadios ninfales.

Estos insectos se encuentran en una amplia gama de hábitats terrestres, desde el suelo hasta las bóvedas arbóreas, donde comen algas, líquenes, levaduras y esporas de hongos. Algunos comen polen y tejidos vegetales. Muchas especies son solitarias pero algunas pueden ser gregarias.

Orden PSOCOPTERA	Familia CAECILIIDAE	N.º de especies 330
------------------	---------------------	---------------------

## CECÍLIDOS

La mayoría de los cecílidos son de coloración parda, amarilla o verde y tienen las alas desarrolladas o, como mínimo, cortas; muy pocas especies son ápteras. Las alas pueden tener marcas; el borde frontal de las alas anteriores y las venas alares tienen cortos pelos.

• **CICLO VITAL** Ponen de 12 a 16 huevos sobre las hojas. Donde hay más de una generación al año, los huevos puestos en otoño caen con las hojas, para celosionar en primavera.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats. En el follaje de los árboles caducifolios, en la hierba y en la vegetación baja. Unas pocas especies entre la hojarasca.



*CAECILIUS FLAVIDUS* es abundante en las hojas de muchos árboles caducifolios. Esta especie es autóctona en Europa, incluida Gran Bretaña.

Longitud 1,5–4 mm	Alimentación
-------------------	--------------

Orden PSOCOPTERA	Familia ECTOPSOCIDAE	N.º de especies 150
------------------	----------------------	---------------------

## ECTOPSÓCIDOS

Son de color pardo claro y pueden tener franjas oscuras en el abdomen. La cabeza está cubierta de pelos. Ojos pequeños y antenas de 13 artejos que son largas en los machos y más cortas en las hembras.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen series de huevos en las venas de las hojas muertas y las cubren con hilos de seda que segregan. En buenas condiciones las poblaciones pueden volverse muy numerosas. Las ninfas, que son peludas y similares a los adultos, se alimentan de filamentos de hongos, materia en descomposición, algas y algunas veces de polen.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En diversos hábitats. Entre las hojas secas de árboles caducifolios. Algunos en invernaderos o casas.



*ECTOPSOCUS BRIGGSI* es una especie europea que vive en los árboles caducifolios. La mayoría de sus miembros tiene las alas desarrolladas, aunque hay formas con alas cortas.

Longitud 1,5–3,5 mm	Alimentación
---------------------	--------------



Orden PSOCOPTERA

Familia LIPOSCOLIDAE

N.º de especies 150

## LIPOSCÉLIDOS

Estos insectos tienen el cuerpo aplanado y fémures engrosados en sus patas posteriores. La mayoría carece de alas, aunque hay formas con alas. La cabeza tiene un par de cortas antenas y ojos pequeños.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos en hojarasca, grietas en la corteza de los árboles y nidos de aves. Sus ninfas son muy parecidas a pequeños adultos aunque tienen las antenas más cortas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En la hojarasca seca, bajo la corteza y en nidos. Algunos, en edificios y almacenes de alimentación.

• **OBSERVACIÓN** Algunas especies pueden ser plagas. Varias del género *Liposcelis* prosperan en condiciones húmedas y pueden atacar la harina, los cereales, los libros y los papeles. También se han citado casos de daños a las colecciones de plantas e insectos de los museos.

antenas finas y multisegmentadas  
ojos pequeños  
patas cortas  
fémures posteriores abultados



*LIPOSCELIS TERRICOLIS* es de amplia distribución. Se encuentra en la hojarasca y en productos secos y almacenados, donde puede convertirse en una plaga.

cuerpo aplanado, pardo-amarillento

Longitud 0,5–1,5 mm

Alimentación

Orden PSOCOPTERA

Familia PSOCIDAE

N.º de especies 500

## PSÓCIDOS

La mayoría tiene una coloración parda apagada, gris o negruzca, y muchas especies tienen márgenes pálidos. Las alas carecen de pelos y pueden estar moteadas.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos solos o en grupos, dentro de grietas de la corteza de los árboles. El ciclo vital puede tardar un poco más de dos meses; por lo general hay varias generaciones al año. La mayoría de especies se alimenta de hongos, polen, algas y líquenes.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre corteza, ramas y ramitas de árboles y arbustos. Algunas de las especies más comunes de este orden pertenecen a esta familia, pudiéndose encontrar enormes poblaciones en ciertos árboles.

alas en tejadillo sobre el cuerpo  
moteado pardo  
tórax brillante y giboso



*PSOCOCERASTIS GIBBOSA* es autóctona de Europa y parte de Asia. Se encuentra en los árboles y es el mayor miembro de su género en Gran Bretaña.

mandíbulas dirigidas hacia abajo

Longitud 1–6 mm

Alimentación

## PIOJOS

**L**AS 25 FAMILIAS y 6.000 especies del orden de los fitirapteros reciben el nombre común de piojos. Estos insectos de formas aplanadas son ectoparásitos ápteros que viven sobre el cuerpo de aves y animales, sin matarlos. Las piezas bucales se utilizan para morder la piel, las plumas o el pelo pero los piojos chupadores las utilizan sólo para alimentarse de sangre. Las patas son cortas y están modificadas

para agarrarse a los pelos o las plumas. La metamorfosis es incompleta.

Los distintos piojos se asocian con huéspedes específicos, como sucede con las especies con distintivas piezas bucales que sólo se encuentran sobre los jabalíes verrugosos o los elefantes africanos. Muchos piojos se limitan a zonas concretas del cuerpo, lo que permite que más de una especie habite sobre un mismo huésped.

Orden PHITIRAPTERA

Familia MENOPONIDAE

N.º de especies 650

## PIOJOS DE LAS AVES

Abdomen ovalado y patas cortas y robustas. Cabeza, grande y triangular, con mandíbulas morderas.

• **CICLO VITAL** Las hembras enganchan sus huevos a las plumas. La mayoría comen fragmentos de plumas pero algunos también sangre y secreciones cutáneas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchas aves.

• **OBSERVACIÓN** Algunas especies, p. ej. *Menopon gallinae* (Piojo del raquis), pueden ser plagas graves.

cabeza ancha



*MENACANTHUS STRAMINEUS*, el Piojo del cuerpo de las gallinas, está muy difundido. Causa pérdida de plumas e infecciones.

dos garras en cada pata

Longitud 1–6 mm; la mayoría menos de 4 mm

Alimentación

Orden PHITIRAPTERA

Familia PEDICULIDAE

N.º de especies 2

## PIOJOS HUMANOS

Son pequeños, pálidos y alargados, con patas cortas y muy ganchudas para aferrarse a sus huéspedes. Tiene ojos muy oscuros. El piojo humano, *Pediculus humanus*, también infesta algunos monos. Tiene dos subespecies: *P. humanus* subsp. *corporis* (Piojo del cuerpo) y *P. humanus* subsp. *capitis* (Piojo de la cabeza). La otra especie de la familia, *P. schaeffi*, se encuentra sólo en simios.

• **CICLO VITAL** El Piojo del cuerpo vive y pone sus huevos en las fibras de la ropa, mientras que el Piojo de la cabeza sólo vive en el cabello y engancha sus huevos (liendres) a los pelos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En seres humanos, simios y en otros monos.

• **OBSERVACIÓN** Las epidemias de piojos de la cabeza son comunes en niños. Se está desarrollando una resistencia a los champús insecticidas, de modo que lavarse con regularidad y utilizar un peine fino resulta igualmente efectivo. Hasta la segunda guerra mundial, morían más soldados del tifus y fiebre recurrente transmitidos por los piojos que en combate.

cabeza estrecha

patas fuertes y curvas  
*PEDICULUS HUMANUS CAPITIS* tiene piezas bucales adaptadas para chupar sangre.

cuerpo aplanado y en forma de pera

cuerpo lleno de sangre

sangre visible por la pared corporal



*PEDICULUS HUMANUS CORPORIS*, el Piojo del cuerpo, vive en la ropa de la gente y puede transmitir el organismo que provoca el tifus.

Longitud 1,5–3,5 mm

Alimentación



Orden PHTHIRAPTERA

Familia PHTIRIDAE

N.º de especies 2


## LADILLAS

Son pálidos o translúcidos, con el cuerpo plano y rechoncho y la cabeza mucho más estrecha que el tórax. Las patas intermedias y posteriores son muy robustas y tienen fuertes garras para aferrarse a los pelos. Comprenden la Ladilla humana, *Phthirus pubis*, y la del gorila, *Phthirus gorillae*.

• **CICLO VITAL** Después de aparearse, la hembra utiliza una pega fuerte y resistente al agua para enganchar sus huevos a los pelos del pubis. Tanto las ninfas como los adultos se nutren de la sangre del huésped, dejando marcas azules en la piel.

• **DISTRIBUCIÓN** Allí donde viven sus huéspedes. La Ladilla humana es cosmopolita.

• **OBSERVACIÓN** Estos piojos de movimientos muy lentos no saltan y tan sólo pueden transferirse a sus nuevos huéspedes durante el contacto íntimo.



*PHTHIRUS PUBIS*, la Ladilla humana, puede encontrarse en las axilas y en la barba, así como en la ingle. Aunque es desagradable, no parece transmitir enfermedades.

Longitud 1,5–2,5 mm

Alimentación

Orden PHTHIRAPTERA

Familia TRICHOECTIDAE

N.º de especies 350

## PIOJOS CHUPADORES DE MAMÍFEROS

Suelen ser de color pardo, tienen la cabeza grande, con unas antenas cortas y conspicuas, y unas mandíbulas distintivas. Las patas son cortas y cada una tiene una sola garra tarsal. Las hembras tienen el abdomen romo en el extremo, mientras que el de los machos es algo puntiagudo. Viven en caballos, vacas, ovejas, cabras y gatos.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el pelo o la lana de los huéspedes. Allí viven también las ninfas, comiendo diminutos trozos de piel, pelo, secreciones de las glándulas sebáceas y, algunas veces, sangre.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas.

• **OBSERVACIÓN** El Piojo del perro es portador de solitarias o tenias. Las infestaciones afectan a la salud ya que los animales pasan más tiempo despiojándose que alimentándose.



*DAMALINIA ORIS* es un pequeño piojo que se encuentra en los corderos. Uno muy infestado puede llevar más de 750.000 piojos.

Longitud 1–3 mm

Alimentación

## CHINCHES, CIGARRAS Y AFINES

**E**L ORDEN DE LOS HEMIPTEROS comprende 134 familias y 82.000 especies. Estas pueden variar desde insectos diminutos y ápteros hasta las chinches acuáticas gigantes capaces de capturar peces y ranas. Se encuentran en todos los hábitats terrestres, en aguas dulces y en la superficie de los océanos meridionales.

Hay cuatro subórdenes: Colorryncha (solamente una familia), Heteroptera (chinches verdaderas), Auchenorrhyncha (lantanarias, cigarrillas, cigarras, etc.) y Sternorrhyncha (moscas blancas, pulgones, cochinillas, etc.). La selección que viene a continuación está dividida en chinches verdaderas (desde Acanthosomatidae

a Tingidae); cigarras y afines (desde Aphrophoridae a Membracidae); y pulgones y afines (de Aleyrodidae a Psyllidae).

Tan sólo las chinches verdaderas incluyen especies depredadoras y chupadoras de sangre. Todos los hemipteros tienen piezas bucales perforadoras y chupadoras, en forma de un largo rostro hecho de delgados estiletes envueltos por el labium. Muchos chupan la savia y son graves plagas de los cultivos.

La metamorfosis es incompleta. Ponen los huevos en y sobre la vegetación y el suelo, y bajo la corteza. Hay cinco estadios ninfales. Algunas especies paren crías vivas, y otras se reproducen sin los machos.

Orden HEMIPTERA

Familia ACANTHOSOMATIDAE

N.º de especies 250

## CHINCHES ACANTOSOMÁTIDAS

Son similares a los escutélidos (ver pág. 94). Son verdes, pardas o grises, aunque algunas presentan colores vivos. La cabeza es pequeña y el cuerpo ovalado o ahusado por detrás del amplio pronoto.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en los árboles huésped. Las ninfas y los adultos chupan la savia.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones cálidas. En diversos hábitats como bosques, prados y zonas de matorral, donde se encuentran las plantas huésped.

• **OBSERVACIÓN** Algunas hembras vigilan los huevos hasta que eclosionan. Las pequeñas ninfas pueden buscar refugio bajo su cuerpo cuando algún depredador las amenaza.

▷ *ELASMUCHA GRISEA* se llama Chinche clueta por su comportamiento maternal. Se alimenta de hojas de abedul.




△ *ELASTHOTHERUS INTERSTINCTUS* prefiere los bosques mixtos y se alimenta de abedules, avellanos y álamos temblones.

Longitud 0,5–2,4 cm

Alimentación



Orden	HEMIPTERA	Familia	ALYDIDAE	N.º de especies	300
<h2>ALÍDIDOS</h2> <p>Delgados y de colores apagados son similares a las chinches de las calabazas (ver pág. 88) pero tienen la cabeza más ancha y casi tan larga como el pronoto. Muchas especies se parecen a las hormigas, pero otras a las avispas. Tienen glándulas olorosas bien desarrolladas, que pueden producir olores todavía más fuertes que las chinches hediondas (ver pág. 92).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos en el suelo y la hojarasca. Algunas ninfas se han encontrado en hormigueros.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Sobre gramíneas y leguminosas.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Algunas son plagas del arroz y del mijo.</li> </ul>					
 <p>cuatro artejos en las antenas</p> <p>cabeza ancha</p> <p>fémur grueso</p> <p>curva característica en el cuarto artejo</p> <p>coloración apagada</p> <p>espinas en el fémur posterior de muchas especies</p> <p>patas largas</p> <p>cuerpo fino y alargado</p> <p>Δ Las especies del género <i>HYALYMENUS</i> tienen ninfas que se parecen y se mueven como las hormigas. Los adultos comen carroña y heces de aves.</p> <p><i>ALYDUS CALCARATUS</i> es la única especie de esta familia que vive en Gran Bretaña. Está muy difundida por el hemisferio norte. Sus plantas huésped pertenecen a la familia del guisante.</p>					
Longitud		1–2,6 cm		Alimentación	


Orden	HEMIPTERA	Familia	ANTHOCORIDAE	N.º de especies	500
<h2>CHINCHES DE LAS FLORES</h2> <p>Las especies de esta familia tienen el cuerpo relativamente plano, que puede ser alargado u ovalado. La mayoría tienen las alas desarrolladas pero son cortas en algunas especies. Las antenas tienen cuatro artejos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en pequeños grupos, en el envés de las hojas o en sus peciolo; en tallos, en la corteza o en detritos.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Bajo la corteza y en flores, hojarasca y hongos. Algunas, en nidos y madrigueras de animales.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Sirven para el control de pulgones, trips, cochinillas y mariposas nocturnas.</li> </ul>					
 <p>rostro trisegmentado</p> <p>antenas de cuatro artejos</p> <p>cabeza puntiaguda</p> <p>manchas oscuras en las alas anteriores</p> <p>pronoto brillante</p> <p>Las especies del género <i>ANTHOCORIS</i> ponen sus huevos en hojas infestadas de presas como pulgones. Son atraídas por los olores de sus presas.</p>					
Longitud		2–5 mm		Alimentación	

Orden	HEMIPTERA	Familia	ARADIDAE	N.º de especies	1.800
-------	-----------	---------	----------	-----------------	-------

## CHINCHES DE LA CORTEZA

Son planas y ovaladas, y muchas ápteras. Tienen una coloración críptica, negra, o de pardo rojiza a parda oscura, y el dorso es muy áspero o bien tiene cortas proyecciones o pequeñas depresiones.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en pequeños montones bajo la corteza o en la hojarasca. Unas pocas especies cuidan de sus ninfas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Bajo la corteza en descomposición; entre detritos vegetales, hojarasca y hongos.




antenas cortas y gruesas

tórax con depresiones y toscas aristas

piezas bucales largas y perforantes; se enrollan cuando no se usan

cuerpo plano y ovalado

Δ Los adultos y ninfas de *ARADUS ATERRIMUS* suelen hallarse juntos bajo la corteza de varios árboles caducifolios.


Longitud	0,3–1,3 cm	Alimentación	
----------	------------	--------------	---

Orden	HEMIPTERA	Familia	BELOSTOMATIDAE	N.º de especies	150
-------	-----------	---------	----------------	-----------------	-----

## CHINCHES ACUÁTICAS GIGANTES

Esta familia contiene las mayores chinches del mundo. Son ovaladas, planas e hidrodinámicas, con patas anteriores grandes y en forma de pinza. Las centrales y posteriores, aplanadas, suelen estar orladas de pelos que ayudan en la natación. Las antenas son pequeñas y quedan ocultas.

- **CICLO VITAL** Los machos pueden atraer a las hembras usando su cuerpo para enviar pequeñas olas bajo la superficie del agua. Éstas pueden enganchar los huevos al dorso del macho o a la vegetación. En las especies que incuban en el dorso, los machos cuidan de los huevos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas en regiones tropicales y subtropicales. En arroyos de curso lento y charcas.
- **OBSERVACIÓN** Tanto ninfas como adultos son muy depredadores, e incluso capturan ranas, peces y pequeñas aves.



ojos grandes


tibia curva con una garra afilada y única para capturar presas

esta especie tiene una coloración parda, con un moteado oscuro

en muchas especies, las patas centrales y posteriores tienen pelos que ayudan en la natación

el par de apéndices actúa como un corto sifón de respiración

*LETHOCERUS GRANDIS* es una de las especies de chinches gigantes que el hombre usa como alimento en el sudeste asiático.

Longitud	1,5–10 cm	Alimentación	
----------	-----------	--------------	---




Orden	HEMIPTERA	Familia	CIMICIDAE	N.º de especies	90
<b>CHINCHES DE LAS CAMAS</b> Aplanadas, ovaladas y ápteras, rojizas o pardas. Además del hombre, muchas infestaban a mamíferos y aves. • <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en grietas, en el lugar de descanso de los adultos. Los cinco estadios ninfales necesitan mucha sangre. El ciclo vital es de dos a diez meses. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En el huésped, en cuevas y grietas.					
Longitud		3-6 mm		Alimentación	



**CIMEX LECTULARIUS** es la especie más conocida, asociada desde antiguo con los seres humanos. Encuentra a sus huéspedes gracias a su calor corporal.

Orden	HEMIPTERA	Familia	COREIDAE	N.º de especies	2.000
<b>CHINCHES DE LAS CALABAZAS</b> Algunas usan plantas como huésped. Suelen ser de color pardo apagado. Algunas son de color rojo brillante, amarillas o verdes. • <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos en las plantas huésped. Hay 5 estadios ninfales y entre la eclosión y la fase adulta pasan tres semanas. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en las regiones cálidas. En muchas plantas. Algunas son plagas.					
Longitud		0,7-4,2 cm; la mayoría menos de 2 cm		Alimentación	



**DIACTOR**, con expansiones a modo de hojas, se llaman chinches con pies de hoja.

**THASUS ACUTANGULUS** usa sus fuertes patas posteriores en los combates entre machos.

Orden	HEMIPTERA	Familia	CORIXIDAE	N.º de especies	550
<b>BARQUEROS</b> Son nadadores y descansan bajo el agua o se adhieren a las plantas. Son rojos oscuros o pardos amarillentos y sus cortas patas anteriores forman una "cuchara"; se agarran con las patas medias y nadan con el par posterior. • <b>CICLO VITAL</b> Atraen a las hembras frotando partes del cuerpo. Los huevos se enganchan a objetos sumergidos. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En estanques y arroyos de curso lento.					
Longitud		0,3-1,5 cm		Alimentación	


✓ **CALLICORIXA WOLLASTONI** es probablemente depredador y se encuentra en turberas de tierras altas.



Δ **CORIXA PUNCTATA** puede nadar como sus "parientes", pero también vuela con facilidad.



Orden	HEMIPTERA	Familia	GELASTOCORIDAE	N.º de especies	90
<b>CHINCHES SAPO</b> Pueden saltar sobre sus presas, y muchas tienen un aspecto desigual o verrugoso. Son anchas y ovaladas, con ojos protuberantes como de sapo, y sus colores crípticos se confunden con el lodo, la arena o los guijarros. • <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en detritos o suelo húmedo. Las ninfas tienen buena vista. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en el hemisferio sur. Cerca de arroyos; en madera descompuesta y hojarasca; bajo piedras.					
Longitud		0,7-1,4 cm		Alimentación	



**NETHRA GRANDICOLLIS** es una chinche sapo de aspecto típico. Este género común es el mayor de la familia.

Orden	HEMIPTERA	Familia	GERRIDAE	N.º de especies	500
<b>PATINADORES O ZAPATEROS</b> Estos hemípteros muy rápidos y a menudo ápteros están adaptados para vivir sobre el agua. El cuerpo es pardo oscuro o negro y está densamente recubierto de pelos aterciopelados que repelen el agua. Las patas posteriores y medias reparten uniformemente el peso del insecto sobre la superficie del agua. • <b>CICLO VITAL</b> Los patinadores utilizan la "comunicación por ondas" para atraer a sus parejas. Ponen las masas de huevos sobre plantas sumergidas o los insertan en tallos de plantas. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En masas de agua: estanques, charcas, arroyos, ríos, lagos y océanos cálidos.					
Longitud		0,2-3,5 cm; la mayoría 1-1,5 cm		Alimentación	



Las especies del género **GERRIS** están muy difundidas en aguas corrientes. Atraídas por las ondas producidas por las presas, salen a capturarlas a la superficie.



Orden	HEMIPTERA	Familia	HYDROMETRIDAE	N.º de especies	120
<b>ZAPATEROS</b> Son alargados y finos, con las patas filiformes. Son de color pardo oscuro a rojizo. La cabeza es muy alargada, con ojos protuberantes que ocupan cerca de la mitad de su longitud. La mayoría son ápteros, pero también se dan formas aladas. • <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus largos huevos uno a uno, enganchándolos a la vegetación o en los bordes del estanque, por encima del agua. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en las regiones tropicales y subtropicales. En plantas de charcas, estanques, marjales y otros humedales. • <b>OBSERVACIÓN</b> Las ninfas y los adultos prefieren presas heridas o recién muertas. Les gustan los huevos de mosquito y otros alimentos inmóviles.					
Longitud		0,3-2,2 cm		Alimentación	







**HYDROMETRA STAGNORUM** sostiene la presa con sus piezas bucales, no con las patas. A veces chupan los jugos corporales de los insectos muertos.



Orden	HEMIPTERA	Familia	MIRIDAE	N.º de especies	8.000
<h2>CHINCHES DE LAS PLANTAS</h2> <p>Alargadas u ovaladas, son bastante delicadas y frágiles. Especies con coloraciones y marcas muy variadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Suelen insertar sus huevos dentro de tejidos vegetales. Hay cinco estadios ninfales. Las ninfas –y los adultos– de la mayoría de especies chupan la savia de las plantas, pero muchas atacan pequeñas presas de cuerpo blando.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En una amplia gama de hábitats bien provistos de vegetación.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Muchas especies son plagas de cultivos de algodón, café y patatas. Algunas especies depredadoras se han utilizado para controlar los ácaros rojos de los frutales.</li> </ul>					
 <p><i>antenas con cuatro artejos</i></p> <p>◁ <b>PITHANUS MARKELI</b> se encuentra en gran parte de Europa, por lo general en prados muy húmedos.</p> <p><i>los adultos de esta especie tienen las alas muy cortas</i></p> <p>◁ <b>DERAEOCORIS RUBER</b> es una especie depredadora. Los adultos y las ninfas se alimentan de pulgones y de otros pequeños insectos.</p> <p>▷ <b>LYGOCORIS PABULINUS</b>, o Cápsido verde común, está difundido por Europa y es una plaga grave de los frutales.</p> <p><i>cabeza triangular</i></p> <p><i>cuerpo ovalado</i></p> <p><i>aspecto delicado</i></p>					
Longitud 0,2–1,6 cm		Alimentación 			

Orden	HEMIPTERA	Familia	NAUCORIDAE	N.º de especies	400
<h2>NAUCÓRIDOS</h2> <p>Estos aplanados insectos tienen el cuerpo ovalado. Son pardos o negros. Con las patas anteriores capturan presas y con las posteriores nadan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Insertan sus huevos en hileras, en tallos de plantas acuáticas.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En charcas, arroyos y ocasionalmente fuentes termales.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> El aire de la superficie queda atrapado bajo las alas plegadas, lo que les ayuda a mantener el nivel de flotación y la vida mientras se alimentan bajo el agua.</li> </ul>					
 <p><i>las tibias anteriores son curvas y afiladas</i></p> <p><i>cuerpo redondeado</i></p> <p><b>ILYOCORIS CIMICOIDES</b> se encuentra en Europa. Pese a tener las alas bien desarrolladas, rara vez o nunca vuela.</p>					
Longitud 0,6–1,8 cm		Alimentación 			

Orden	HEMIPTERA	Familia	NEPIDAE	N.º de especies	250
<h2>NÉPIDOS</h2> <p>Son pardogrisáceos o pardorrojizos y se dividen en dos géneros. Las especies del género <i>Nepa</i> son ovaladas, aplanadas y con patas bastante cortas; las de <i>Ranatra</i> son alargadas, con las patas largas. Las fuertes patas anteriores capturan presas y las otras se usan para andar.</p> <p>Hay un largo sifón respiratorio en el extremo del abdomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Las hembras ponen sus huevos dentro de los tejidos vegetales. Los adultos y ninfas se comunican frotando la base de sus patas contra el cuerpo.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en las regiones más cálidas. En arroyos de curso lento, estanques y charcas.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> La mayoría de especies tienen alas pero rara vez vuelan.</li> </ul>					
 <p><i>patas anteriores modificadas para la captura</i></p> <p><i>ojos grandes que ayudan a buscar presas</i></p> <p><i>cuerpo de forma alargada</i></p> <p><i>el sifón respiratorio puede ser tan largo como el cuerpo</i></p> <p><i>cuerpo ovalado y aplanado</i></p> <p><i>sifón respiratorio</i></p> <p><b>NEPA CINERA</b>, el Escorpión acuático, tiene forma ovalada y alas bastante cortas. Se encuentra en Europa, en el norte de África y en partes de Asia.</p> <p><b>RANATRA LINEARIS</b>, el Insecto palo acuático, es típico del género <i>Ranatra</i>. Pasa su tiempo descansando en la vegetación acuática, a la espera de las presas.</p>					
Longitud 1,5–4,8 cm		Alimentación 			

Orden	HEMIPTERA	Familia	NOTONECTIDAE	N.º de especies	350
<h2>NOTONÉCTIDOS</h2> <p>Los adultos son compactos y buenos voladores. La cara superior del cuerpo suele ser pálida y convexa, con una cresta central. La inferior, que está orientada hacia arriba cuando nadan, es parda oscura o negra. Las patas anteriores y medias capturan presas, y las posteriores, largas y orladas de pelos, sirven para nadar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Los machos atraen a las hembras frotando parte del rostro contra las patas anteriores. Éstas ponen huevos en series de hasta diez, en plantas acuáticas.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Charcas, estanques y orillas lacustres.</li> </ul>					
 <p><i>ojos grandes, oscuros y brillantes</i></p> <p><i>rostró</i></p> <p><i>patas posteriores largas usadas para nadar</i></p> <p><b>NOTONECTA GLAUCA</b>, el Garapito, es común en charcas y acequias de gran parte de Europa. Es sensible a las vibraciones y usa sus grandes ojos para localizar a las presas que se acercan.</p>					
Longitud 0,2–1,7 cm		Alimentación 			



Orden	HEMIPTERA	Familia	PENTATOMIDAE	N.º de especies	5,500
-------	-----------	---------	--------------	-----------------	-------

## CHINCHES HEDIONDAS

También denominadas chinches escudo por su forma distintiva, pueden producir fuertes olores defensivos con sus glándulas torácicas. Muchas son verdes o pardas pero algunas muestran colores brillantes.

• **CICLO VITAL** Ponen grupos de huevos en forma de barril sobre las plantas. Hay cinco estadios ninfales. Muchas ninfas son herbívoras pero después se vuelven depredadoras o de alimentación mixta.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre vegetación baja y árboles.



**EURYDEMA DOMINULUS** avisa a los depredadores de su mal sabor con su viva coloración. Habita en toda Europa.



**NEZARA VIRIDULA**, la Chinche verde de las verduras, es una plaga cosmopolita de las frutas, verduras y cereales.

Longitud 0,5–2,5 cm

Alimentación

Orden	HEMIPTERA	Familia	PYRRHOCORIDAE	N.º de especies	400
-------	-----------	---------	---------------	-----------------	-----

## CHINCHES ROJAS


También denominados Chinches de fuego por su coloración brillante negra y roja o anaranjada, estos conspicuos insectos tienen a menudo el cuerpo bastante alargado.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en suelo húmedo o en detritos, o entre las semillas de la planta huésped. Muchas especies se alimentan de las semillas y jugos de sus plantas huésped.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, especialmente en las regiones más cálidas. Sobre plantas de las Malvaceae u otras familias.

• **OBSERVACIÓN** Algunas especies del género *Dysdercus* son plagas de los cultivos de algodón. Tienen las cápsulas de algodón debido a un hongo que se introduce cuando se alimentan.

**LOHITA GRANDIS**, la Chinche roja gigante, es una plaga forestal en el norte de la India. Se alimenta de distintos árboles que son valiosas fuentes madereras.



Longitud 0,8–2,2 cm; algunas especies hasta 5 cm

Alimentación

Orden	HEMIPTERA	Familia	REDUVIIDAE	N.º de especies	6,000
-------	-----------	---------	------------	-----------------	-------

## CHINCHES ASESINAS

Deben su nombre a sus hábitos depredadores. El cuerpo es desde muy robusto hasta muy alargado con las patas filiformes. De color oscuro pero algunas tienen marcas brillantes. La cabeza tiene un rostro corto, curvo y trisegmentado. Las patas anteriores son fuertes y más cortas que las otras cuatro, lo que es ideal para agarrar presas.

• **CICLO VITAL** Ponen hasta 50 huevos en grietas o en el suelo, o los enganchan al follaje. Los machos de algunas especies los protegen.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales. En gran variedad de hábitats.

• **OBSERVACIÓN** Algunas chinches chupadoras de sangre transmiten la enfermedad de Chagas.



**GARDENA MELANARTHURUM** pertenece a un grupo de especies pequeñas y muy delgadas que viven en las plantas, la hojarasca y cuevas. Algunas viven en telarañas y se alimentan de las presas.

patas anteriores fuertes y relativamente cortas

marcas brillantes



**PLATYMERIS BIGUTTATA** es una especie muy grande que se usa en laboratorios y como "animal de compañía". Su saliva tóxica puede causar ceguera temporal.



Las especies del género *CENTRASPIS* son nativas de Mozambique y Guinea. Las tres especies de este género cazan insectos en el suelo y la vegetación.

**RHINOCORIS ALLUAUDI** puede producir sonidos rascando su rostro contra una especie de lima situada en la parte inferior del tórax.

Longitud 0,7–4 cm

Alimentación



Orden	HEMIPTERA	Familia	SALDIDAE	N.º de especies	300
<b>CHINCHES DE RIBAZO</b> Estas chinches pequeñas y ovaladas son pardas o negras. La cabeza tiene un rostro largo y unos ojos grandes con una muesca en el margen posterior. Pueden saltar para escapar de los depredadores. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen huevos en la base de hierbas o en el musgo. Algunas ninfas cavadoras.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Sobre orillas fangosas de saladares, arroyos y charcas. A orillas del mar, entre la vegetación y las algas marinas.</li> </ul>					
Longitud		3-7 mm		Alimentación	



Las especies del género *SALDULA* viven junto a charcas de agua dulce. Manchas en las alas.

Orden	HEMIPTERA	Familia	SCUTELLERIDAE	N.º de especies	500
<b>ESCUTELÉRIDOS</b> Suelen tener colores brillantes. El cuerpo es convexo y redondeado o bien alargado y ovalado. La parte media del tórax en forma de escudo (escutelo) es muy grande y cubre casi todo el abdomen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos redondeados en grupos y los enganchan a las plantas. Adultos y ninfas chupan savia.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en las regiones más cálidas. En la vegetación.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Varias especies son plaga de los cereales y el algodón.</li> </ul>					
Longitud		0,6-2,2 cm		Alimentación	



Las especies de *CALLIPHARA* tienen aspecto de escarabajo, típico de esta familia. Viven en Australia, Nueva Guinea, Indonesia y Filipinas.


Orden	HEMIPTERA	Familia	TINGIDAE	N.º de especies	2.000
<b>CHINCHES DE ENCAJE</b> Estas pequeñas chinches se distinguen por los dibujos y relieves como de encaje de la cara superior de las alas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Las hembras insertan sus huevos en el tejido de las plantas huésped. Algunas tienen un comportamiento maternal complejo.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Sobre plantas herbáceas y árboles.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Muchas son plagas, pero algunas se usan para destruir malas hierbas.</li> </ul>					
Longitud		2-5 mm		Alimentación	



▷ *TINGIS CARDUI* es una chinche de encaje europea que se nutre de cardos. Puede parecer gris pálido debido a una cera ligera que la recubre.

◁ *DEREPHYSIA FOLIACEA*, con sus alas en encaje, prefiere la hiedra como huésped. Fue descubierta en Norteamérica, en 1987.

Orden	HEMIPTERA	Familia	APHROPHORIDAE	N.º de especies	850
<b>AFROFÓRIDOS</b> Similares a los cercópidos (abajo), son también buenos saltadores. Muchas especies son de color marrón, con motas y franjas de colores. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en hendiduras del tejido vegetal. Las ninfas, blandas y pálidas, viven bajo una capa protectora de espuma que fabrican mezclando un fluido especial con aire y expulsándolo por el ano.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Sobre vegetación de bajo porte y árboles.</li> </ul>					
Longitud		0,6-1,2 cm		Alimentación	



*APHROPHORA ALNI* es una especie común en toda Europa. Vive sobre varias plantas herbáceas.

*BALSANA SUBFASCIATA* es oriunda de Brasil y tiene unas características franjas de color en las alas.

Orden	HEMIPTERA	Familia	CERCOPIDAE	N.º de especies	2.400
<b>CERCÓPIDOS</b> Rechonchos, con ojos redondos y gran capacidad para el salto. Muchos tienen una coloración apagada pero algunos están coloreados de rojo y negro o de amarillo y negro. Se parecen a los afrofóridos (arriba) y se confunden con los cicadélidos (ver pág. 96). <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Poco se sabe sobre su ciclo vital, aunque algunos ponen sus huevos en o sobre el suelo.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en las regiones más cálidas. Sobre una amplia variedad de árboles y plantas herbáceas.</li> </ul>					
Longitud		0,5-2 cm		Alimentación	



▷ *GYNOPYGOPLAX THEORA* es oriunda de Filipinas y Corea. Es un gran saltador y sus alas muy coloreadas alejan a los depredadores.

◁ Las ninfas de *CERCOPIS VULNERATA* viven bajo tierra, protegidas por una espuma que producen. Comen raíces de plantas.



Orden	HEMIPTERA	Familia	CICADELLIDAE	N.º de especies	16.000
-------	-----------	---------	--------------	-----------------	--------

## CICADÉLIDOS, CIGARRILLAS SALTADORAS

Son esbeltos, con la cabeza ancha y triangular. Muchos son pardos o verdes, aunque algunos tienen brillantes rayas o motas. Son muy buenos saltadores con distintivas tibias posteriores, que tienen una sección transversal angulosa, y una o más hileras de pequeñas espinas que recorren toda su longitud.

• **CICLO VITAL** Se comunican con sus parejas produciendo sonidos con unos órganos abdominales. Las hembras ponen hileras o racimos de huevos bajo la epidermis de las plantas huésped.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En cualquier lugar con vegetación.

• **OBSERVACIÓN** Son plagas de cultivos vitales como arroz y maíz.



Δ *GRAPHOCEPHALA COCCINEA* se encuentra en la zarzamora y en las plantas ornamentales en Norteamérica, y en los rododendros en Europa.



*LEDRA AURITA* es muy grande, con el cuerpo aplanado. Tiene una coloración similar a la corteza cubierta de líquen.

Longitud 0,3–2 cm; la mayoría menos de 1,5 cm

Alimentación


Orden	HEMIPTERA	Familia	CICADIDAE	N.º de especies	2.500
-------	-----------	---------	-----------	-----------------	-------

## CIGARRAS

Tienen una coloración críptica parda o verde y una forma distintiva, ahusada y con la cabeza roma.

• **CICLO VITAL** Los sonoros cantos del macho son producidos por un par de órganos abdominales. Las hembras practican con el ovopositor hendeduras en árboles, en las que ponen sus huevos. Al eclosionar, las ninfas se entierran en el suelo para emerger luego y trepar por los troncos para su muda final. Pueden tardar muchos años en desarrollarse.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en las regiones más cálidas. Sobre árboles y arbustos.



Δ *ANGAMIANA AETHEREA* se encuentra en la India. Produce de sonidos que usa para el cortejo y como señal de agresión.



*PYCNA REPANDA*, que vive en la India, se encuentra comúnmente posada y alimentándose de una serie de especies arbóreas.

Longitud 2,3–5,5 cm

Alimentación

Orden	HEMIPTERA	Familia	DERBIDAE	N.º de especies	800
-------	-----------	---------	----------	-----------------	-----

## DÉRBIDOS

Muchos están vivamente coloreados de amarillo, pardo o marrón. Patas finas, cabeza pequeña y ojos grandes, y alas largas y estrechas.

• **CICLO VITAL** Poco conocido. Algunos ponen sus huevos en madera o grietas de la corteza.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en el trópico y el subtropico. Sobre árboles y hongos leñosos sobre madera en descomposición.



*DERBE LONGITUDINALIS* tiene el aspecto frágil, como de mariposa nocturna, típico de los dérbidos. Se encuentra en Bolivia y Ecuador.

Longitud 0,7–1,2 cm

Alimentación

Orden	HEMIPTERA	Familia	FULGORIDAE	N.º de especies	800
-------	-----------	---------	------------	-----------------	-----


## FULGÓRIDOS

Su rasgo más distintivo es la larga cabeza, que puede tener formas muy extrañas.

En reposo, se confunden con el entorno; si los amenazan, destellan los ocelos de las alas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en las plantas huésped, protegiéndolos con una secreción.

• **DISTRIBUCIÓN** En regiones tropicales y subtropicales. En hábitats provistos de vegetación.



Δ *FULGORA LATERNARIA* tiene una cabeza bulbosa de la que antes se decía que emitía luz. Vive en América Central y del Sur y en las Antillas.



*PHRICTUS QUINQUEPARTITUS*, con sus alas coloreadas y su cabeza inusual, se encuentra en la vegetación, en Panamá, Brasil y Colombia.

Longitud 1–10 cm

Alimentación



Orden	HEMIPTERA	Familia	MEMBRACIDAE	N.º de especies	2.500
-------	-----------	---------	-------------	-----------------	-------

## MEMBRÁCIDOS

Estos insectos saltadores y arbóreos son en su mayoría de color verde, pardo o negro. Algunos, no obstante, presentan colores brillantes. Se distinguen de otros hemipteros por la forma de su pronoto. Ésta varía desde la de una espina o púa, lo que dificulta el ataque de los depredadores, hasta una estructura grande y compleja que puede actuar como un efectivo disfraz. Las ninfas carecen del pronoto agrandado, pero pueden tener espinas dorsales o expansiones laterales.

• **CICLO VITAL** Depositán sus huevos en el interior de los tejidos vegetales y los jóvenes atraviesan cinco estadios ninfales antes de llegar a la fase adulta. Se alimentan en grupo y chupan la savia de las plantas. A menudo se asocian con hormigas que "ordeñan" las ninfas por su excremento rico en carbohidratos (ligamaza). A cambio de comida, las hormigas los defienden.


• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en las regiones más cálidas. Sobre los árboles, en una gran variedad de hábitats.



Δ Las especies del género *UMBONIA* viven en Sudamérica, partes de Norteamérica y el sureste de Asia. El pronoto siempre tiene forma de espina y es muy puntiagudo, tanto que puede atravesar los zapatos y pinchar la piel.



▷ **HEMIKYPHTA MARGINATA** es oriundo de Brasil. Visto desde arriba (como aquí se muestra), tan sólo es visible el pronoto grande y similar a una púa que desalienta a las aves insectívoras.



Longitud 0,5–1,5 cm

Alimentación

Orden	HEMIPTERA	Familia	ALEYRODIDAE	N.º de especies	1.200
-------	-----------	---------	-------------	-----------------	-------


## MOSQUITAS BLANCAS

Parecen polillas diminutas. La cabeza lleva dos antenas con 7 artejos y las conspicuas alas son blancas o moteadas, con una distintiva capa de cera blanca y pulverulenta.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos sobre unos pedúnculos diminutos en el envés de las hojas. Cuando las ninfas eclosionan, pueden andar. En la primera muda pierden sus patas y luego se convierten en chupadoras de savia.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, especialmente en las regiones más cálidas. En una amplia gama de plantas huésped.

• **OBSERVACIÓN** Muchas son plagas graves. Entre los ejemplos más conocidos figuran *Trialeurodes vaporariorum* (ver ilustración) y *Bemisia tabaci*, una plaga muy difundida del algodón.



*TRIALEURODES VAPORARIORUM*, la Mosquita blanca de los invernaderos, es una plaga de los pepinos y tomates cultivados en invernadero. También puede atacar los cultivos al aire libre.

Longitud 1–3 mm

Alimentación

Orden	HEMIPTERA	Familia	APHIDIDAE	N.º de especies	2.250
-------	-----------	---------	-----------	-----------------	-------

## PULGONES COMUNES

Son pequeños, de cuerpo blando y en su mayoría verdes, rosas, negros o pardos. El abdomen suele llevar un par de tubos cortos, los cornículos, que segregan una sustancia contra los depredadores.

• **CICLO VITAL** Las hembras producen grandes colonias por partenogénesis asexual (los huevos se desarrollan sin fertilización) y suelen generar ninfas. Los adultos con alas migran a una planta huésped donde continúan la alimentación con savia y la reproducción partenogenética. Luego, más pulgones alados regresan a la planta huésped, donde los machos y las hembras se aparean otra vez.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Donde haya plantas huésped.

• **OBSERVACIÓN** Los pulgones son los más destructores de todos los insectos que se alimentan de plantas. Casi todas las plantas cultivadas se ven afectadas por ellos y por las enfermedades víricas que transmiten.



*MACROSIPHUM ALBIFRONS*, el Pulgón americano del altramu, se encuentra hoy en gran parte de Europa. Es una plaga y transmite enfermedades como el virus amarillo del mosaico.

Longitud 1–8 mm; la mayoría 5 mm

Alimentación



Orden	HEMIPTERA	Superfamilia	COCCOIDEA	N.º de especies	7.000
-------	-----------	--------------	-----------	-----------------	-------

## COCHINILLAS

La coloración varía mucho en esta superfamilia. Las hembras sedentarias y sin alas son planas y alargadas u ovaladas. Puede tener una capa blanda o escamosa de secreciones cerosas. Los machos, que son poco comunes, tienen un aspecto muy distinto y pueden ser alados o ápteros.

• **CICLO VITAL** Las ninfas y las hembras adultas son chupadoras de savia. La reproducción puede ser asexual o sexual, y el potencial reproductor de muchas especies es inmenso. Las hembras ponen huevos, en las plantas huésped, o generan ninfas. Las ninfas recién eclosionadas pueden perder sus patas y volverse sedentarias.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en regiones subtropicales y tropicales. Sobre plantas huésped, en muchos hábitats.

• **OBSERVACIÓN** Muchas especies infestan cultivos como cítricos y cafetales.



cochinillas  
harinosas  
arracimadas

cuerpo  
oscuro,  
como con  
escamas  
insectos en  
las nervaduras  
de la hoja



Δ *SAISSETIA NIGRA* es una plaga de los árboles y plantas de mandioca, y ataca la nuez moscada, la canela y la teca.



"perlas del suelo"

Δ Las especies del género *MARGARODES* producen ninfas enquistadas denominadas "perlas del suelo", que atacan las raíces de las hierbas.



capa cerosa de la hembra

Δ *CEROCOCCUS QUERCUS* causa grandes daños en los árboles ornamentales de Norteamérica.



capa blanca y pulverulenta

*DACTYLOPIUS TOMENTOSUS* ha sido utilizada para controlar los cactus invasores en algunas zonas de Sudáfrica.

Longitud 0,1–3 cm; la mayoría menos de 1 cm

Alimentación

Orden	HEMIPTERA	Familia	PSYLLIDAE	N.º de especies	1.500
-------	-----------	---------	-----------	-----------------	-------

## PSÍLIDOS

Parecen pequeños cicadélidos (ver pág. 96) pero con las antenas largas. Dos pares de alas ovaladas en tejadillo. Pico corto y trisegmentado.

• **CICLO VITAL** Ponen huevos con pedúnculo en las plantas, y algunos pueden causar formación de agallas o abarquillamiento de hojas. Las ninfas aplanadas adquieren unas almohadillas alares.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre plantas huésped, en diversos hábitats.

• **OBSERVACIÓN** Algunos son plagas importantes.

alas en  
tejadillo  
cuando  
descansa

pequeñas  
pintas negras  
en alas  
anteriores



*CACOPSYLLA PYRICOLA*, el Psílido de los perales, es una plaga importante de los perales en todo el hemisferio norte.

Longitud 1,5–5 mm

Alimentación

## TRIPS

EL ORDEN TISANÓPTEROS contiene 8 familias y 5.000 especies que reciben el nombre de trips. Son pequeños y delgados, con dos pares de alas estrechas y orladas de pelos. La cabeza lleva unas antenas cortas, unos conspicuos ojos compuestos y unas distintivas piezas bucales chupadoras con un par de mandíbulas, una pequeña y la otra en forma de aguja. Hay una estructura pegajosa e hinchable entre las garras tarsales que ayuda a agarrarse a las superficies lisas.

Los trips están emparentados con las chinches pero son inusuales porque su metamorfosis no es completa ni incompleta. Como en los himenópteros (ver

págs. 178-206), los huevos fecundados producen hembras y los no fecundados generan machos. Existen también uno o más estadios pupales tras los dos estadios ninfales. Las hembras de algunas especies tienen un ovopositor en forma de sierra y ponen sus huevos dentro de tejidos vegetales, mientras que otras carecen de ovopositor y los ponen en grietas o en la superficie de las plantas huésped.

Los trips pueden ser herbívoros o depredadores. Unas pocas especies muestran formas simples de comportamiento social y en algunas hay soldados que defienden sus colonias. Muchos trips son plagas de los cereales.

Orden	THYSANOPTERA	Familia	AEOLOTHRIPIDAE	N.º de especies	250
-------	--------------	---------	----------------	-----------------	-----

## EOLOTRÍPIDOS

También llamados trips depredadores por los hábitos alimentarios de algunas especies, son de color marrón amarillento u oscuros. El cuerpo es redondo en sección transversal, y las alas, que descansan paralelas cuando están plegadas, tienen con frecuencia franjas transversales.

• **CICLO VITAL** Aunque la mayoría de los eolotrípidos se alimentan de otros insectos pequeños, algunas especies se alimentan de granos de polen. Las hembras ponen huevos dentro de las plantas huésped con un ovopositor en forma de sierra. Cuando las ninfas amarillas o anaranjadas completan su desarrollo, forman un capullo de seda bajo tierra.

• **DISTRIBUCIÓN**


Cosmopolitas, sobre todo en las regiones cálidas. Sobre plantas huésped, y especialmente sobre flores, en diversos hábitats.

alas con franjas  
coloración negra  
brillante



Las especies del género *AEOLOTHRIPS* se reconocen a menudo por sus alas con franjas. La mayoría de las especies de este género se hallan sólo en el hemisferio norte.

orlas de pelos  
en las alas



cabeza roma, distintiva

abdomen moteado

*AEOLOTHRIPS TENUICORNIS* es común en toda Europa, sobre todo entre las flores amarillas de las leguminosas y compuestas.

Longitud 1–2 mm (longitud del cuerpo)

Alimentación



Orden THYSANOPTERA	Familia PHLAEOTHIRIPIDAE	N.º de especies 2.700
--------------------	--------------------------	-----------------------

## TRIPS DE COLA EN TUBO

Cuerpo más robusto y más grande que el de la mayoría de trips. El abdomen tiene un extremo tubular y puntiagudo. La mayoría son oscuros, pero con alas claras o moteadas. Cuando están plegadas, se solapan entre sí.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en grietas y hendeduras. La mayoría comen hongos, algunos se alimentan dentro de agallas, sobre plantas o en la madera descompuesta. Las ninfas suelen ser rojas o amarillentas, comen con los adultos y se comunican con sonidos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones tropicales y subtropicales. Sobre plantas herbáceas y arbustos; en la hojarasca.
- **OBSERVACIÓN** Algunas son plagas.

último segmento abdominal  
cilíndrico y fusiforme

alas en proceso  
de desarrollo



Las especies de la familia PHLAEOTHIRIPIDAE comen plantas. Este espécimen está posado sobre una bromeliácea en Sudamérica. No tardará en mudar y desarrollar completamente las alas.

Longitud 0,1-1,2 cm; la mayoría menos de 5 mm	Alimentación
---	--------------

Orden THYSANOPTERA	Familia THIRIPIDAE	N.º de especies 1.750
--------------------	--------------------	-----------------------

## TRIPS COMUNES

La coloración varía del amarillo pálido al pardo o negro. Las alas, orladas de pelos, son muy estrechas, puntiagudas y a menudo con franjas. Las hembras tienen un ovopositor que se dobla hacia abajo.

- **CICLO VITAL** La reproducción puede ser asexual y las hembras insertan los huevos con el ovopositor dentro de plantas o flores. Los adultos y las ninfas chupan jugos vegetales, aunque algunos comen hongos o sorben los jugos de otros insectos. Cuando se desarrollan las ninfas entran en un estadio pupal, dentro de la planta o en el suelo.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre hojas y flores de muchas plantas huésped.
- **OBSERVACIÓN** Muchos son plagas graves de muchos cultivos, entre ellos el tabaco, el algodón y las judías.

ojos con grandes  
facetas

cuerpo aplanado  
y oscuro

pelos oscuros en  
el cuerpo



*THRIPS FUSCIPENNIS* es una especie de color oscuro con unos pelos distintivos en el cuerpo. Muy difundido en el hemisferio norte, se halla en una amplia gama de especies vegetales.

el tercer artejo de las  
antenas (con ocho  
segmentos) es pálido

*THRIPS SIMPLEX*, el Trips del gladiolo, es originario de África austral pero hoy se encuentra dondequiera que se cultiven flores de gladiolo.



cuerpo oscuro y  
brillante

alas claras y orladas  
de pelos

tarsos pálidos

Longitud 0,7-2 mm	Alimentación
-------------------	--------------

# MEGALÓPTEROS

**E**L ORDEN DE LOS MEGALOPTERA es relativamente pequeño. Se divide en 2 familias y 300 especies. Son los insectos más primitivos que presentan metamorfosis completa. Hay dos familias distintas: los siálidos (*Sialidae*) y los coridálidos (*Corydalidae*).

Ambas familias tienen el cuerpo blando y una coloración apagada, con dos pares de grandes alas de un tamaño casi

similar. Al doblarse adoptan una posición de tejadillo sobre el cuerpo. Malas voladoras, nunca se alejan del agua.


Los adultos pueden tener grandes mandíbulas pero no se alimentan. Sus larvas, acuáticas y con branquias abdominales, son depredadoras y comen todo lo que pueden matar. Después de hasta 11 estadios larvales, la pupación ocurre en una cámara construida por la larva en el suelo.

Orden MEGALOPTERA	Familia CORYDALIDAE	N.º de especies 200
-------------------	---------------------	---------------------

## CORIDÁLIDOS

Las alas de estos insectos grandes y de cuerpo blando son transparentes o tienen zonas grises o pardas. Tres ocelos. Machos con enormes mandíbulas para combatir por las hembras o sujetarlas.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos cerca del agua. Las larvas, que viven en el fondo, tienen ocho pares de filamentos simples con mechones branquiales en la base.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en regiones templadas. En aguas corrientes.



**LAS LARVAS** tienen dos propodios en forma de gancho en el extremo.

Las especies del género *CHAULIODES* tienen los vértices de la cabeza claramente redondeados.

Longitud 2,5-7,5 cm; hasta 15 cm de envergadura	Alimentación de la larva
---	--------------------------

Orden MEGALOPTERA	Familia SIALIDAE	N.º de especies 100
-------------------	------------------	---------------------

## SIÁLIDOS

Son oscuros, de alas ahumadas mucho más pequeños que los coridálidos y sin ocelos. Los adultos descansan en la vegetación a orillas del agua.

- **CICLO VITAL** Ponen grandes masas de huevos cerca del agua, donde caen las larvas eclosionadas, que tardan un año en madurar. Tienen siete pares de branquias laterales plumosas y un filamento caudal en el extremo del abdomen.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en regiones templadas. En charcas, canales y arroyos.



**LAS LARVAS** tienen patas y andan por el fondo.

Las especies del género *SIALIS* abundan en el hemisferio norte. Las larvas salen del agua y se transforman en pupas en la orilla.

Longitud 1-2 cm; la mayoría menos de 1,5 cm	Alimentación de la larva
---	--------------------------



## "MOSCAS" SERPIENTE

**R**APHIDIIDAE Y INOCELLIDAE son las dos familias que forman el orden de los raphidiopteros, que contiene 150 especies en total. Ambas familias tienen rasgos similares. Las "moscas" serpiente tienen dos pares de alas y una cabeza levemente aplanada con piezas bucales dirigidas hacia delante que utilizan para masticar. El pronoto es alargado. Las especies de Inocellidae, la menor de las dos familias, se distinguen de las Raphidiidae por carecer de ocelos y por sus antenas largas. Las "moscas" serpiente están estrechamente emparentadas con los sílidos (ver p. 103), pero sus larvas son terrestres y no tienen branquias.

Las "moscas" serpiente viven en terrenos arbolados con abundante vegetación. Tanto los adultos como las larvas son depredadores pero también consumen materia orgánica muerta.

Durante el apareamiento, el macho se coloca debajo de la hembra. Ésta puede poner varios centenares de huevos, en grupos de hasta 100, dentro de la corteza de un árbol o en madera en descomposición. La metamorfosis es completa.

El nombre de "moscas" serpiente alude al modo como los adultos atrapan sus presas: levantan la cabeza situada en el extremo de su alargado protórax y se mueven hacia delante para capturarlas.

Orden	RAPHIDIOPTERA	Familia	RAPHIDIIDAE	N.º de especies	85
-------	---------------	---------	-------------	-----------------	----

### "MOSCAS" SERPIENTE

Son de color oscuro y tienen un distintivo cuello formado por un pronoto alargado sobre el que se alza la cabeza. Ésta es ancha a nivel de los ojos y ahusada hacia atrás. Las hembras son algo mayores que los machos.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en hendeduras de la corteza con un ovopositor largo y delgado. Las alargadas larvas se hallan bajo la corteza medio suelta, en tocones en descomposición y entre la hojarasca. Se alimentan de larvas de escarabajos y de otros insectos de cuerpo blando.

• **DISTRIBUCIÓN** Principalmente en el hemisferio norte. En los bosques, entre la vegetación.



**LAS LARVAS** son planas, con la cabeza cuadrada, los ojos pequeños, las mandíbulas cortas y curvas y las patas fuertes.



△ Las especies del género *AGULLA* viven en Norteamérica, desde las Rocosas hasta la costa del Pacífico.

*XANTHOSTIGMA XANTHOSTIGMA* tiene un largo pronoto y una cabeza ancha y diferenciada que se ahúsa hacia atrás. La cuatro alas son de tamaño casi igual.

Envergadura 0,6–3 cm

Alimentación de la larva

## HORMIGAS LEÓN, CRISOPAS Y AFINES

**E**L ORDEN DE LOS NEURÓPTEROS comprende 17 familias y 4.000 especies. Suelen tener grandes ojos compuestos, piezas bucales masticadoras y antenas que son más largas que la cabeza y el tórax combinados. Con dos pares de alas del mismo tamaño, que llevan a modo de tejadillo sobre el cuerpo cuando no las utilizan. Las principales venas alares se ramifican cerca de los márgenes.

Los adultos de este orden son depredadores pero unos pocos se alimentan de polen y néctar. La mayoría cazan al atardecer o después del ocaso.

La metamorfosis es completa. Las larvas tienen piezas bucales curvas que forman un tubo hueco a través del cual sorben los jugos de la presa. Después de tres estadios ninfales, las larvas se transforman en pupas dentro de un frágil capullo.

Orden	NEUROPTERA	Familia	ASCALAPHIDAE	N.º de especies	450
-------	------------	---------	--------------	-----------------	-----

### ASCALÁFIDOS


Grandes, conspicuos y con dibujos muy vistosos en las alas, son activos sobre todo de noche y son atraídos por las luces. El cuerpo gris, negro o pardorrojizo es alargado, y las antenas tienen el extremo en forma de maza. Las alas pueden ser pálidas o ahumadas, con márgenes amarillos o más oscuros. Los adultos son ágiles cazadores en vuelo.

- **CICLO VITAL** Ponen hileras o espirales de hasta 50 huevos sobre ramitas o tallos de hierba. Las larvas esperan en el suelo, en la hojarasca o en troncos a las presas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones cálidas. En herbazales o en terrenos arbolados cálidos y secos.
- **OBSERVACIÓN** Algunos con aspecto muy similar al de las libélulas (ver págs. 53-55) si bien el parecido es superficial.



**LAS LARVAS** son ovaladas y planas, con expansiones laterales. Algunas tienen mandíbulas con un gran ángulo de abertura.

*LIBELLOIDES COCCAJUS* es una especie europea con alas distintivas y una gran zona negra en la base de las alas posteriores.



Envergadura 3–12 cm

Alimentación de la larva




Orden NEUROPTERA	Familia CHRYSOPIDAE	N.º de especies 1.600
------------------	---------------------	-----------------------

## CRISOPAS

Aunque algunas son pardas, suelen ser verdes. Las alas son irisadas, con venas que forman complejos dibujos y que se bifurcan en los márgenes alares. Los adultos son nocturnos y entran en las casas para hibernar. Muchas tienen sensores en las alas para detectar los murciélagos.

• **CICLO VITAL** Ponen huevos pedunculados sobre la vegetación y las pálidas larvas pupan en capullos de sedasujetos a las hojas. Las crisopas comen pulgones, trips, cochinillas y ácaros.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre la vegetación, en varios tipos de hábitat, incluidos, zonas áridas y los hormigueros.



venas bifurcadas  
en el margen  
posterior

antenas largas y  
filiformes

Las especies del género *CHRYSOPA* son delicadas y con grandes alas. Cuando descansan, ponen alas en tejadillo.



ojos brillantes,  
dorados o rojizos

dos venas en zigzag en la  
mitad externa de las alas

*NOTHOCHRYSA CAPITATA* es mayor y más apagada que las crisopas verdes. Se encuentra cerca de los troncos de varios árboles y en las copas de robles y pinos.



**LAS LARVAS** tienen mandíbulas curvas y patas bien desarrolladas.

Envergadura 1-5 cm	Alimentación de la larva *
--------------------	----------------------------

Orden NEUROPTERA	Familia MANTISPIDAE	N.º de especies 300
------------------	---------------------	---------------------

## MANTÍSPIDOS

Tienen unas patas anteriores idénticas a las de las mantis religiosas (ver p. 73), que utilizan para cazar. El primer segmento del tórax es alargado y los dos pares de estrechas alas tienen un tamaño similar.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en grupos de varios centenares sobre la corteza. Las jóvenes ninfas son móviles y depredan los sacos de huevos de las arañas, en cuyo interior se alimentan. Algunas especies parasita abejas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en regiones cálidas, templadas y tropicales. En zonas con abundante vegetación.



**LA LARVAS** tienen 3 pares de patas torácicas. Parecen larvas de mosca cuando maduran.



alas como las  
de una avispa

"cintura" como  
de avispa

marcas negras y  
amarillas

Las especies del género *CLIMACIELLA* tienen una forma distintiva. La que aquí se muestra se protege del ataque por su aspecto de avispa.

Envergadura 1-5,5 cm	Alimentación de la larva *
----------------------	----------------------------

Orden NEUROPTERA	Familia MYRMELEONTIDAE	N.º de especies 1.000
------------------	------------------------	-----------------------

## HORMIGAS LEÓN

Grandes, esbeltos y blandos, se parecen a los caballitos del diablo (ver págs. 51-53). La cabeza es más ancha que el pronoto, con ojos grandes y conspicuos y unas antenas terminadas en maza que tienen la longitud aproximada de la cabeza y el tórax juntos. Las alas, largas y estrechas, pueden tener dibujos pardos o negros.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el suelo o en la arena, solos o en pequeños grupos. Las larvas comen insectos y arañas. Algunas hormigas león construyen hoyos cónicos para atrapar a sus presas. Las larvas viven dentro, sacando sólo sus mandíbulas, y les arrojan granos de arena para que caigan en su guarida. Otras viven en troncos, en el suelo y los detritos, o bajo piedras.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en zonas semiáridas, en el trópico y el subtropico. En bosques abiertos, herbazales con arbustos y zonas secas y arenosas.



**LAS LARVAS** tienen mandíbulas grandes, denticuladas y curvas. El abdomen disminuye hacia atrás gradualmente.



alas largas y  
estrechas


alas de color  
amarillo limón con  
un dibujo pardo

ojos grandes

pintas negras  
en la cabeza y  
en el pronoto

▷ **TOMATAES CITRINUS**

debe su nombre a sus alas de color amarillo limón y es probable que tenga mal sabor para sus depredadores. Muchos miembros de este género se hallan en África.



antenas cortas y  
acabadas en maza

cabeza más ancha  
que el pronoto

abdomen  
amarillo con  
una lista  
central oscura

abdomen  
largo y estrecho

los machos tienen unos órganos  
sexuales prensiles que recuerdan  
a las pinzas de las tijeretas

**PALPARES LIBELLULOIDES** es diurna y muy grande, con las alas muy moteadas. Es común localmente en el sur de Europa y la región mediterránea.

Envergadura 3-12 cm	Alimentación de la larva *
---------------------	----------------------------



Orden NEUROPTERA	Familia NEMOPTERIDAE	N.º de especies 150
------------------	----------------------	---------------------

### NEMOPTÉRIDOS

Las alas anteriores suelen ser grandes y con dibujos, y las posteriores son largas, delgadas y con los extremos redondeados, o bien largas y filiformes.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en suelos secos o arena bajo las rocas y entradas de cuevas. Las larvas se desarrollan *in situ* y pupan en un capullo de seda.
- **DISTRIBUCIÓN** En áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo salvo Norteamérica. En el suelo.



• alas anteriores grandes, con marcas en zigzag

• alas posteriores muy largas y filiformes

*NEMOPTERA SINUATA* es del sur de Europa. Tiene marcas pardas en las alas anteriores y franjas pardas en el extremo de las posteriores.

**LAS LARVAS** tienen el cuello muy alargado.


Envergadura 2–8 cm      Alimentación 

Orden NEUROPTERA	Familia OSMYLIDAE	N.º de especies 150
------------------	-------------------	---------------------

### OSMÍLIDOS

Estos esbeltos neurópteros tienen alas anchas, marcadas con dibujos, y antenas filiformes.

- **CICLO VITAL** Ponen hileras de huevos en troncos u hojas de árboles cerca del agua. Algunas larvas son semiacuáticas y comen larvas de insectos; otras viven bajo la corteza.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo en Norteamérica. En bosques cerca de un curso de agua permanente.




• antenas filiformes

• alas anchas y moteadas

*OSMYLUS FULVICEPHALUS* está muy difundido en Europa. Como todos los osmílidos, es mal volador a pesar de su alas grandes.

**LAS LARVAS** tienen piezas bucales rectas y a modo de agujas.


Envergadura 1,4–3 cm      Alimentación de la larva 

Orden NEUROPTERA	Familia SISYRIDAE	N.º de especies 50
------------------	-------------------	--------------------

### SISÍRIDOS

Tienen antenas delgadas y alas reticuladas. Los adultos no vuelan muy lejos del agua y son activos durante o después del ocaso.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos de uno en uno o en pequeños grupos, sobre extraplomos, y las larvas caen al agua al eclosionar. Éstas tienen unas mandíbulas muy alargadas, aptas para sorber a las esponjas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Cerca de una extensión de agua con esponjas de agua dulce.




• alas grandes y reticuladas

• antenas largas y oscuras

**LAS LARVAS** tienen 3 pares de patas y branquias abdominales.

*SISYRA FUSCATA* está muy difundida por Europa. Los adultos comen pulgones y son atraídos por la luz tras el ocaso.

Envergadura 0,6–1,2 cm      Alimentación de la larva 

## ESCARABAJOS

**E**L ORDEN DE LOS COLEÓPTEROS contiene 166 familias y 370.000 especies conocidas. Aproximadamente uno de cada tres insectos que se conocen hoy es un escarabajo, y estos insectos han colonizado con éxito todos los tipos de hábitats terrestres y dulceacuícolas. Su tamaño varía desde apenas 1 mm hasta los 18 cm que miden los gigantes tropicales.

Aunque los escarabajos varían en forma corporal y coloración, se distinguen sus alas anteriores endurecidas: los élitros. Protegen las alas posteriores membranosas y de mayor tamaño, que quedan plegadas bajo las primeras. Los élitros pue-

den ser cortos, pero en todas las especies se tocan en el centro del cuerpo. Tener élitros protectores y el cuerpo fuerte es lo que ha contribuido al gran éxito de los escarabajos, permitiéndoles introducirse en todo tipo de espacios y sobrevivir en muchos hábitats. En las especies acuáticas, el espacio entre los élitros es una zona vital para la acumulación del aire.


Durante el apareamiento, el macho suele montar sobre el dorso de la hembra. La mayoría de especies de escarabajos son herbívoras, pero hay muchas detritívoras, carroñeras y depredadoras, así como unas pocas formas especializadas y parásitas. La metamorfosis es completa.

Orden COLEOPTERA	Familia ANOBIIDAE	N.º de especies 1.500
------------------	-------------------	-----------------------

### ANÓBIDOS

Las larvas de algunos anóbidos atacan la madera; por eso se llaman carcomas. Varían del pardo pálido al negro y son de alargados a ovalados. El pronoto suele cubrir una parte de la cabeza y las cortas patas encajan en surcos en la base del cuerpo. Las antenas tienen los tres últimos artejos alargados o dilatados.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en una fuente de alimento, y las larvas excavan en su interior, creando túneles circulares. Pupan justo debajo de la superficie.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En bosques, almacenes y otros edificios.
- **OBSERVACIÓN** Incluyen la Carcoma de los muebles (*Anobium punctatum*).




• antenas ramificadas en los machos


• patas cortas

forma alargada

*XESTOBIUM RUFOVILLOSUM* se llama Escarabajo del reloj de la muerte porque sus reclamos de apareamiento (golpecitos) se oían con frecuencia en los velatorios de antaño.



*PTILINUS PECTINICORNIS* es común en Europa central. Puede ser una plaga al atacar los muebles de madera.




• las antenas tienen 8-11 artejos

• dibujos distintivos en los élitros

*PTINOMORPHUS IMPERIALIS* es común en Europa central. Se halla en las flores del espino blanco durante la primavera.

**LAS LARVAS** tienen levaduras simbióticas que descomponen la celulosa en azúcares.

Longitud 2–9 mm; la mayoría 2–6 mm      Alimentación de la larva 



Orden COLEOPTERA	Familia ANTHRIDAE	N.º de especies 3.000
------------------	-------------------	-----------------------

### "GORGOJOS" DE LOS HONGOS

Muchos son oblongos. Son y están densamente cubiertos con dibujos blancos o con escamas o pelos oscuros. Las antenas suelen tener 11 artejos.

- **CICLO VITAL** La puesta y el desarrollo de las larvas tienen lugar dentro de madera descompuesta, hongos o tejido vegetal. Los adultos comen hongos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el trópico. Sobre ramitas, bajo la corteza y dentro de hongos, madera y semillas.

*MECOCERUS GAZELLA* se encuentra en el sudeste Asiático. Tiene unas antenas excepcionalmente largas.

antenas muy largas, con 11 artejos

LAS LARVAS son encorvadas, con cortas patas bisegmentadas.

rostró ancho

Longitud 0,05–3,8 cm; la mayoría menos de 2 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia BOSTRICHIDAE	N.º de especies 700
------------------	----------------------	---------------------

### BOSTRÍQUIDOS

Estos escarabajos cilíndricos suelen ser negros o pardo oscuro. La cabeza mira hacia abajo.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos bajo la madera, donde abren túneles los adultos y las larvas. Su sistema digestivo contiene microorganismos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en los trópicos y subtropicales. En plantas huésped.

LAS LARVAS son pálidas y con pelos cortos.

*BOSTRICHUS CAPUCINUS* está muy difundido en Europa.

cuerpo cilíndrico, con los lados paralelos

Longitud 0,3–5 cm; la mayoría 0,6–2 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia BRENTIDAE	N.º de especies 2.500
------------------	-------------------	-----------------------

### "GORGOJOS" PRIMITIVOS

Son alargados y de lados paralelos y suelen ser negros, pardos o amarillos. La cabeza, larga y estrecha, tiene un rostro distintivo y unas antenas en forma de sarta de cuentas, con 11 artejos.

- **CICLO VITAL** La hembra utiliza su rostro para hacer un agujero en la madera donde pone sus huevos. Las larvas perforan túneles en de árboles muertos o en descomposición y pueden alimentarse de hongos. Los adultos comen hongos y savia.
- **DISTRIBUCIÓN** Zonas tropicales. En bosques.

Las especies de *BRENTUS* suelen ser lampiñas. Están muy relacionadas con los gorgojos (ver pág. 117).

mandíbulas

rostró alargado

ojos

las antenas salen de la cabeza

cuerpo alargado con los lados paralelos

LAS LARVAS son alargadas. Patas cortas y unisegmentadas.

Longitud 0,3–8,6 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia BUPRESTIDAE	N.º de especies 15.000
------------------	---------------------	------------------------

### BUPRÉSTIDOS

Son de color verde, rojo o azul brillante, con listas, franjas y puntos. Suelen ser bastante planos, ahusados hacia la parte posterior, con ojos grandes y antenas cortas.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en la madera. Las larvas labran túneles en árboles muertos. Los adultos comen flores.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en los trópicos. En bosques y selvas.
- **OBSERVACIÓN** Algunas especies tienen sensores de calor en la base de las patas medias, con los que detectan los bosques recién quemados (buenos lugares para la puesta). Muchas son plagas de la madera.

*CHRYSOCHROA CHINENSIS* es oriundo de la India. Como la mayoría de las especies tropicales, vuela durante las horas más calurosas del día.

la cabeza queda hundida en el pronoto

los élitros brillantes y metálicos se han usado en bordados y en joyería

cuerpo de lados paralelos, ahusado hacia la parte posterior

la superficie corporal peluda es característica de esta especie

*JULODIS KLUGII*, de Sudáfrica, tiene unos pelos distintivos en todo el cuerpo, aunque la mayoría de los bupréstidos son lisos y brillantes, con pequeñas depresiones o estrías.

LAS LARVAS son pálidas, con un protórax grande y expandido y un abdomen ahusado.

Longitud 0,2–6,5 cm; la mayoría menos de 3 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia CANTHARIDAE	N.º de especies 4.500
------------------	---------------------	-----------------------

### ESCARABAJOS CORACEROS

Suelen tener el cuerpo blando y alargado, con los lados paralelos. La cabeza tiene mandíbulas curvas y antenas filiformes. Aunque son depredadores, algunas especies también comen polen y néctar.

- **CICLO VITAL** Diseminan sus huevos en el suelo. La mayoría de las larvas cazan presas en el suelo, en la madera en descomposición y bajo la corteza.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre flores en setos vivos y prados.
- **OBSERVACIÓN** Deben su nombre a que el color rojo, amarillo y negro de muchas especies recuerda antiguos uniformes militares.

antenas delgadas

pronoto cuadrado

cuerpo alargado

LAS LARVAS tienen un aspecto muy aterciopelado, con el cuerpo plano y las patas bien desarrolladas.

*CANTHARIS LATERALIS* se halla sobre todo en prados muy húmedos y en otras zonas pantanosas.

Longitud 0,3–3 cm

Alimentación de la larva



Orden COLEOPTERA	Familia CARABIDAE	N.º de especies 29.000
------------------	-------------------	------------------------

## CARÁBIDOS

Alargados y algo planos, pueden ser apagados o brillantes; suelen ser pardos o negros, a menudo con un brillo metálico. La cabeza, el tórax y el abdomen tienden a estar bien diferenciados, y los élitros suelen tener estrías muy visibles. La mayoría son cazadores nocturnos.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el suelo, en la vegetación, en la madera en descomposición o en hongos. Aparte de cazar, las larvas comen carroña; unas pocas especies son parcialmente herbívoras.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En el suelo, bajo piedras y troncos caídos, entre detritos y hojarasca.

Algunas especies viven en el follaje de arbustos y árboles.

• **OBSERVACIÓN** Unas pocas especies disuaden a los depredadores con chorros de sustancias calientes y cáusticas que expulsan por el extremo del abdomen.



mandíbulas enormes, cercenantes y en forma de hoz

pintas amarillas en las expansiones del pronoto

*ANTHIA THORACICA* es un depredador que vive en el suelo. Como es típico del género *Anthia*, pulveriza a sus agresores con sustancias químicas defensivas.



LAS LARVAS son alargadas y oscuras. Patas desarrolladas y fuertes mandíbulas.

élitros aplanados para desplazarse bajo los hongos y la corteza

contorno de cabeza y cuerpo parecido a un violín, y de ahí el nombre común

*MORMOLYCE PHYLLOIDES*, o Escarabajo violín, vive en los bosques del sudeste de Asia y se alimenta de larvas y de caracoles.



*MEGACEPHALA AUSTRALIS* tiene una coloración brillante y metálica. Caza después del ocaso, como todas las especies de *Megacephala*.

patas largas y delgadas para correr con rapidez

Longitud 0,2–8 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia CERAMBYCIDAE	N.º de especies 30.000
------------------	----------------------	------------------------

## CERAMBÍCIDOS

También llamados escarabajos longicornes, tienen el cuerpo alargado, con los lados paralelos y las antenas largas –hasta cuatro veces su longitud. Su coloración es muy variada.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos uno a uno sobre plantas y árboles. Las larvas suelen comer madera muerta o en descomposición, digiriéndola gracias a unos microorganismos.

Algunas comen árboles vivos, tallos o semillas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en los trópicos. En bosques y zonas arboladas.

• **OBSERVACIÓN** Muchas son plagas de los árboles frutales, madereros y ornamentales.



la cabeza tiene unas distintivas listas anaranjadas

superficie dibujada con pintas y franjas

◁ *STERNOTOMIS BOHEMANNI* tiene la típica forma de esta familia. Las hembras cortan la corteza con sus mandíbulas y ponen sus huevos debajo.



mandíbulas dentadas y fuertes

el tercer segmento del tarso tiene dos lóbulos

ojos mellados en el punto de unión de las antenas

el pronoto tiene un margen espinoso

mandíbulas dirigidas hacia abajo

LAS LARVAS tienen una forma cilíndrica y pueden tardar meses o incluso años en desarrollarse.

*PHOSPHORUS JANSONI* se halla en África. Pone sus huevos en árboles y sus larvas atacan algunos de importancia económica, como el árbol de cola.

cuerpo de lados paralelos

*XIXUTHRUS HEROS* son territoriales y luchan por el control de emplazamientos adecuados para la puesta.

Longitud 0,3–15 cm; la mayoría menos de 4,5 cm

Alimentación de la larva




Orden COLEOPTERA	Familia CETONIIDAE	N.º de especies 3.500
------------------	--------------------	-----------------------


## CETONIAS

Muchos de estos escarabajos robustos, cuadrangulares y algo aplanados son de colores vivos y con un brillo metálico. La cabeza puede tener proyecciones de varias longitudes, más desarrolladas en los machos.


- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en materia vegetal descompuesta, carroña seca y el suelo. Las larvas comen materia vegetal en putrefacción, estiércol y madera; los adultos, savia polen y frutos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el trópico y el subtropico. En hábitats con mucha vegetación.




**LAS LARVAS** pueden avanzar culebreando sobre el dorso cuando quedan expuestas.




▷ **DICRONORHINA DERBYANA** puede ser menos listado y con zonas verdes más extensas que el que aquí se muestra.




▷ **IUMNOS RUCKERI** proviene del norte de la India y de Birmania. Su contorno cuadrangular, su lustre y su forma algo aplanada son propios de los cetónidos.



▷ **AGESTRATA LUZONICA** recibe este nombre porque sólo se encuentra en Luzón, en las Filipinas.



▷ **PACHNODA SINUATA** es una especie robusta de Sudáfrica. Presenta varias formas, con distintas combinaciones de amarillo y negro. Hay más especies de este género en África tropical.


**Longitud** 1-7 cm      **Alimentación de la larva** 

Orden COLEOPTERA	Familia CHRYSOMELIDAE	N.º de especies 35.000
------------------	-----------------------	------------------------


## CRISOMÉLIDOS

Pueden ser desde cilíndricos y alargados hasta de dorso redondeado. Muchas especies presentan colores vivos o un brillo metálico. Las antenas miden menos de la mitad de la longitud del cuerpo, que es liso y lampiño.


- **CICLO VITAL** Ponen grupos de huevos en las plantas huésped o en el suelo. Las larvas se alimentan sobre tallos, hojas y raíces. Suelen pupar en el suelo.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Muy difundidos sobre las plantas en todos los hábitats terrestres.
- **OBSERVACIÓN** El Escarabajo de la patata (*Leptinotarsa decemlineata*), con rayas brillantes, come patatas, tomates y berenjenas.




**LAS LARVAS** son alargadas y algo curvas, con patas desarrolladas.



▷ Las especies del género **EUMOLPUS** se hallan en partes de Sudamérica tropical y muestran el aspecto típico de esta familia.




▷ **CALISPIDEA REGALIS** es nativo de Brasil. Es muy redondeado y tiene un dibujo rojo reticular en expansiones laterales planas en los élitros.



▷ Las especies del género **SAGRA** tienen patas posteriores robustas y fuertes para los combates entre machos o defenderse. Las larvas viven dentro de tallos de plantas.



▷ **LEPTINOTARSA DECEMLINEATA**, el Escarabajo de la patata, se halla en Asia, Norteamérica y Europa. Es una plaga de varios cultivos y no sólo de las patatas.

**Longitud** 0,1-3 cm      **Alimentación de la larva** 



Orden COLEOPTERA	Familia CLERIDAE	N.º de especies 3.500
------------------	------------------	-----------------------

## CLÉRIDOS

Suelen tener el cuerpo blando, alargado y algo aplanado, cubierto con largos pelos. Muchos tienen antenas en forma de maza. Suelen ser rojos, verdes, azules o rosados, y algunos tienen una coloración críptica, parda o negra.

• **CICLO VITAL** Las larvas suelen depredar las de otros escarabajos xilófagos; por ello, las puestas suelen hacerse en madera muerta. En algunas especies, comen larvas de abeja y de avispa, y huevos de saltamontes.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el trópico y en el subtropico. Sobre troncos de árbol, flores y hojas; en hongos y en la hojarasca; en túneles de escarabajos xilófagos y en nidos de insectos sociales como abejas y termites.



LAS LARVAS suelen tener proyecciones en la punta del abdomen.



**TRICHODES CRABRONIFORMIS** es oriundo de Europa central. Sus larvas se desarrollan en el nido de algunas abejas.

Longitud 0,2-5 cm	Alimentación de la larva
-------------------	--------------------------

Orden COLEOPTERA	Familia COCCINELLIDAE	N.º de especies 5.000
------------------	-----------------------	-----------------------

## MARIQUITAS

Son redondeadas, brillantes y lisas o bien peludas. Están vivamente coloreadas de negro, rojo, amarillo o anaranjado, a menudo con puntos o rayas.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos uno por uno o en pequeños grupos y los pegan a las plantas. Los adultos y larvas comen insectos de cuerpo blando. Las larvas son de color oscuro y las pupas pueden parecer excrementos de ave.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En hojas.

• **OBSERVACIÓN** Sirven para el control de insectos y ácaros plaga.



LAS LARVAS son espinosas o verrugosas.

**COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA**, la Mariquita de siete puntos, es común en Europa. Como defensa, rezuma líquido por las articulaciones de sus patas.



Δ **ANATIS OCELLATA**, la Mariquita ocelada, se encuentra en los árboles y se reconoce por sus pintas negras en el centro de unas manchas pálidas.

Longitud 0,1-1,5 cm	Alimentación de la larva
---------------------	--------------------------

Orden COLEOPTERA	Familia CURCULIONIDAE	N.º de especies 48.000
------------------	-----------------------	------------------------

## GORGOS

La mayoría de las especies tiene la cabeza prolongada en un pico o rostro que lleva las mandíbulas en su extremo. Muchas tienen una coloración críptica o de camuflaje, otras tienen escamas metálicas de vivos colores.


• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos dentro de tejidos vegetales. Muchas usan su rostro para hacer agujeros en los que los depositan.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre la mayoría de plantas terrestres y acuáticas.

• **OBSERVACIÓN** Muchos gorgos son plagas de cultivos como el algodón y el arroz, así como de las cortezas. Los gorgos forman la mayor familia del reino animal.

élitos con los vértices anteriores cuadrangulares

▷ **BRACHYCERUS FASCICULARIS** es peluda y de extraño aspecto. Vive en América del Sur. Sus larvas comen lirios.



Las especies del género **PACHYRHYNCHUS** tienen unos distintivos dibujos a base de puntos. Endémicas de Filipinas.

Longitud 0,1-9 cm	Alimentación de la larva
-------------------	--------------------------



Δ Las especies del género **CYRTOSTRACHELUS** son del sudeste asiático. Los machos exhiben sus tibiae frontales largas y peludas durante el cortejo.



▷ **LAMPROCYPHUS AUGUSTUS** es una especie sudamericana. Su coloración verde la oculta de los depredadores porque la confunde con el follaje.



Orden COLEOPTERA

Familia DERMESTIDAE

N.º de especies 950

## DERMESTÍDOS

Son redondeados o algo alargados. Son de coloración apagada, parda o negra, con dibujos de pelos o escamas de colores. La cabeza puede ser difícil de ver desde arriba, pues suele quedar oculta por el pronoto.

- **CICLO VITAL** Suelen poner los huevos sobre una fuente de alimento. Las larvas, peludas y detritívoras, ingieren muchos tipos de materia orgánica.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En diversos hábitats.
- **OBSERVACIÓN** Muchas especies son graves plagas de alimentos almacenados como carne seca y especias, y de tejidos.



LAS LARVAS son muy peludas. "Osos lanudos" en algunos idiomas.



Δ **ANTHRENUM MUSEORUM**, o Escarabajo de los museos; sus larvas pueden infestar las colecciones de insectos o de plantas.

**DERMESTES LARDARIUS**, o Escarabajo del tocino, infesta los alimentos. Tiene pelos blancos y manchas en los élitros.

dibujo moteado con escamas de distintos colores

cabeza oculta por el pronoto vista desde arriba

Longitud 0,2–1,2 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA

Familia DYTISCIDAE

N.º de especies 3.500

## DITÍSCIDOS

Son ovalados e hidrodinámicos, con el cuerpo liso y brillante. La mayoría son negros o pardo oscuro pero algunos tienen marcas amarillas, pardas o verdes. Las patas posteriores son planas y están orladas con pelos para la propulsión. Pueden llevar reservas de aire bajo sus élitros.

- **CICLO VITAL** Las hembras practican hendeduras en las plantas acuáticas y ponen los huevos. La pupación tiene lugar cerca del agua. Como sus padres, las larvas atacan desde insectos hasta ranas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Arroyos, lagos poco profundos, lagunas salobres y fuentes termales.



LAS LARVAS tienen patas bien desarrolladas y mandíbulas grandes y curvas.



patas posteriores peludas, adaptadas para la propulsión

cuerpo, liso, brillante y ovalado, pardo o negro

pronoto con borde amarillo

patas amarillas

ventosas distintivas de los machos

**DYTISCUS MARGINALIS** se halla en Europa y en Asia. El macho tiene unas ventosas en sus patas anteriores, con las que se adhiere a la hembra en el apareamiento. Las hembras tienen muchos más surcos en sus élitros.

Longitud 0,2–4 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA

Familia ELATERIDAE

N.º de especies 9.000

## ELATÉRIDOS

También llamados escarabajos de resorte o de muelle, son alargados y de colores apagados. Pueden propulsarse en el aire, produciendo un sonoro "clic" que asusta a los depredadores.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el suelo. Las larvas tardan años en madurar.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En plantas y madera descompuesta.



LAS LARVAS son delgadas y tienen forma cilíndrica.



los ángulos posteriores del pronoto forman una punta aguda

listas de colores advertidores

contorno del abdomen ovalado

élitros puntiagudos en los extremos

Las especies del género **ALAUS** se encuentran en el hemisferio norte. Algunas tienen ocelos distintivos en el pronoto.

alargado, con lados paralelos

**SEMIOTUS ANGULATUS** tiene marcas anaranjadas en el tórax, que continúan por los élitros.

Longitud 0,2–7 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA

Familia EROTYLIDAE

N.º de especies 2.500

## ESCARABAJOS GIGANTES DE LOS HONGOS

Con una atractiva coloración, suelen ser lisos, alargados u ovalados. Los élitros son verde o azul oscuros; la cabeza, el pronoto y las patas son pardo-rojizos.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en los carpóforos de hongos o en madera en descomposición. Las larvas se alimentan en la superficie o excavan túneles.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En selvas y bosques: bajo la corteza de los árboles, en puntos que rezuman savia y en o sobre hongos y madera en descomposición.



LAS LARVAS son alargadas; a veces, colores brillantes.



líneas brillantes en los élitros

Las especies de **ZONARIUS** tienen los élitros rayados típicos de algunos miembros tropicales.

Las especies de **SCAPHIDOMORPHUS**, de Sudamérica, pueden defenderse segregando fluidos tóxicos en el ano y las patas.

los últimos tres segmentos forman una delgada maza

superficie lisa

esta especie tiene marcas anaranjadas

Longitud 0,3–2,5 cm

Alimentación de la larva



Orden COLEOPTERA

Familia GEOTRUPIDAE

N.º de especies 600

## GEOTRÚPIDOS

Son robustos, ovalados y redondeados, de color pardo o negro, brillantes y con un lustre azul o púrpura metálicos. Los duros élitros tienen estrías o surcos longitudinales, y las tibias anteriores fuertes "dientes" adaptados para cavar.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el suelo y en las heces. Los adultos excavan madrigueras e introducen boñigas para alimentar a sus larvas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En excrementos, carroña, madera en descomposición u hongos.



**TYPHOEUS TYPHOEUS** se llama Escarabajo minotauro porque el macho tiene cuernos. Las hembras excavan madrigueras e introducen excrementos de conejo.

▷ **CERATOPHYUS HOFFMANNSEGGI** se halla en España, Portugal y norte de África. Entierra las boñigas de herbívoros.

Longitud 0,4–4 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA

Familia GYRINIDAE

N.º de especies 750

## GIRÍNIDOS

Estos escarabajos ovalados, llamados también escribanos de agua, son negros, a menudo con un brillo bronceado o azul acero. Utilizan las patas anteriores para atrapar presas, mientras que las posteriores y las medias son cortas y en forma de remos. Pueden concentrarse en gran número sobre la superficie del agua, donde utilizan sus antenas para localizar presas.

- **CICLO VITAL** Ponen huevos en el envés de las hojas. Pupan en un capullo adherido a las plantas sumergidas o en una celdilla de barro.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En la superficie de arroyos de curso lento.



**LAS LARVAS** tienen mandíbulas chupadoras, y branquias plumosas.

Las especies del género **ENHYDRUS** viven en Sudamérica. Emiten un olor afrutado que disuade a los depredadores.



Longitud 0,3–2,5 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA

Familia HISTERIDAE

N.º de especies 3.000

## HISTÉRIDOS

Son redondeados u ovalados. Muchas especies tienen un perfil convexo, aunque algunas tienen un cuerpo plano para vivir bajo la corteza. La mayoría son negros y tienen varias estriaciones y pequeñas depresiones en la superficie de los élitros.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en carroña, boñigas y materia vegetal en descomposición. Las larvas (y los adultos) comen otros insectos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En excrementos, carroña u hojarasca; en túneles de insectos xilófagos; en nidos de aves u hormigueros.



VISTA LATERAL

**CARCINOPS PUCILO** es negro y muy brillante; cría en materia animal o vegetal en descomposición, y en excrementos de murciélagos.

DESDE ARRIBA

Δ Las especies de **HOLOLEPTA** son muy aplanadas, con una superficie corporal muy dura. Dan caza a sus presas bajo la corteza de varios árboles.

Longitud 0,1–2,5 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA

Familia HYDROPHILIDAE

N.º de especies 2.000

## HIDROFÍLIDOS

Son ovalados y de color negro, pardo o a veces amarillo. Sus antenas terminan en una maza de cuatro artejos. Los últimos tres son peludos, mientras que el primero es liso y en forma de platillo. Muchos adultos viven en el agua, llevando aire bajo sus élitros.

- **CICLO VITAL** La puesta se realiza en el agua, o en boñigas, en lugares muy húmedos. Los adultos son carroñeros. Las larvas se alimentan de larvas de insectos acuáticos, caracoles y gusanos; pueden tener branquias o respirar en la superficie.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En hábitats acuáticos o muy húmedos; algunos en excrementos, vegetación descompuesta y el suelo.



**LAS LARVAS** tienen el dorso verrugoso o peludo.

**HYDROPHILUS PICEUS**, el gran escarabajo acuático plateado, utiliza sus antenas de forma especial para conducir el aire hacia atrás, bajo las alas.



Longitud 0,1–4,5 cm

Alimentación de la larva




Orden COLEOPTERA	Familia LAMPYRIDAE	N.º de especies 2.000
------------------	--------------------	-----------------------

## LUCIÉRNAGAS

Son aplanadas, alargadas o algo ovaladas. Son de colores apagados pero pueden tener marcas rojas o amarillas. Los machos suelen tener alas bien desarrolladas; las hembras pueden ser ápteras. En ese caso, son muy similares a las larvas. Algunos adultos se comunican con sus parejas con destellos de luz que producen unos órganos luminosos de la base del abdomen.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en la vegetación. Las larvas se alimentan de invertebrados y caracoles.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre la vegetación en terrenos arbolados y herbazales húmedos.
- **OBSERVACIÓN** Las hembras de algunas especies imitan los destellos de especies muy relacionadas, atrayendo a los machos con sus señales sexuales para devorarlos.

**LAS LARVAS** son alargadas y ahusadas. La cabeza es pequeña, más larga que ancha.



**LAMPROSELA SELAS** tiene unas antenas distintivas y una coloración rojo anaranjada y pardonegruzca, que avisa a los depredadores de su mal sabor.

Longitud 0,5–3 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia LATHRIDIIDAE	N.º de especies 500
------------------	----------------------	---------------------

## LATRÍDIDOS

Estos diminutos insectos ovalados que también se llaman escarabajos del moho tienen una coloración parda o negra y un pronoto pequeño y redondeado. Los élitros tienen hileras de marcas perforadas en forma de puntos, y pueden ser peludos o estar cubiertos de cerdas.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en materia en descomposición y hongos. Las larvas comen esporas de hongos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en zonas templadas. Bajo piedras y corteza; en hongos, materia en descomposición y nidos.

**LAS LARVAS** son pálidas, ovaladas o alargadas, y algo aplanadas. Son peludas por encima.



**ENICMUS TRANSVERSUS** tiene una coloración parda o negra, el cuerpo muy aplanado y unos surcos en los élitros.



**ARIDIUS BIFASCIATUS** come hongos. Es oriundo de Australia. Los élitros tienen unos surcos toscos y unas marcas oscuras distintivas.



**CORTICARIA IMPRESSA** es un escarabajo pardo oscuro. Come hongos. Tiene los élitros más claros que la cabeza y el tórax.

Longitud 1–3 mm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia LUCANIDAE	N.º de especies 1.300
------------------	-------------------	-----------------------


## CIERVOS VOLANTES

Son grandes, lisos y negros o pardorrojizos. Los machos son mayores que las hembras, con unas mandíbulas muy agrandadas que pueden poseer dientes prominentes. Se utilizan para combatir por las hembras y encajan en torno al pronoto del macho rival. Los adultos son nocturnos y no se alimentan o consumen savia vegetal, néctar o jugos de frutos.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en tocones, raíces o leños en descomposición. Las larvas pueden tardar varios años en madurar. Pupan en una célula formada por fibras leñosas trituradas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En bosques de planifolias.



**LAS LARVAS** tienen forma de C y fuertes patas torácicas.



Los machos de **CHIASOGNATHUS GRANTI** tienen mandíbulas muy alargadas que usan para combatir con muchos rivales.



**PHALACROGNATHUS MULLERI** tiene una distintiva coloración metálica y se encuentra en las selvas pluviales del norte de Australia.

Longitud 0,5–8 cm; la mayoría 1,5–4,5 cm

Alimentación de la larva




Orden COLEOPTERA	Familia LYCIDAE	N.º de especies 3.500
------------------	-----------------	-----------------------

## LÍCIDOS

Son negros y rojos o amarillos, con élitros reticulados. Algunas hembras adultas de la selva pluvial parecen larvas de gran tamaño.

- **CICLO VITAL** Suelen poner sus huevos en o sobre el lugar donde se alimentan las larvas; éstas chupan líquidos de la materia en descomposición o comen pequeños artrópodos. Poco se sabe sobre el ciclo vital y sobre lo que comen. Es probable que los adultos no se alimenten mucho; algunos ingieren néctar y polen.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo en Nueva Zelanda; en las regiones más cálidas. En zonas boscosas y con abundante vegetación.



Las especies del género *LYCUS* son planas, con unas marcas rojas y negras que disuaden a los depredadores. Machos y hembras pueden diferir por la forma de las marcas.


Longitud 0,3–3 cm Alimentación de la larva 🌿

Orden COLEOPTERA	Familia MELOIDAE	N.º de especies 3.000
------------------	------------------	-----------------------

## MELOIDOS

Producen cantaridina, que irrita la piel, como defensa. La mayoría son blandos, correosos y negros o pardos con marcas rojas o amarillas. Algunos son metálicos. Suelen ser alargados y de lados paralelos; unos pocos son ovalados. La longitud de los élitros varía mucho.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el suelo. En el primer estadio, la larva devora los huevos de saltamontes o abejas. Los adultos son herbívoros.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo en Nueva Zelanda; sobre todo en zonas cálidas y secas. Sobre flores y hojas.
- **OBSERVACIÓN** Algunos son plagas de los cultivos. La cantaridina de *Lyta vesicatoria* se usaba para trastornos genitourinarios.



Las larvas son más vermiformes con las sucesivas mudas.

Longitud 0,5–3 cm; la mayoría 1–2 cm Alimentación 🌿

Orden COLEOPTERA	Familia MORDELLIDAE	N.º de especies 1.500
------------------	---------------------	-----------------------

## MORDÉLIDOS

Se dan la vuelta cuando los molestan y suelen ser gibosos o arqueados vistos de perfil pero bastante planos vistos desde arriba. El extremo del abdomen tiene forma de espina. Son pardos o negros, con dibujos hechos de cortos pelos o escamas blancos, rojos o amarillentos.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos uno a uno dentro de la madera muerta o de las plantas. Las larvas se desarrollan sobre todo en la madera en descomposición o son minadoras de tallos. Los adultos se nutren de néctar.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en el trópico. Los adultos se agrupan al sol sobre flores y madera muerta.




Longitud 0,2–1,5 cm Alimentación de la larva 🌿

Orden COLEOPTERA	Familia NITIDULIDAE	N.º de especies 3.000
------------------	---------------------	-----------------------

## NITIDÚLIDOS

Suelen ser ovalados, cuadrados o rectangulares y tener un perfil convexo. Son pardos o negros y pueden tener pintas irregulares rojas o amarillas. Algunos tienen los élitros cortos y exponen los dos segmentos abdominales.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos cerca del alimento. Comen savia, néctar y polen; unos pocos depredan cochinillas; algunas larvas crecen en vainas de semillas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En flores, en rezumos de savia y en materias en descomposición; unos pocos viven en colonias de hormigas o de abejas.



Longitud 0,1–1,5 cm Alimentación de la larva 🌿



Orden COLEOPTERA	Familia PASSALIDAE	N.º de especies 500
------------------	--------------------	---------------------

## PASÁLIDOS

Son de color negro brillante o marrón oscuro brillante, con un cuerpo aplanado de lados paralelos. Élitros con estriaciones bien visibles. Muchas especies vuelan tan sólo en raras ocasiones.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en madera muerta. Los adultos y las larvas viven juntos en leños y tocones. Digieren la celulosa con los hongos del sistema digestivo.
- **DISTRIBUCIÓN** Sobre todo en el trópico; en bosques de Sudamérica y del sudeste asiático. Algunos, en nidos de hormigas comedoras de hojas.
- **OBSERVACIÓN** Los adultos hacen ruido frotando las alas posteriores contra el abdomen, para manifestar agresión, aparearse y comunicarse con las larvas.



*AULACOCYCLUS PARRYI* tiene un cuerpo aplanado para excavar debajo de los detritos y la corteza.



**LAS LARVAS** producen sonido frotando las patas posteriores contra las crestas de las patas intermedias.



Las especies del género *AULACOCYCLUS* abundan en el sudeste asiático. Se parecen mucho y es difícil identificarlas de un modo correcto.



*ACERAUIS RECTIDENS* tiene antenas con 10 artejos y una corta protuberancia en la cabeza.

Longitud 1–8,5 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia PSELAPHIDAE	N.º de especies 9,000
------------------	---------------------	-----------------------

## PSELÁFIDOS

El abdomen de estos escarabajos pequeños y pardos es bastante más ancho que el pronoto y la cabeza. Los élitros son cortos, lo que deja la mayor parte del abdomen expuesto.

- **CICLO VITAL** Se tienen pocos datos. Los adultos y, presumiblemente, las larvas, comen ácaros, pequeños insectos y otros invertebrados.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Bajo la corteza, en la vegetación y la madera en descomposición, en el musgo, la hojarasca, las cuevas y el suelo.

▷ *RYBAXIS LONGICORNIS* es europeo y vive en el musgo cerca de estanques.



Longitud 0,5–6 mm; la mayoría menos de 3 mm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia PYROCHROIDAE	N.º de especies 150
------------------	----------------------	---------------------

## PIROCROIDOS

La mayoría de las especies, conocidas como escarabajos de colores de fuego debido a su distintiva coloración negra, roja y amarilla, son estrechas y de cuerpo blando. Los ojos son grandes con respecto a la cabeza, y los artejos de las antenas son serrados o tienen largos procesos.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos bajo la corteza muerta, donde las larvas comen filamentos de hongos o pequeños animales.
- **DISTRIBUCIÓN** En el hemisferio norte y en el sudeste de Asia. En bosques.



**LAS LARVAS** son planas con unos distintivos segmentos al final.

Las especies de *PYROCHROA*, o escarabajos cardenales, viven en flores y troncos o tocones de árboles. Suelen ser planas.

Longitud 0,6–1,8 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia RHIPIDORHINAE	N.º de especies 450
------------------	-----------------------	---------------------

## ESCARABAJOS CUNEIFORMES

Tienen el dorso arqueado y coloración anaranjada y negra y deben su nombre a su forma de cuña. Las alas pueden ser cortas o tener la longitud completa.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en los nidos de los huéspedes y las larvas son parásitas de las cucarachas o de las larvas de escarabajos, abejas y avispas xilófagas. Las larvas parecen larvas de mosca.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats donde haya insectos huéspedes.



**LAS LARVAS** de los primeros estadios pueden tener patas.



*METOECUS PARADOXUS* es la única especie británica de esta familia. Sus larvas son parásitas de las avispas del género *Vespula*.

Longitud 0,4–3,6 cm

Alimentación de la larva



Orden COLEOPTERA

Familia SCARABAEIDAE

N.º de especies 16.500

## ESCARABEIDOS

La enorme familia Scarabaeidae comprende varias grandes subfamilias: los escarabajos peloteros, los héroes gigantes y los sanjuaneros y afines. Muy variados en forma y tamaño, su coloración varía del negro a los verdes y azules metálicos. Antenas terminadas en una especie de maza formada por varias placas móviles. Los machos suelen tener cuernos para combatir por las hembras.

• **CICLO VITAL** La puesta se realiza en el suelo, en heces de animales y en madera y materia en descomposición. Algunas especies acarrear las pelotas de estiércol fresco con las patas posteriores antes de enterrarlas y poner los huevos en su interior. Otras entierran estiércol en el mismo lugar.


• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre estiércol, carroña, hongos y vegetación; bajo la corteza; en madrigueras de vertebrados o en hormigueros.

• **OBSERVACIÓN** El Escarabajo pelotero fue un símbolo religioso en el antiguo Egipto. La momificación pudo imitar su estadio pupal.

▷ **PLUSIOTIS RESPLENDENS** se encuentra en América Central. Las especies de colores brillantes van muy buscadas por los coleccionistas sin escrúpulos.

▽ **MELOLONTHA MELOLONTHA**, el Escarabajo melolontha es nocturno. Está emparentado con el Escarabajo solsticial (*Amphimallon solstitialis*).

maza antenal hecha de placas móviles



alas posteriores membranosas y plegables



coloración metálica, lustrosa y verde brillante

△ **PHANEUS DEMON** es una especie de América Central cuyas larvas se desarrollan en el estiércol de herbívoros.

coloración dorada y lustrosa



garras potentes

fémures posteriores robustos



brillo metálico púrpura rojizo

△ **KHEPER AEGYPTIORUM**, de África, forma pelotas de excrementos de hasta 5 cm de diámetro y las entierra lejos de la bosta. Fue el primero que se veneró en Egipto.



△ **COPROPHANEUS LANCIFER** es nativo de América del Sur. Esta especie entierra trozos de animales muertos, donde cría a sus larvas.

parte frontal de la cabeza muy dentada

parte frontal de las tibiae lustrosa y muy dentada



negro mate

garra tibial

tarsos

△ **SCARABAEUS CATERATUS**, que vive en el este de África, es atraído por el estiércol de grandes herbívoros como búfalos y jirafas. Las hembras permanecen en el nido para cuidar de los jóvenes cuando emergen de las pelotas de excremento.



LAS LARVAS son blancas, y en forma de C, con mandíbulas bien desarrolladas.

gran cuerno en la cabeza

cuernos torácicos laterales

cuerno torácico frontal



tarsos alargados y resistentes protegen las alas posteriores

unos élitros duros y resistentes protegen las alas posteriores

garras tarsales alargadas

△ **CHALCOSOMA ATLAS** es una de las tres especies conocidas del este de Asia. Los machos utilizan sus cuernos para agarrarse unos a otros en sus combates por las hembras.

Longitud 0,2-17 cm

Alimentación de la larva



Orden COLEOPTERA	Familia SILPHIDAE	N.º de especies 250
------------------	-------------------	---------------------

## ESCARABAJOS ENTERRADORES

Suelen ser planos y de cuerpo blando, negros con marcas de color amarillo, rojo o anaranjado brillante. En algunos, los élitros son cortos y dejan al descubierto varios segmentos abdominales.

• **CICLO VITAL** Comen materias en descomposición. Las especies del género *Nicrophorus* (escarabajos enterradores) entierran cadáveres de pequeños animales y ponen sus huevos en ellos. En otras, los adultos regurgitan carroña para sus larvas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, pero principalmente en el hemisferio norte. En el suelo, cerca de carroña, estiércol y hongos podridos.



**LAS LARVAS** son planas y alargadas, con el pronoto ancho y la cabeza pequeña.



*SILPHA AMERICANA* es nativo de Norteamérica. Es ancho y tiene una coloración bastante brillante. Es atraído hacia la carroña por el olor.

Longitud 0,4 – 4,5 cm; la mayoría menos de 2 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia STAPHYLINIDAE	N.º de especies 29.000
------------------	-----------------------	------------------------

## ESTAFILÍNIDOS

Son pequeños y blandos, con el cuerpo alargado, de lados paralelos y de color pardo o negro. Algunos tienen el cuerpo esculpido, colores brillantes o pelos. Todos con élitros cortos y un abdomen expuesto muy móvil. Las especies pequeñas son diurnas y las más grandes, nocturnas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el suelo, dentro de hongos y en la hojarasca. Las larvas depredan insectos y otros artrópodos y suelen vivir con los adultos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En el suelo, en hongos, hojarasca, y carroña. En colonias de hormigas o de termitas, o en el pelaje de mamíferos.

• **OBSERVACIÓN** El género *Paederus* puede producir ampollas en la piel.



*STAPHYLINUS OLENS*, el Asnillo o Estafilino oloroso, es una especie europea, negra y de gran tamaño. Si se lo molesta o amenaza, curva su abdomen en una postura de amenaza como el escorpión.

capa de pelos negros y amarillos

mandíbulas alargadas

el abdomen mete las alas posteriores bajo los élitros cuando no las usa

alas posteriores plegadas bajo los élitros

LAS LARVAS son alargadas, con cortas antenas y cercos.

EMUS HIRTUS es una especie grande, nativa del sur de Europa. Caza presas que se alimentan de cadáveres o estiércol.

Longitud 0,1–4 cm; la mayoría menos de 2 cm

Alimentación de la larva

Orden COLEOPTERA	Familia TENEBRIONIDAE	N.º de especies 17.000
------------------	-----------------------	------------------------

## TENEBRIÓNIDOS

Son negros o pardos. Algunas especies, sin embargo, tienen marcas de color o élitros blancos. Hay una gran variación en cuanto a forma dentro de esta familia, desde lados paralelos y extremos romos hasta grandes y ampliamente ovalados. El cuerpo puede ser liso y brillante o apagado y de textura áspera.

• **CICLO VITAL** Los huevos se esparcen solos o en grupos en o en torno a la materia alimentaria de la larva. Son detritívoros y la mayoría comen materia vegetal o animal en descomposición; algunas larvas comen raíces de plantas. Algunos adultos pueden producir una secreción maloliente defensiva en unas glándulas del abdomen.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En todos los hábitats terrestres, sobre todo en regiones áridas.

• **OBSERVACIÓN** Algunos pueden ser plagas. Los escarabajos de la harina dañan los alimentos secos y almacenados como harina, cereales y otros granos; otras especies dañan el café o setas.



**LAS LARVAS** son alargadas y cilíndricas, con el cuerpo correoso y las patas cortas.



las antenas suelen tener 11 artejos

los élitros blancos reflejan el calor del sol


patas largas para correr sobre la arena caliente

*ONYMACRIS CANDIDIPENNIS* tiene élitros sin pigmentación y largas patas que le permiten ser activo durante el día en el desierto del Namib.

Longitud 0,2–5 cm; la mayoría menos de 2 cm



△ *BLAPS MUCRONOTA* es una de seis especies europeas similares. Estos escarabajos no voladores viven en lugares oscuros.



△ *HELAEUS SUBERRATUS*, o Escarabajo bandeja de pastel, tiene aspecto de semilla. En Australia.



patas cortas y fuertes

coloración parda

*TENEBRIO MOLITOR*, o Escarabajo molinero, se halla en la harina y los granos almacenados.

Alimentación de la larva



## ESTREPSÍPTEROS

**H**AY 8 FAMILIAS y 560 especies en el orden de los estrepsípteros. Los machos tienen alas posteriores grandes y en forma de abanico y alas anteriores diminutas y en forma de tiras. Las posteriores retorcidas. Las hembras son vermiformes, ápteras y carentes de patas. Suelen vivir como endoparásitas, dentro del cuerpo de otros insectos. Los estrepsípteros utilizan especies de muchos órdenes distintos como huésped pero muestran preferencia por hemípteros, avispas y abejas.

Los machos detectan a las hembras por las feromonas que éstas emiten, luego, se pegan al cuerpo del huésped y se apare-

an con la hembra dentro de él. La metamorfosis es completa. Los huevos eclosionan dentro de la hembra. Centenares de larvas diminutas y de seis patas (triungulinos) emergen del huésped, en busca de su propio huésped. La larva utiliza un enzima para introducirse en él y muda hasta convertirse en un endoparásito sin patas que se alimenta del insecto parasitado. Pupa dentro del huésped. Los machos emergen y se alejan volando, matando al huésped al hacerlo, pero las hembras se quedan dentro.

Algunas especies de estrepsípteros son útiles agentes de control de insectos plagas como grillos y cicadélidos.

Orden STREPSIPTERA	Familia STYLOPIDAE	N.º de especies 260
--------------------	--------------------	---------------------


## ESTILOPIDOS

Los machos son pequeños y oscuros, con ojos saltones. Las alas anteriores son diminutas y en forma de tiras; las posteriores, grandes y en forma de abanico. Las hembras son ápteras y sin patas; viven en el huésped.

• **CICLO VITAL** Suelen parasitar las abejas minadoras, los halictidos, las avispas solitarias o los véspidos (ver págs. 178-93). Los huevos eclosionan dentro de la hembra. Luego, las larvas triungulinas salen por un pasaje de incubación especial y se arrastran hasta las flores para esperar un nuevo huésped.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En varios hábitats con abundante vegetación, donde haya huéspedes. Los machos llevan una vida libre y las hembras parasitan abejas y avispas.

• **OBSERVACIÓN** Los órganos sexuales de los huéspedes degeneran y puede darse una inversión de los caracteres sexuales secundarios (los machos parecen hembras y viceversa).

ABEJA  
HUÉSPEDHEMBRA EN EL ABDOMEN  
DE UNA ABEJA HUÉSPED

Las especies del género *STYLOPS* tienen una forma muy distintiva. Por su interesante biología, son utilizadas como emblema de una importante sociedad entomológica.

• las alas posteriores tienen un aspecto algo retorcido



LAS LARVAS son muy pequeñas y tienen un par de cerdas al final del abdomen para saltar.



MACHO

Longitud 0,5 - 4 mm

Alimentación de la larva

## "MOSCAS" ESCORPIÓN

**E**L ORDEN DE LOS MECÓPTEROS comprende 9 familias y 550 especies. El nombre común alude al abdomen similar al del escorpión que presentan los machos de algunas especies: delgado y vuelto hacia arriba, con unos abultados órganos genitales. Las moscas escorpión tienen el cuerpo alargado y la mayoría tienen dos pares de estrechas alas. La cabeza está típicamente alargada hacia abajo para formar un pico o rostro que lleva las mandíbulas.

Se alimentan de insectos muertos o moribundos y de carroña, néctar y otros fluidos. Se aparean de noche; a veces, los machos hacen regalos nupciales en

forma de un insecto muerto o de una masa de saliva. Las hembras rechazan a los machos que ofrecen regalos pequeños o de baja calidad, pero los machos pueden entonces aparearse por la fuerza, agarrándolos a la hembra con sus pinzas genitales. En los rituales de cortejo pueden intervenir también feromonas sexuales producidas por ambos sexos o sólo por los machos.

Las moscas escorpión ponen sus huevos en el suelo. La metamorfosis es completa y las larvas son parecidas a orugas, con propodios abdominales, o bien vermiformes. Pupan en una cápsula subterránea o en la vegetación.

Orden MECOPTERA	Familia BITTACIDAE	N.º de especies 150
-----------------	--------------------	---------------------

## BITÁCIDOS

Pueden ser muy parecidos a los dípteros tipúlidos (ver pág. 140). Alas delgadas, patas muy largas y tarsos posteriores modificados para cazar. El quinto segmento tarsal de la pata posterior es afilado, para agarrar bien las presas. Se cuelgan de la vegetación por sus patas anteriores y dejan sus largas patas posteriores sueltas hacia atrás para capturar las presas.

• **CICLO VITAL** En el cortejo, los machos pueden robarse los regalos nupciales. Las hembras ponen sus huevos en el suelo. Las larvas, como orugas, se enganchan detritos al cuerpo para camuflarse. Comen insectos muertos en el suelo y la hojarasca, de noche.

• **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio sur. Terrenos arbolados muy húmedos o zonas sombreadas con vegetación.



• dos espinas finas en el extremo de la tibia (aquí sólo se ve una)

• base del ala pedunculada

• alas delgadas y parduzcas

• "rodillas" negras

• abdomen largo y esbelto

• patas posteriores largas, de color rojo anaranjado

• el tarso se dobla en torno a la presa

• tarsos posteriores negros



LAS LARVAS parecen orugas, con tres pares de cortas patas torácicas, propodios abdominales cortos y verrugas provistas de pelos.

**HARPOBITTACUS AUSTRALIS** es una especie australiana con las alas parduzcas y las patas rojo anaranjadas y con franjas.

Longitud 1,5 - 4 cm

Alimentación de la larva



Orden MECOPTERA

Familia BOREIDAE

N.º de especies 30

## BOREIDOS

Llamados también pulgas de la nieve, son marrón oscuros o negros; no vuelan, pero dan saltos cortos con sus largas patas intermedias y posteriores.

Alas, atrofiadas, en forma de gancho en los machos y de escama en las hembras.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el musgo. Los adultos y larvas comen musgo y líquenes.

• **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte, en zonas montañosas y frías. Se los encuentra sobre la nieve, en el musgo y bajo las piedras.



**LAS LARVAS** son cilíndricas y parecen orugas, con patas torácicas bien desarrolladas.

cabeza distintiva, dirigida hacia abajo



**BOREUS BRUMALIS** se están apareando sobre la la nieve. Son las pulgas de la nieve más comunes en el noreste de EE UU.

Longitud 2-5 mm; la mayoría 3-5 mm

Alimentación de la larva

Orden MECOPTERA

Familia PANORPIDAE


N.º de especies 360

## PANÓRPIDOS, MOSCAS ESCORPIÓN COMUNES

Las alas tienen un dibujo pardo o negro. En las hembras, el abdomen es ahusado y acaba en punta. En los machos, el aparato genital está hinchado y vuelto hacia arriba.

• **CICLO VITAL** Los machos roban presas para darlas a la hembra en el apareamiento, que pone sus huevos en el suelo o en la hojarasca. Las larvas parecen orugas. Pupan en una cápsula subterránea. Los adultos comen insectos muertos, néctar y fruta.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el hemisferio norte. Entre la vegetación, en una amplia gama de hábitats sombreados.



◁ **PANORPA LUGUBRIS**, de gran tamaño, es común en partes de Norteamérica. Los machos son mayores que las hembras.



**LAS LARVAS** tienen tres pares de patas torácicas y ocho pares de propodios abdominales cortos.

Longitud 0,9-2,5 cm; la mayoría 1-1,5 cm

Alimentación de la larva

## PULGAS

**E**L ORDEN DE LOS SIFONÁPTEROS se divide en 18 familias y 2.000 especies. Son pardos, brillantes y ápteros con un cuerpo correoso, aplanado y cubierto de espinas y cerdas dirigidas hacia atrás. Engrosadas patas posteriores con un mecanismo saltador que implica la acumulación de energía en unas almohadillas hechas de una proteína similar al caucho. Piezas bucales para

chupar sangre. Son ectoparásitos, viven en el exterior del animal huésped y se alimentan de él sin matarlo.

Menos específicas del huésped que los piojos (ver págs. 83-84), algunas pulgas parasitan más de 30 huéspedes, mamíferos terrestres o aves. La metamorfosis es completa. Las larvas no chupan sangre sino detritos, sangre seca y excrementos de pulgas adultas.

Orden SIPHONAPTERA

Familia HYSTRICHOPSYLLIDAE

N.º de especies 80

## PULGAS DE LOS ROEDORES

Las especies de esta familia tienen un peine de cerdas robustas y oscuras en el borde posterior del pronoto. Son ectoparásitos de ratones y ratas de bosque.

• **CICLO VITAL** Ponen sus pegajosos huevos en la madriguera, guarida o nido del huésped. Hay tres estadios larvales y la pupación tiene lugar en un capullo de seda.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el hemisferio norte. En nidos de huéspedes.

• **OBSERVACIÓN** *Ceratophyllus gallinae*, la Pulga europea de las gallinas es una plaga.



**LAS LARVAS** son finas pálidas, relativamente lampiñas y sin patas.



Las especies del género *EPITEDIA* sólo se hallan en Norteamérica. Parasitan ratas, ratones y musarañas.

Longitud 1-4 mm

Alimentación de larva

Orden SIPHONAPTERA

Familia PULICIDAE

N.º de especies 200

## PULGAS COMUNES

Tienen el aspecto típico del orden y pueden tener peines de cerdas en el pronoto o en las mejillas. Son ectoparásitos del hombre y de muchos mamíferos, como perros, gatos y conejos.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el nido o en la madriguera del huésped. Los adultos sobreviven mucho tiempo sin comer sangre. Las pupas capullo hasta hallar un huésped.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre mamíferos en muchos hábitats.

• **OBSERVACIÓN** Muchas transmiten enfermedades. La Pulga del perro transmite la tenia a perros, gatos y al hombre. La bacteria de la peste bubónica de la Edad Media era transmitida por pulgas de la rata.



**LAS LARVAS** son delgadas, pálidas y vermiformes.

▷ **SPILOPSYLLUS CUNICULI**, la Pulga del conejo, muy difundida, es portadora de la mixomatosis del conejo.



**CEDIPSYLLA SIMPLEX** se halla en los conejos de *Sylvilagus*, en Norteamérica.

Longitud 1-8 mm

Alimentación de la larva



## MOSQUITOS Y MOSCAS

**E**L ORDEN DE LOS DÍPTEROS contiene 130 familias y 122.000 especies. Tienen sólo un par de alas, ya que las posteriores se reducen a unos pequeños órganos equilibradores en forma de maza (balancines). Algunos son ápteros. Hay dos subórdenes. Los delicados y esbeltos nematóceros (desde Bibionidae hasta Tipulidae) tienen antenas finas. Los braquíceros, que se dividen en

Orthorrhapha y Cyclorrhapha (desde Acroceridae hasta Tephritidae) son más robustos y sus antenas cortas y gruesas tienen menos de seis artejos. La metamorfosis es completa.

Son polinizadores, parásitos, depredadores y descomponedores vitales en todo tipo de hábitats. Pero muchos dañan las cosechas o transmiten enfermedades que tienen un enorme impacto.

Orden DIPTERA	Familia BIBIONIDAE	N.º de especies 780
---------------	--------------------	---------------------

### BIBIÓNIDOS

Son peludos y negros o marrones. Los machos tienen la cabeza grande, con los ojos que se tocan. Las hembras la tienen más pequeña, con ojos separados. No vuelan antes de abril.

• **CICLO VITAL** Las hembras excavan en el suelo donde ponen series de huevos. Las larvas viven en el suelo estiércol y hojarasca.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas.

En pastos, prados, bosques y jardines.



Longitud 0,5–1,1 cm	Alimentación de la larva
---------------------	--------------------------

Orden DIPTERA	Familia CECIDOMYIIDAE	N.º de especies 5.000
---------------	-----------------------	-----------------------

### MOSQUITOS DE LAS AGALLAS

Tienen las patas largas y esbeltas. Pueden ser blancos, de amarillo pálido a verde, o pardos. Las alas tienen unas pocas venas longitudinales.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en materia en descomposición o el suelo y dentro de plantas, produciendo agallas en las que crecen las larvas, que comen ácaros, hongos o plantas en descomposición.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Materia en descomposición, o sus plantas huésped.

• **OBSERVACIÓN** Muchos dañan cultivos.



Longitud 1–8 mm; la mayoría menos de 4 mm	Alimentación de la larva
---	--------------------------

Orden DIPTERA	Familia CERATOPOGONIDAE	N.º de especies 4.000
---------------	-------------------------	-----------------------

### CÍNIFES ENANOS

También denominados beatas, suelen picar a los vertebrados o a otros insectos. Delgados o rechonchos, con patas cortas y fuertes, gris o pardo apagado, por lo general con un moteado oscuro en las alas. La cabeza es muy redondeada y las antenas plumosas de los machos captan los aleteos de las hembras.

• **CICLO VITAL** Se aparean mientras vuelan en enjambres. La puesta se realiza en grupos o hileras, en el suelo mojado, en materia en descomposición, en ciénagas y en el agua. Los adultos chupan la sangre de muchos vertebrados. Algunas especies chupan los fluidos corporales de insectos de mayor tamaño, mientras que otras capturan y devoran insectos muy pequeños o comen otros tipos de materias.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, pero principalmente en el hemisferio norte. Comunes a orillas de charcas, ríos, lagos y ciénagas y cerca de las costas marinas.

• **OBSERVACIÓN** Su picadura es muy irritante, lo que casi imposibilita trabajar al aire libre en algunas regiones. En las zonas más cálidas, algunos transmiten gusanos parásitos al hombre y otros enfermedades a los animales, como la dolencia africana de los caballos o el virus de la lengua azul. Importantes polinizadores.

LAS LARVAS son vermiformes, con cabeza diferenciada. Pueden tener pelos.

dibujos venosos indistintos, sobre todo, en la punta de las alas



CULICOIDES IMPUNCTATUS es notorio en lagos, arroyos y ciénagas escoceses. La picadura de la hembra es muy irritante y dolorosa.

Longitud 1–5 mm; la mayoría en torno a 3 mm	Alimentación de la larva
---	--------------------------

Orden DIPTERA	Familia CHIRONOMIDAE	N.º de especies 5.000
---------------	----------------------	-----------------------

### QUIRONÓMIDOS

De tórax giboso, pueden ser robustos o delicados, con las patas largas y delgadas, y son marrón pálido o algo verdoso. Recuerdan a los mosquitos verdaderos.

• **CICLO VITAL** Dura 2–3 años los adultos sólo viven un par de semanas. Se aparean en vuelo, y las hembras ponen sus huevos en una gelatina, sobre el agua o las plantas. Las larvas comen materia orgánica descompuesta, algas y diminutos seres acuáticos; algunas son depredadoras o excavan en plantas acuáticas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Muy difundidos, se les observa al atardecer, en enjambres cerca de charcas, lagos y arroyos.

• **OBSERVACIÓN** Las larvas son esenciales en las redes de alimentación acuáticas. Algunas tienen hemoglobina, lo que les ayuda a vivir en aguas estancadas.



Δ CHIRONOMUS RIPARIUS es una especie europea cuyas larvas viven en charcas y brazos de río estancados.

Las especies de CHIRONOMUS son delicadas. Los adultos viven poco—unos pocos días—pero son muy abundantes.

Longitud 1–9 mm	Alimentación de la larva
-----------------	--------------------------



Orden	DIPTERA	Familia	CULICIDAE	N.º de especies	3.100
-------	---------	---------	-----------	-----------------	-------

## MOSQUITOS VERDADEROS

El cuerpo de estos dípteros delicados y finos está cubierto de escamas que forman dibujos blancos, grises, pardos y negros. Algunas especies tropicales presentan colores brillantes. Las alas, largas y estrechas, tienen escamas a lo largo de las venas y de los bordes, y las piezas bucales son largas, delgadas y penetrantes.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en la superficie del agua, uno a uno o en grupos de 30 a 300. Las larvas son saprófagas o comen otras larvas de mosquito y obtienen aire por un sifón abdominal. Las hembras adultas chupan la sangre de los vertebrados pero también sorben fluidos vegetales y néctar; los machos se alimentan de fluidos vegetales, néctar y ligamaza. El ciclo vital dura menos de tres semanas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en zonas cálidas. Los adultos son comunes cerca de los terrenos arbolados y las larvas en cualquier extensión de agua, desde un hueco de árbol lleno de agua hasta un abrevadero.

• **OBSERVACIÓN** Las hembras de muchas especies transmiten graves enfermedades a animales y al hombre: malaria, fiebre amarilla, dengue, filariasis y encefalitis. La malaria está causada por los protozoos del género *Plasmodium*. Cada 12 seg. muere una persona de malaria en el mundo. Pese a los esfuerzos por controlarla, sigue siendo un problema creciente.



LAS LARVAS son alargadas, con pelos en los grandes segmentos torácicos.

las hembras tienen las antenas algo plumosas

palpos cortos

escamas blancas

coloración parda oscura

balancín

abdomen cubierto de escamas

franjas pálidas en los tarsos posteriores

+

Δ *Aedes cantans* es una especie europea que cría en charcas de agua temporales y que pica al hombre.



toma de sangre visible dentro del cuerpo

Δ *Anopheles gambiae* pertenece al principal género de mosquitos portadores de malaria y es un vector de la enfermedad muy difundido por África. Pican más al hombre que a los animales.



Las especies de *Culex* descansan con la cabeza y el abdomen dirigidos hacia abajo. Varias transmiten enfermedades, como la filariasis.

Longitud 0,3–2 cm; la mayoría menos de 1 cm

Alimentación de la larva

Orden	DIPTERA	Familia	MYCETOPHILIDAE	N.º de especies	3.300
-------	---------	---------	----------------	-----------------	-------

## MOSQUITOS DE LAS SETAS

Estos pequeños dípteros similares a los mosquitos verdaderos suelen ser pardos, negros o amarillentos, aunque algunas especies tienen colores brillantes. El tórax es característicamente giboso y las patas largas y finas.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en hongos, sobre o bajo la corteza, en paredes de cuevas y en nidos. Las larvas comen hongos y viven dentro de éstos, en madera y en plantas en descomposición, o bajo la corteza. Algunas comen insectos y gusanos. Pupan en su alimento o en un capullo de seda.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En lugares húmedos y oscuros, y cerca de plantas en descomposición.

• **OBSERVACIÓN** Las larvas del género *Arachnocampa*, que viven en cuevas de Australia y Nueva Zelanda y son luminescentes, capturan insectos en hilos enganchosos que cuelgan de las rocas.

LAS LARVAS son blancas, lisas y muy delgadas, con la cabeza parda o negra.



tórax giboso

abdomen delgado y oscuro

espinas en las tibiae

primer segmento de los tarsos alargado



primer segmento de la pata (coxa) muy alargado

Δ *MACROCERA STIGMA* es una especie muy difundida del oeste europeo con pelos en las alas.

*PLATYURA MARGINATA* es una especie bastante grande y de coloración oscura que vive en el oeste europeo. Sus larvas viven bajo la madera en descomposición.

Longitud 0,2–1,5 cm

Alimentación de la larva

Orden	DIPTERA	Familia	PSYCHODIDAE	N.º de especies	2.000
-------	---------	---------	-------------	-----------------	-------

## MOSCAS DE LA ARENA Y MOSCAS POLILLA

Son grises o pardas y tienen pelos o escamas. Las alas son anchas y puntiagudas; las moscas de la arena las pliegan sobre el cuerpo, las polilla en tejadillo. Son nocturnas.

• **CICLO VITAL** Las moscas de la arena comen sangre de vertebrados, pero ponen sus huevos y sus larvas crecen en el suelo húmedo. Las moscas polilla ponen huevos y viven cerca de la materia húmeda y en descomposición.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en zonas cálidas. Las moscas de la arena en hábitats cálidos y secos; las polilla en bosques cerca de arroyos.

• **OBSERVACIÓN** Algunas transmiten la leishmaniasis.



LAS LARVAS son alargadas y algunas están ahusadas.







*PERICOMA FULIGINOSA* es una mosca polilla oscura. Sus larvas crecen en aguas someras y en huecos de descomposición de los árboles.



Longitud 1–5 mm



Alimentación de la larva





Orden DIPTERA	Familia SIMULIIDAE	N.º de especies 1.500
<b>SIMULIDOS</b> Por lo general negros o marrones oscuros, tienen un aspecto robusto y giboso. Las antenas y patas son cortas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en aguas corrientes. Las larvas se adhieren a las piedras y plantas con una ventosa dorsal y pupan en cápsulas sumergidas. Al emerger, ascienden a la superficie y vuelan.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Cerca de aguas corrientes.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Las especies de <i>Simulium</i> transmiten la oncocercosis en las regiones tropicales.</li> </ul>		
 LAS LARVAS se anclan al sustrato con su chupador posterior.		 patas cortas y robustas tórax giboso, característico Las especies de <i>SIMULIUM</i> , o moscas negras, no siempre son negras del todo. Muchas transmiten enfermedades.
Longitud 1-5 mm; la mayoría menos de 4 mm	Alimentación de la larva	

Orden DIPTERA	Familia TIPULIDAE	N.º de especies 15.000
<b>TIPÚLIDOS</b> Las largas patas de estos frágiles dípteros se desprenden con mucha facilidad al cogerlos. Son pardos, negros o grises, con marcas de color amarillo o marrón pálido. El extremo del abdomen es romo y engrosado en los machos. Las hembras tienen un ovopositor puntiagudo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos en el suelo. Las larvas viven en el suelo, madera descompuesta, nidos y ciénagas, donde comen raíces, materia orgánica muerta y musgos. Algunos son carnívoros. Muchos adultos viven poco, vuelan en el crepúsculo y a veces comen néctar.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Se los encuentra a menudo cerca del agua o entre la vegetación húmeda, en terrenos arbolados sombreados o en pastos.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Muchas larvas son plagas de los cultivos y los jardines.</li> </ul>		
 patas muy largas y frágiles Entre las especies de <i>HOLORUSIA</i> hay los mayores tipúlidos del mundo. Éste tiene una envergadura de 10 cm.		 LAS LARVAS tienen el cuerpo correoso. parte frontal de la cabeza alargada
 las antenas del macho pueden parecer plumosas manchas ahumadas en el extremo del ala marcas amarillas y negras, como de avispa		
Longitud 0,6-6 cm; la mayoría 1,2-2,4 cm	Alimentación de la larva	

Orden DIPTERA	Familia ACROKERIDAE	N.º de especies 500
<b>MOSCAS DE CABEZA PEQUEÑA</b> Estas moscas tienen la cabeza pequeña, con unos ojos que la cubren en su mayor parte. El cuerpo es grueso y el tórax tiene un aspecto giboso. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en la hierba o sobre ramitas, o bien los dejan caer en vuelo. Las larvas parasitan jóvenes arañas y no se desarrollan hasta que la araña realiza su última muda. Entonces, mudan, devoran los órganos internos de la araña y abandonan su cuerpo para pupar.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En diversos hábitats, donde hayan arañas.</li> </ul>		
 LAS LARVAS se tornan gordas y vermiformes dentro de la araña.		 piezas bucales alargadas para coger néctar cabeza pequeña cuerpo oscuro y rechoncho abdomen ancho dibujo de venas sencillo en las alas Las especies del género <i>LASIA</i> se desarrollan dentro de tarántulas de Sudamérica.
Longitud 0,3-2,2 cm	Alimentación de la larva	

Orden DIPTERA	Familia AGROMYZIDAE	N.º de especies 2.500
<b>AGROMÍCIDOS</b> Son grises, negros o amarillo verdosos y muestran dibujos en las alas. Abdomen fusiforme. Hembras con ovopositor puntiagudo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en tejidos vegetales. Las larvas perforan túneles en las hojas o se alimentan dentro de tallos, semillas o raíces. Algunas forman agallas. Pupan de túnel o el suelo.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Donde haya plantas huésped.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Son plagas de los cultivos. Control de malas hierbas.</li> </ul>		
 LAS LARVAS son blancas o amarillo pálido y aplanadas.		 cerdas gruesas, curvas y negras en la cabeza y el tórax matiz ahumado en las alas Las especies del género <i>HEXOMYZA</i> viven en Gran Bretaña, EE UU, Japón y Sudáfrica. Sus larvas producen agallas en los árboles.
Longitud 1-6 mm	Alimentación de la larva	

Orden DIPTERA	Familia ANTHOMYIIDAE	N.º de especies 1.500
<b>ANTOMÍIDOS</b> Parecen moscas domésticas (ver p. 148) de color amarillento, pardo o negro. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos en o sobre tejidos vegetales y las larvas minan los tallos y las hojas, o producen agallas, en las plantas huésped. Algunas se desarrollan en algas descompuestas o en el estiércol y unas pocas especies viven como parásitas dentro de nidos de abejas y avispas solitarias.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en el hemisferio norte. En muchos hábitats boscosos y húmedos, o cerca de las costas marinas.</li> </ul>		
 LAS LARVAS suelen ser ahusadas y romas por detrás.		 ANTHOMYIA IMBRIDA se encuentra en muchas partes de Europa. Sus larvas comen detritos de nidos de aves. tórax gris con marcas negras alas transparentes patas finas y con cerdas manchas negras en el abdomen
Longitud 0,2-1,2 cm; la mayoría 0,7-0,9 cm	Alimentación de la larva	



Orden DIPTERA	Familia ASILIDAE	N.º de especies 5.000
---------------	------------------	-----------------------

## ASÍLIDOS

La cabeza de estas moscas esbeltas o parecidas a abejas es algo ahuecada entre los ojos y con un largo mechón de pelos en el rostro.

• **CICLO VITAL** Pican a otros insectos en un punto débil como el cuello, los paralizan con su saliva y chupan su contenido. Ponen en el suelo o bien sobre o dentro de plantas. La larvas viven en el suelo, la hojarasca o la madera podrida, donde pueden comer los huevos, larvas y pupas de otros insectos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas.

En muchos de hábitats, sobre todo, herbazales secos o semiáridos.



LAS LARVAS son alargadas, cilíndricas y puntiagudas.

matiz ahumado en los extremos



△ **BLEPHAROTES SPLENDIDISSIMUS** vive en Australia. Tiene unos mechones de pelo en forma de placas a los lados del abdomen.

**PAGIDOLAPHRIA FLAMMIPENNIS** tiene una trompa larga y aplanada. Algunos de los pelos faciales son tan largos como la trompa.

Longitud 0,3–7 cm; la mayoría 0,8–1,5 cm

Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia BOMBYLIIDAE	N.º de especies 5.000
---------------	---------------------	-----------------------

## BOMBÍLIDOS

Aunque algunos son pequeños, la mayoría suelen ser gruesos y peludos, similares a los abejorros. Muchas especies son de coloración parda, roja y amarilla, y algunas tienen marcas brillantes.

• **CICLO VITAL** Las larvas suelen parasitar las larvas de otros insectos, aunque unas pocas comen huevos de saltamontes. Las hembras producen muchos huevos pequeños que pueden poner cerca del nido de una abeja huésped. Las activas larvas de primer estadio localizan las larvas de la abeja huésped en su nido, se las comen y pupan en la celda de la abeja. Los adultos comen néctar.

• **DISTRIBUCIÓN**

Cosmopolitas, en regiones abiertas y semiáridas. En torno a flores o en el suelo.



LAS LARVAS son curvas y ahuecadas en los extremos.



Las especies del género **SYSTROPUS** habitan en el trópico y el subtrópico; son esbeltas y parecen avispas.



△ **BOMBYLIUS DISCOLOR** es una especie europea. Con su ancho abdomen y su cuerpo peludo, parece un abejorro.



**LIGYRA VENUS** es una especie de distintivo dibujo que vive en Tanzania. Sus larvas crecen en nidos de avispas.

Longitud 0,2–3 cm; la mayoría menos de 2 cm

Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia CALLIPHORIDAE	N.º de especies 1.200
---------------	-----------------------	-----------------------


## MOSCARDONES

Estas moscas son gruesas y pueden ser de color verde o azul metálico, negro brillante o apagado. En algunas especies, los sexos son de colores distintos. Incluyen las moscardas azules y las verdes.

• **CICLO VITAL** Ponen huevos en la carroña, los excrementos y la carne. Las larvas de algunos comen hormigas, termites y huevos y larvas de otros insectos, y unos pocos chupan la sangre de las crías de ave. Algunas moscardas paren larvas en vez de poner huevos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre las flores, la vegetación y la carroña. También les atrae la comida cocinada o cruda.

• **OBSERVACIÓN** Muchos ponen sus huevos sobre el ganado o el hombre y transmiten enfermedades. La moscarda verde de las ovejas (*Lucilia sericata*), pone sus huevos en la lana y sus larvas labran túneles en la carne. Unas pocas especies de moscardones horadan la carne humana y se utilizaban en cirugía para extraer tejidos muertos.



**CALLIPHORA VOMITORIA** es una especie de moscarda azul que es extremadamente común en zonas rurales. Las hembras pueden poner muchos centenares de huevos durante su vida.



LAS LARVAS son blancas o pálidas, ahuecadas por delante y romas por detrás. Franjas de diminutas espinas rodean el cuerpo.



△ **CYNOMYIA MORTUORUM** es una moscarda azul común cuyas larvas se desarrollan en la carne podrida, en cadáveres y en excrementos humanos.

▽ **CALLIPHORA VICINA** es más común en las ciudades, donde las larvas crecen en cadáveres de animales como palomas, ratas y ratones.



Longitud 0,4–1,5 cm

Alimentación de la larva



Orden DIPTERA	Familia CELYPHIDAE	N.º de especies 100
---------------	--------------------	---------------------

### MOSCAS ESCARABAJO

Se llaman el escutelo (parte posterior del tórax), similar a la de un escarabajo. Enormemente dilatado y a menudo de colores metálicos, cubre el abdomen y las alas plegadas.

- **CICLO VITAL** La puesta se realiza —y las larvas se desarrollan— en materia vegetal en descomposición.
- **DISTRIBUCIÓN** Regiones tropicales salvo América Central y del Sur. En hábitats muy húmedos y en herbazales.



**LAS LARVAS** son pequeñas, pálidas, vermiformes y ahusadas.



Las especies del género *CHAEMAECELYPHUS* empujan sus alas hacia afuera, desde debajo de la parte posterior del tórax para volar.


Longitud 3–8 mm
Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia CHLOROPIDAE	N.º de especies 2,000
---------------	---------------------	-----------------------


### CLORÓPIDOS

Estos insectos comunes son de color gris negruzco, verde o negro, con marcas amarillas. Marca triangular bien aparente en la parte superior de la cabeza.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en tejidos vegetales. Las larvas cavan túneles en plantas herbáceas. Otras producen agallas o comen materia vegetal en descomposición, pulgones de las raíces, huevos de arañas o de otros insectos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Muy difundidos.
- **OBSERVACIÓN** Varios atacan los cereales y algunos provocan ceguera en el hombre y animales.



**LAS LARVAS** suelen ser delgadas, romas por detrás y estrechas por delante.



*MEROMYZA PRATORUM* vive en dunas costeras, donde sus larvas labran túneles en los tallos de *Ammophila arenaria*.


Longitud 1–6 mm; la mayoría menos de 4 mm
Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia CONOPIDAE	N.º de especies 1,000
---------------	-------------------	-----------------------


### CONÓPIDOS

Estas moscas tienen la cabeza ancha y un abdomen que se estrecha en su unión con el tórax. Muchas parecen abejas o avispas.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos sobre otras moscas, grillos, cucarachas, avispas o abejas. Las larvas escarban en su cuerpo y comen sus fluidos corporales.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En hábitats diversos. Comen en las flores.
- **OBSERVACIÓN** Algunas larvas hacen que la abeja huésped se entierre antes de morir. Después pupan.



**LAS LARVAS** son estrechas por delante y anchas por detrás. Sin pelos y con finas arrugas.



Las especies del género *CONOPS* parecen avispas. A menudo se alimentan en flores de las umbelíferas.


Longitud 0,3–2,6 cm
Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia DIOPSIDAE	N.º de especies 180
---------------	-------------------	---------------------


### MOSCAS DE OJOS PEDUNCULADOS

Destacan por la cabeza, con pedúnculos que llevan los ojos y las antenas. Son mayores en los machos y pueden estar ausentes en las hembras.

- **CICLO VITAL** Enganchan sus huevos a las hojas jóvenes o a la materia vegetal en descomposición. Los machos entablan combates por el territorio y por las hembras. Suelen vencer los que tienen los ojos más espaciados.
- **DISTRIBUCIÓN** Regiones tropicales en África. Ausentes de Sudamérica; sólo una especie vive en Norteamérica. Suelen vivir cerca o sobre la vegetación, o junto a las aguas corrientes.



**LAS LARVAS** son ahusadas y tienen el cuerpo liso y lampiño.



*CYRTODIOPSIS DALMANNI* vive en partes del sudeste de Asia. Sus larvas excavan túneles en los tallos de varias especies herbáceas.


Longitud 0,3–1,8 cm
Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia DOLICHOPODIDAE	N.º de especies 5,500
---------------	------------------------	-----------------------


### MOSCAS PATILARGAS

Estas moscas pequeñas y erizadas de cerdas son de color azul, verde o bronce metálico. La redondeada cabeza tiene una trompa corta y carnosa. Patas largas.

- **CICLO VITAL** La puesta se realiza —y las larvas viven— bajo la corteza y en el suelo húmedo, el agua, el barro, la hojarasca y las algas marinas. Las larvas comen otros insectos; los adultos, néctar o insectos blandos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En prados húmedos, bosques y arroyos, y en orillas lacustres o marinas.
- **OBSERVACIÓN** Algunas larvas depredan las larvas de los escarabajos de la corteza o los mosquitos.



*SCELLUS NOTATA* es una especie bastante común en Europa. Suele encontrarse en zonas herbosas.



Los machos de *POEILOBOTHRUS NOBILITATUS* a menudo se hallan sobre el barro expuestos al sol. Agitan sus alas para exhibirlas a las hembras.

Longitud 0,1–1 cm; la mayoría menos de 4 mm
Alimentación de la larva



Orden DIPTERA	Familia DROSOPHILIDAE	N.º de especies 2.900
---------------	-----------------------	-----------------------

## DROSOFÍLIDOS

Llamados moscas de las frutas o del vinagre, estos pequeños dípteros amarillos, pardos o negros tienen los ojos claros o rojo vivo. El tórax y el abdomen son moteados o listados.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en o cerca de una fuente de alimento (bacterias hongos, carroña o estiércol). Algunos escarban dentro de hojas, comen ninfas de agrofóridos o larvas acuáticas de moscas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre frutos y materia en descomposición, cerca de hongos.
- **OBSERVACIÓN** La mitad son del género *Drosophila*.



Las especies del género *DROSOPHILA* se sienten a menudo atraídas por la fruta en descomposición.

Δ *DROSOPHILA MELANOGASTER* Mosca del vinagre, se usa en genética, ya que se reproduce con rapidez y tiene grandes cromosomas en sus glándulas salivares.

Las larvas tienen espinas alrededor de los segmentos.


Longitud 1-6 mm Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia EMPIDIDAE	N.º de especies 3.500
---------------	-------------------	-----------------------

## EMPÍDIDOS

Su nombre común de moscas bailarinas alude a los movimientos de los enjambres de apareamiento. La mayoría tienen el tórax grueso y el abdomen alargado y ahusado. La redondeada cabeza tiene grandes ojos y una trompa afilada y dirigida hacia abajo.

- **CICLO VITAL** Los machos pueden regalar presas a las hembras. Éstas ponen sus huevos sobre el suelo, el estiércol, la madera en descomposición y el agua, donde se desarrollan las larvas, que comen insectos. Los adultos comen pequeñas moscas y beben néctar.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el hemisferio norte. Sobre la vegetación, en hábitats muy húmedos; en enjambres sobre el agua.



Los adultos de *WIEDEMANNIA STAGNALIS* son depredadores y se posan en el musgo húmedo (donde se desarrollan las larvas) a la espera de presas.

Las especies del género *EMPIS* tienen una gran trompa dirigida hacia abajo que les permite "apuñalar" a sus presas y extraer los fluidos.

Las larvas son esbeltas y las acuáticas tienen propodios.


Longitud 0,15-1,1 cm Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia GASTEROPHILIDAE	N.º de especies 50
---------------	-------------------------	--------------------

## REZNOS

Parecen abejas melíferas (ver págs. 180-81). Tienen piezas bucales no funcionales y no se alimentan. Son parásitos internos de grandes mamíferos como caballos, rinocerontes y elefantes. Algunos pueden parasitar al hombre.

- **CICLO VITAL** Los adultos son de vida corta y ponen sus huevos en la hierba o cerca de la boca del huésped. Las larvas son tragadas por él. Viven en su intestino. Al madurar, caen al suelo con los excrementos, donde pupan.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en Asia y África. Cerca de los animales huéspedes.



Las larvas son gruesas, con franjas de espinas que apuntan hacia atrás.

*GASTEROPHILUS INTESTINALIS* parasita a los caballos. Se lanza sobre ellos para poner huevos en su piel, que se los tragan cuando se acean el pelaje.


Longitud 1-2,5 cm Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia GLOSSINIDAE	N.º de especies 22
---------------	---------------------	--------------------

## MOSCAS TSÉ-TSÉ

Son pardas o grises, comen sangre y provocan la enfermedad del sueño en el hombre y la nágana en los animales. Al posarse, cruzan las alas sobre el abdomen.

- **CICLO VITAL** Ponen un huevo. La larva eclosiona dentro de la hembra y se alimenta de secreciones glandulares. Se transforma en pupa y el adulto emerge a las semanas.
- **DISTRIBUCIÓN** África. En sabanas arboladas y en zonas arbustivas.



Las larvas son igual de grandes que los adultos.

*GLOSSINA MORSITANS* es una de las especies que transmiten el parásito tripanosoma, que causa la enfermedad del sueño.


Longitud 0,6-1,4 cm Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia HIPPOBOSCIDAE	N.º de especies 200
---------------	-----------------------	---------------------

## HIPOBÓSCIDOS

Son gruesos y aplanados. Tienen una corta trompa y unas patas fuertes y con garras para aferrarse al pelo o las plumas. Son parásitos y comen sangre de animales.

- **CICLO VITAL** Las larvas se desarrollan dentro de la hembra, salen al madurar y pupan sobre el huésped.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Sobre animales huéspedes (ganado vacuno, ovino y caballar, y aves).




Las larvas son blancas o amarillas. Desarrolladas, son planas y redondas.

*CRATAERINA PALLIDA* parasita los vencejos. El 75% de las especies parasitan aves.


Longitud 0,15-1,2 cm Alimentación de la larva



Orden DIPTERA	Familia MUSCIDAE	N.º de especies 3.500
<b>MÚSCIDOS</b> Suelen ser de colores apagados, tienen cerdas oscuras y patas largas y esbeltas. Las piezas bucales son aptas para lamer fluidos o para perforar y chupar sangre. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen masas de huevos en materia en descomposición, hongos, nidos, plantas o en el agua. Las larvas (cresas) crecen enseguida. Pupan en una semana.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Sobre flores, heces y materia en descomposición; cerca del huésped.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Son vectores de infecciones (fiebre tifoidea y cólera).</li> </ul>		
		
Longitud 0,2–1,2 cm		Alimentación de la larva



Orden DIPTERA	Familia MYDIDAE	N.º de especies 350
<b>MÍDIDOS</b> Mimetizan a los pompílicos o avispas cazadoras de arañas y a los sírfidos (ver págs. 188-189 y pág. 153). Suelen ser blandos y negros, aunque las puntas de las alas y las antenas pueden ser anaranjadas. Las piezas bucales son débiles. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos en el suelo o en madera en descomposición. Las larvas, con mandíbulas grandes, comen larvas de escarabajos y pupas de insectos.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en las zonas más cálidas de África y Sudamérica. En zonas arenosas y secas.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Contienen las mayores moscas. Las larvas de <i>M. heros</i> viven en nidos de hormigas y comen larvas de escarabajos.</li> </ul>		
		
Longitud 2–6 cm		Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia NYCTERIBIIDAE	N.º de especies 250
<b>MOSCAS DE LOS MURCIÉLAGOS</b> Chupan la sangre de los murciélagos. Tienen una cabeza estrecha y ojos diminutos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Los huevos eclosionan en el abdomen de la madre, que alimenta las larvas con unas glándulas especiales. Deposita las pupas en el dormitorio de los murciélagos. Los adultos emergen cuando oyen a un murciélago en la proximidad.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas.</li> </ul>		
		
Longitud 2–4 mm		Alimentación de la larva



Orden DIPTERA	Familia OESTRIDAE	N.º de especies 80
<b>ESTROS, MOSCAS ZUMBADORAS</b> Corpulentas, peludas y de cabeza grande, muchas parecen abejas. Los adultos viven poco y no se alimentan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Las larvas parasitan mamíferos como ovejas y vacas. Los estros de los ollares ponen sus larvas en las narinas de sus huéspedes. Otros estros ponen sus huevos en el pelo del huésped y las larvas excavan bajo la piel. Luego, emergen y pupan en el suelo.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en África y el hemisferio norte. Cerca del huésped.</li> </ul>		
		
Longitud 0,8–2,5 cm		Alimentación de la larva

Orden DIPTERA	Familia PANTOPHTHALMIDAE	N.º de especies 25
<b>MOSCAS DE LA MADERA</b> Parecen grandes tábanos (ver pág. 154) pero con piezas bucales pequeñas y no picadoras. Abdomen cuadrangular y alas con dibujos oscuros. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen huevos en grietas de la corteza, y las larvas horadan en la madera. No se sabe si digieren la madera o comen savia y hongos.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Sudamérica, en selvas pluviales.</li> </ul>		
		
Longitud 0,3–5 cm		Alimentación de la larva



Orden DIPTERA	Familia PHORIDAE	N.º de especies 3.000
<b>FÓRIDOS</b> Estas moscas pequeñas, pardas, negras o amarillentas tienen un distintivo dorso jorobado. Poseen también una cabeza pequeña y muy doblada hacia abajo, y sus fémures posteriores son planos y muy engrosados. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos –y las larvas se desarrollan– en muchos microhábitats. Algunas larvas comen hongos, carroña y materia en descomposición; otras son detritívoras o parásitas de otros insectos, caracoles, ciempiés o gusanos.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En muchos hábitats.</li> </ul>		
 <p><i>ANEVRINA THORACICA</i> es nativa del hemisferio norte. Sus larvas viven en el suelo, cadáveres de pequeños animales y nidos de topo.</p> <p><b>LAS LARVAS</b>, más gruesas en el centro, tienen proyecciones espinosas.</p> <p>Longitud 0,6–6 mm</p> <p>Alimentación de la larva </p>		

Orden DIPTERA	Familia PLATYSTOMATIDAE	N.º de especies 1.200
<b>PLATISTÓMIDOS</b> Tienen colores vivos y alas con dibujos. Sus antenas se pliegan dentro de unos surcos en la cabeza y los ojos de los machos pueden ser pedunculados. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en materia en descomposición. Se acoplan en árboles y los machos usan sus alas para la parada nupcial.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en partes cálidas y húmedas de Europa, Asia y África. En una amplia gama de hábitats.</li> </ul>		
 <p><i>CLITODOCA FENESTRALIS</i> es una gran especie africana con una envergadura de 4,5 cm. Su colorido es importante en el cortejo.</p> <p><b>LAS LARVAS</b> son cilíndricas y con la punta roma. Tienen espinas cortas bajo el abdomen.</p> <p>Longitud 0,4–2 cm</p> <p>Alimentación de la larva </p>		

Orden DIPTERA	Familia PSILIDAE	N.º de especies 250
<b>PSÍLIDOS</b> Estas moscas tienen una coloración que varía de pardorrojizo a negro, y su cabeza es algo triangular o redondeada. En muchas especies reciben el nombre común de mietetas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen los huevos sobre las plantas huésped o en el suelo cerca de las raíces. Las larvas suelen minar los tallos o las raíces de las plantas, u horadan bajo la corteza; algunas forman agallas.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Hemisferio norte. Terrenos arbolados y muy húmedos.</li> </ul>		
 <p><i>PSILA ROSAE</i>, la Mosca de la zanahoria, es una plaga muy extendida de las plantas de zanahoria, apio y chirivía.</p> <p><b>LAS LARVAS</b> son delgadas, pálidas, lisas y cilíndricas.</p> <p>Longitud 3–9 mm</p> <p>Alimentación de la larva </p>		

Orden DIPTERA	Familia SARCOPHAGIDAE	N.º de especies 2.500
<b>MOSCARDAS DE LA CARNE</b> En su mayoría son negras o gris plata apagado. El tórax presenta listas longitudinales y el abdomen se ve ajedrezado o jaspeado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Se llaman así porque algunas ponen sus huevos en las cavidades corporales y en las heridas de los vertebrados, entre ellos el hombre. Las hembras suelen “poner” o dejar caer en vuelo las larvas de primer estadio y conservan las cáscaras de los huevos en su cuerpo. Algunas larvas se alimentan de carroña; otras parasitan insectos, caracoles, gusanos u otros invertebrados.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, especialmente en el hemisferio norte. En hábitats variados.</li> </ul>		
 <p><i>SARCOPHAGA MELANURA</i> se halla cerca de las costas de Gran Bretaña. Sus larvas viven en la materia en descomposición pero pueden parasitar caracoles o insectos.</p> <p><b>LAS LARVAS</b> son apuntadas por delante y romas detrás, con franjas de espinas.</p> <p>Longitud 0,2–2 cm; la mayoría 0,6–1 cm</p> <p>Alimentación de la larva </p>		

Orden DIPTERA	Familia SCATHOPHAGIDAE	N.º de especies 350
<b>MOSCAS DEL ESTIÉRCOL</b> Ser pardas, pardoamarillentas o gris apagado, pero algunas son negras o amarillas y negras. Sus finas patas pueden tener cerdas fuertes y oscuras. Suelen ser muy peludas. El nombre común crea confusión, pues sólo se refiere a las del género <i>Scathophaga</i> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos en plantas, donde las larvas comen el follaje y pueden ser minadoras de hojas, o en el estiércol, donde se comen otras larvas. Algunas se hallan en el agua o el suelo muy húmedo, donde depredan pequeños invertebrados. Los adultos capturan y comen insectos.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Hemisferio norte. En varios hábitats, incluidos todo tipo de plantas y estiércol fresco.</li> </ul>		
 <p><i>SCATHOPHAGA STERCORARIA</i>, o Mosca amarilla del estiércol, está muy extendida por el hemisferio norte. Es común en el estiércol de ganado lanar y vacuno, y en las heces de gallinas, caballos y seres humanos.</p> <p><b>LAS LARVAS</b> son pálidas y cilíndricas. Algunas se ahúsan hacia delante.</p> <p>Longitud 0,3–1,2 cm</p> <p>Alimentación de la larva </p>		



Orden DIPTERA	Familia SEPSIDAE	N.º de especies 250
---------------	------------------	---------------------

## SÉPSIDOS

Muchos son de un negro o parduzco brillante y los machos, que agitan sus alas para atraer a las hembras, tienen a menudo los extremos de las alas oscuros. Algunas especies pequeñas parecen hormigas. Las patas anteriores de los machos tienen cerdas y espínas que les permiten agarrar las alas de las hembras en el apareamiento.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos —y las larvas se encuentran, a veces, en abundancia— en el estiércol de mamíferos, el compost y la carroña.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, sobre flores y en el estiércol o materia orgánica descompuesta.

• **OBSERVACIÓN** Algunos forman enormes enjambres a fines de verano. Se cree que marcan los lugares en los que han estado para el apareamiento, después de la hibernación.



Δ *NEMOPODA NITIDULA* tiene un abdomen que se estrecha al unirse con el tórax, lo que le da aspecto de avispa.



**LAS LARVAS** son finas y ahusadas por delante. Último segmento abdominal engrosado.

• *ORYGMA LUCTUOSA* vive en el hemisferio norte. Es muy grande y pone sus huevos sobre algas marinas putrefactas junto a la costa.

Longitud 2–6 mm	Alimentación de la larva
-----------------	--------------------------

Orden DIPTERA	Familia STRATIOMYIDAE	N.º de especies 2.000
---------------	-----------------------	-----------------------

## ESTRATIOMÍDOS

También llamadas moscas acorazadas, suelen ser bastante robustas y algo aplanadas, con marcas brillantes o metálicas. Algunas son bastante grandes y con aspecto de avispas. El ancho abdomen suele mostrar franjas amarillas, negras o verdes, y la cabeza es muy redondeada. En los machos, los ojos son enormes. Algunas son acuáticas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en la superficie del agua, sobre plantas o en el estiércol, el suelo o la madera descompuesta. Las larvas comen materia en descomposición o larvas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. A menudo en las flores. Algunas acuáticas.



**LAS LARVAS** son correosas y planas, con muchas cerdas cortas.



• *HEDRIODISCUS PULCHER* es nativa de Sudamérica. Tiene una coloración verde y unas marcas distintivas.

Longitud 0,3–2 cm	Alimentación de la larva
-------------------	--------------------------

Orden DIPTERA	Familia SYRPHIDAE	N.º de especies 6.000
---------------	-------------------	-----------------------

## SÍRFIDOS, MOSCAS CERNIDORAS

Se ciernen sobre las flores y vuelan a toda velocidad entre ellas. Muchos son bastante esbeltos y parecen avispas, con listas, pintas o franjas amarillas; otros son robustos, peludos y parecen abejas. Algunos son negros, azules o de colores metálicos. Una falsa vena recorre el centro de las alas, que tienen falsos márgenes.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos donde se alimentan las larvas. Los adultos se alimentan de polen y néctar. Muchas larvas comen pulgones mientras se desarrollan. Otras atacan las cochinillas, las larvas de las avispas portasierra y los insectos de cuerpo blando. Algunas se alimentan en o sobre madera en descomposición, estiércol, barro o agua estancada, y unas pocas sobre plantas u hongos. Algunas viven dentro de los nidos de abejas y avispas sociales, donde comen las larvas y pupas muertas de sus huéspedes.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Muchos hábitats, por lo general sobre flores umbelíferas.

• **OBSERVACIÓN** Unas pocas infestan los bulbos; la mayoría son importantes polinizadores.

*SERICOMYIA SILENTIS* se encuentra en brezales ácidos. Las larvas viven en charcas cenagosas como las que se forman después de cortar turba.

los grandes ojos de los machos suelen tocarse en la parte alta de la cabeza



**LAS LARVAS** varían en forma. Las que viven en el agua o en el estiércol líquido tienen detrás un tubo de respiración.



Δ *SYRRHUS RIBESII* es una especie tipo avispa común en Europa. Se agrupa en grandes números y sus larvas comen moscas verdes.



• *VOLUCELLA ZONARIA* es una mosca cernidora robusta, con franjas distintivas. Es nativa de Europa y es migradora. Las larvas son carroñeras dentro de nidos de avispas.

Longitud 0,3–3,4 cm; la mayoría 1–2 cm	Alimentación de la larva
--	--------------------------



Orden DIPTERA	Familia TABANIDAE	N.º de especies 4.000
---------------	-------------------	-----------------------

## TÁBANOS

Son robustos, lampiños, con ojos de colores vivos y cabeza redondeada y aplanada. La mayoría son negros, grises o pardos, con franjas o marcas brillantes. Las piezas bucales de las hembras cortan la piel. Los machos carecen de ellas y beben en charcas y flores.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el suelo y madera en descomposición. Las larvas viven en el suelo húmedo o el barro cerca de arroyos, donde comen gusanos, crustáceos y larvas de insectos. Otras en huecos de árboles o en madera en descomposición. Los adultos comen polen y néctar y las hembras, también sangre de mamíferos y aves.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, cerca de mamíferos.

• **OBSERVACIÓN** En las regiones cálidas, pueden transmitir enfermedades que afectan a los animales y al hombre.



*TABANUS ATRATUS* está difundido en EE UU. Esta y otras especies pican el ganado vacuno y pueden afectar a la producción de carne de buey. Pueden transmitir virus al ganado.



**LAS LARVAS** suelen ser correas y lustradas, con finas estrías longitudinales.

Las especies de género *TABANUS* son oscuras y robustas. Este gran tábano probablemente mimetiza a una gran abeja (ver pág. 179).



*TABANUS SUETICUS* tiene el abdomen en gran parte negro y a modo de abeja, con distintivas marcas triangulares en la línea central.

Longitud 0,6–3 cm

Alimentación de la larva \*

Orden DIPTERA	Familia TACHINIDAE	N.º de especies 8.000
---------------	--------------------	-----------------------

## TAQUÍNIDOS

Son robustos y muy variables en cuanto a aspecto. Muchos parecen moscas domésticas cerdosas (ver pág. 148) y otros pueden parecer casi como avispas. El abdomen está recubierto de cerdas, sobre todo hacia el extremo posterior.


• **CICLO VITAL** Las larvas suelen parasitar insectos. Ponen los huevos sobre el huésped o dentro de él. Algunas especies los ponen en la boca de insectos que se están alimentando o sobre plantas que los huéspedes comen.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas.

En muchos hábitats, donde hayan huéspedes.

• **OBSERVACIÓN** Muchas especies se utilizan como agentes de control biológico.

**LAS LARVAS** son blancas o amarillentas, tal vez con espinas.



*FORMOSA MONETA* es una mosca gruesa con una coloración altamente distintiva. Ataca y parasita las larvas de coleópteros escarabeidos (ver págs. 128-129).

Longitud 0,5–1,5 cm

Alimentación de la larva \*

Orden DIPTERA	Familia TEPHRITIDAE	N.º de especies 4.500
---------------	---------------------	-----------------------

## TEFRÍTIDOS

Suelen tener dibujos alares que ayudan a identificarlos. Éstos pueden formar franjas, manchas o marcas en zigzag. Las hembras tienen un ovopositor puntiagudo que puede ser más largo que el resto del cuerpo.


• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en plantas. Algunas larvas comen en frutos blandos o cabezuelas florales; otras minan hojas o forman agallas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En una gran variedad de hábitats.

• **OBSERVACIÓN** Muchas especies son plagas de cosechas y frutos. *Ceratitis capitata*, la Mosca mediterránea de las frutas, daña los cítricos.



**LAS LARVAS** son de formas variables. El cuerpo puede ser liso o espinoso.



*ICTERICA WESTERMANNI* es una especie europea que se alimenta de flores de hierba pana.

Longitud 0,2–2 cm; la mayoría menos de 1,5 cm

Alimentación de la larva \*



## FRIGÁNEAS

**L**OS MIEMBROS DEL ORDEN de los tricópteros, con 43 familias y 8.000 especies, viven donde hay agua dulce. Los esbeltos y apagados adultos parecen mariposas nocturnas pero tienen pelos en alas y cuerpo, no escamas. Las largas antenas son multisegmentadas, y las piezas bucales, poco desarrolladas, sirven para sorber líquidos, aunque los adultos de muchas especies no se alimentan.

Tienen ojos compuestos, a veces con ocelos. En vuelo, las alas anteriores y las posteriores quedan trabadas entre sí por unos pelos curvos.

Las hembras suelen poner ristas de huevos envueltos en una sustancia gelatinosa adheridos a las plantas acuáticas. La metamorfosis es completa. Las larvas pupan dentro de estuches que construyen con granos de arena, ramitas, etc.

Orden TRICHOPTERA	Familia HYDROPSYCHIDAE	N.º de especies 1.000
-------------------	------------------------	-----------------------

## HIDROPSÍQUIDOS

Son de colores apagados y tienen las alas peludas o transparentes. El pronoto tiene unas protuberancias verrugosas.


• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el agua. Las robustas larvas viven junto a una red en forma de taza que tejen entre las piedras. Comen los organismos, algas y detritos que caen en ella. Algunas son depredadoras.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Comunes en arroyos y ríos.

• **OBSERVACIÓN** El tamaño de la malla de la red varía en las distintas especies.



**LAS LARVAS** tienen branquias ramificadas en tórax y abdomen.



**HYDROPSYCHE CONTUBERNALIS** es nativa de Europa occidental. Es más común en aguas corrientes que en aguas estancadas. Tiene la coloración apagada típica de las frigáneas.

Longitud 0,6–1,8 cm	Alimentación de la larva
---------------------	--------------------------

Orden TRICHOPTERA	Familia HYDROPTILIDAE	N.º de especies 1.000
-------------------	-----------------------	-----------------------

## HIDROPTÍLIDOS

Estas frigáneas tienen una coloración negra, blanca o moteada de gris. Están densamente cubiertas de pelos.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en masas de aspecto gelatinoso, en el agua o plantas. Los cuatro primeros estadios larvales son activos y chupan jugos de plantas acuáticas. El último fabrica un envoltorio de seda con sus glándulas salivales abierto en el extremo.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Cerca de arroyos, ríos, y lagos.



**LAS LARVAS** son pequeñas y libres en los primeros estadios.

El género **HYDROPTILA** es cosmopolita; con unas 150 especies, es el más extenso y difundido.

Longitud 2–6 mm	Alimentación de la larva
-----------------	--------------------------

Orden TRICHOPTERA	Familia LIMNephilidae	N.º de especies 1.500
-------------------	-----------------------	-----------------------

## LIMNEFÍLIDOS

Son pardo oscuro o algo matizados de rojo o amarillo. Las alas tienen marcas oscuras, un margen frontal recto y se ven "tronechadas" por detrás. Patas anteriores con espolones tibiales.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el agua. Las larvas fabrican estuches que recuerdan cabañas de troncos. La mayoría comen detritos orgánicos, algas y otros pequeños organismos.

• **DISTRIBUCIÓN** Principalmente en el hemisferio norte. En torno a estanques, lagos, arroyos, acequias, charcas temporales y marjales.



**LAS LARVAS** tienen la cabeza redonda; son grandes.



**LIMNephILUS LUNATUS** es una especie muy difundida. Sus larvas se hallan en muchos hábitats de agua dulce. La coloración es variable pero por lo general en tonos apagados de negro y de pardo.

Longitud 0,7–3 cm; la mayoría menos de 2,4 cm	Alimentación de la larva
---	--------------------------

Orden TRICHOPTERA	Familia PHILOPOTAMIDAE	N.º de especies 500
-------------------	------------------------	---------------------

## FILOPOTÁMIDOS

Son pequeños y de coloración apagada, con las alas ovaladas. Tienen la cabeza bastante plana, con ocelos.

• **CICLO VITAL** Ponen en el agua. Las larvas viven en redes que enganchan a las rocas. Con las piezas bucales, filtran las partículas orgánicas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Especialmente comunes cerca de arroyos de curso rápido.



**LAS LARVAS** tienen la cabeza y el pronoto teñidos de rojo.

**PHILOPOTAMUS MONTANUS** suele encontrarse en torno a torrentes de curso rápido, en zonas onduladas o montañosas de Europa.

Longitud 4–8 mm	Alimentación de la larva
-----------------	--------------------------

Orden TRICHOPTERA	Familia PHRYGANEIDAE	N.º de especies 450
-------------------	----------------------	---------------------

## FRIGANEIDOS

Tienen marcas de color marrón claro o gris y pueden parecer moteados. Tienen ocelos. Hay al menos dos espolones en las patas anteriores y cuatro en las intermedias y en las posteriores.

• **CICLO VITAL** Ponen en el agua. Las larvas fabrican estuches de fragmentos vegetales y van añadiendo nuevos materiales.

• **DISTRIBUCIÓN** Sobre todo en el hemisferio norte. Cerca de lagos, ciénagas y ríos de curso lento.



**LAS LARVAS** son planas. La cabeza puede tener franjas oscuras.



**PHRYGANEA GRANDIS** es la mayor frigánea de Europa occidental. El macho es menor que la hembra (que aquí se muestra) y carece de la distintiva raya oscura a lo largo del ala anterior.

Longitud 1,2–2,6 cm	Alimentación de la larva
---------------------	--------------------------



## MARIPOSAS

**L**AS 127 FAMILIAS Y 165.000 especies de mariposas forman el orden de los lepidópteros. No existe una diferencia científica entre las mariposas nocturnas y las diurnas, aunque éstas tienen antenas en forma de maza y las nocturnas suelen carecer de ellas. Tienen escamas diminutas y superpuestas en el cuerpo y las alas, y antenas multisegmentadas. Las piezas bucales forman una trompa apta para sorber néctar y otros líquidos. Primero se describen las mariposas nocturnas (Arctiidae-Zygaenidae) y luego las diurnas (Lycaenidae-Pieridae).

En el cortejo, cada sexo libera una sustancia olorosa que es transportada

por el viento y recogida por las antenas de la pareja. Las hembras ponen sus huevos sobre las plantas nutricias de la larva. La metamorfosis es completa. Las larvas cilíndricas (orugas), la mayoría herbívoras, tienen piezas bucales masticadoras, tres pares de patas torácicas y varios propodios abdominales armados con unos garfios diminutos para agarrarse a las plantas nutricias. Hay de cuatro a nueve estadios larvales. La pupa (crisálida) puede estar: bajo tierra, en una cápsula tapizada de seda; rodeada de un capullo de seda producido por la larva madura; o desnuda y adherida a la planta nutricia.

Orden LEPIDOPTERA	Familia ARCTIIDAE	N.º de especies 2.500
-------------------	-------------------	-----------------------


### ÁRCTIDOS

La mayoría tienen el cuerpo grueso y peludo, a menudo de coloración brillante en distintas combinaciones de negro, rojo, amarillo y anaranjado que disuaden a los depredadores. Las mariposas armiño son pálidas o blancas, con pequeñas marcas negras. Incluyen las más esbeltas y apagadas eilemas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en o en torno a las plantas huéspedes. Muchas orugas comen materia vegetal y la mayoría lo hacen de noche. Son muy peludas y muchas especies son venenosas porque comen plantas con sustancias tóxicas. Las eilemas se alimentan de día y sus orugas comen líquenes.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En zonas con abundante vegetación donde crecen las plantas huéspedes.

• **OBSERVACIÓN** Algunos son plagas de bosques y vergeles.



*ESTIGMENE ACREA* es una mariposa armiño del sudeste de Canadá y parte del este de EE UU.



*ARCTIA CAJA*, la Quelonía o Gitana, es una especie muy coloreada de Europa, Norteamérica y Asia.



LAS ORUGAS crisalidan dentro de un capullo de seda en el que entretienen algunos de sus largos pelos.

Envergadura 2-7 cm; la mayoría 2,5-4 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA	Familia BOMBYCIDAE	N.º de especies 100
-------------------	--------------------	---------------------

### BOMBÍCIDOS

Son gruesos, peludos, de color crema, gris o marrón pálido. Sin piezas bucales funcionales; no comen.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos sobre las plantas huéspedes. Pupan en un capullo de seda. Las orugas de *Bombyx mori* comen, p. ej., hojas de morera.

• **DISTRIBUCIÓN** Sudeste de Asia. En zonas con mucha vegetación, donde haya plantas huéspedes.



LAS ORUGAS son lisas, con propodios en algunos segmentos abdominales.

*BOMBYX MORI*, la Mariposa de la seda, se originó en Asia pero hoy se encuentra en todo el planeta.

Envergadura 2-6 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA	Familia BRAHMAEIDAE	N.º de especies 20
-------------------	---------------------	--------------------

### BRAHMEIDOS

Son grandes, con dibujos alares ondulados. Las alas anteriores pueden tener marcas oceladas.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en las plantas huéspedes y pupan en el suelo.

• **DISTRIBUCIÓN** Europa oriental, Asia y África. En bosques y otros terrenos arbolados.



*BRAHMAEA WALLICHTII*, la Brahmaea de Gray, es una de las mayores especies de esta familia.



LAS ORUGAS tienen protuberancias abdominales.

Envergadura 5-16,5 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA	Familia CASTNIIDAE	N.º de especies 180
-------------------	--------------------	---------------------

### CÁSTNIDOS

Vuelan de día, se parecen mucho a las mariposas diurnas y tienen unas alas anchas. Alas anteriores de colores crípticos, pero las posteriores pueden ser brillantes o metálicas, con pintas blancas o anaranjadas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos sobre las plantas huéspedes. Las orugas son minadoras de tallos o comen raíces.

• **DISTRIBUCIÓN** América Central y del Sur, sudeste de Asia y Australia. En zonas con abundante vegetación, donde vivan las plantas huéspedes.

las antenas tienen forma de maza y son ganchudas en la punta



LAS ORUGAS son pálidas, lampiñas y en forma de cresa.

*CASTNIA LICUS*, la Minadora gigante de la caña de azúcar, es también plaga de los plátanos.



Envergadura 3-11 cm

Alimentación de la larva





Orden LEPIDOPTERA	Familia COSSIDAE	N.º de especies 700
-------------------	------------------	---------------------


<p><b>CÓSIDOS</b></p> <p>De cuerpo grueso, suelen tener alas moteadas y de colores apagados, con dibujos irregulares pardos, blancos o crema. Algunas especies reciben el nombre de mariposas leopardo porque tienen las alas blancas moteadas de negro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos sobre la corteza o en los túneles de los que emergen las mariposas adultas, al cabo de 1-4 años. Crisalidan en sus túneles o en el suelo, dentro de un capullo hecho de seda y de fibras de madera masticadas.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En zonas arboladas.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Algunos son plagas de robles, arces, pinos y otros árboles. Los aborígenes australianos comen larvas de cósidos.</li> </ul>	 <p><b>ZEUZERA PYRINA</b>, el Taladro amarillo de los frutales, abunda en el hemisferio norte.</p>  <p><b>COSSUS COSSUS</b> es el Taladro rojo de los troncos. Sus larvas pueden desprender un olor fétido.</p>
---	---



 <p><b>LAS ORUGAS</b> son de cuerpo grueso y suelen alimentarse de tejido leñoso.</p>	<p>Envergadura 2 - 22,5 cm</p> <p>Alimentación de la larva </p>
---	--

Orden LEPIDOPTERA	Familia DREPANIDAE	N.º de especies 1.000
-------------------	--------------------	-----------------------



<p><b>DREPÁNIDOS</b></p> <p>La mayoría de las especies tienen el extremo de las alas anteriores ganchudo y muchas son esbeltas de cuerpo, con las alas de colores apagados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Las hembras ponen sus huevos planos sobre las plantas huésped; las orugas comen hojas de árboles y arbustos. En las orugas de muchas especies, los propodios del final del abdomen están muy reducidos y el extremo caudal puede ser fusiforme o puntiagudo.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Regiones tropicales salvo Sudamérica. Terrenos arbolados, vegetación.</li> </ul>	 <p><b>DREPANA ARCUATA</b>, la Drepana arqueada, vive en Norteamérica. Sus orugas se alimentan de hojas de abedul y de aliso.</p>
--	---



 <p><b>LAS ORUGAS</b> de algunas especies descansan con la cabeza y la cola levantadas, o con la parte frontal encorvada.</p>	<p>Envergadura 2 - 5 cm</p> <p>Alimentación de la larva </p>
---	---

Orden LEPIDOPTERA	Familia GEOMETRIDAE	N.º de especies 20.000
-------------------	---------------------	------------------------

<p><b>GEOMÉTRIDOS</b></p> <p>Las alas son bastante grandes y redondeadas, con complejos dibujos. Suelen ser nocturnos y tener una coloración de camuflaje parda o verde. Algunas especies tropicales vuelan de día y son de colores brillantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos sobre la corteza, las ramitas o los tallos de las plantas huésped y la eclosión tiene lugar en primavera. Cuando se las molesta, las orugas de muchas especies se quedan quietas y adoptan el aspecto de ramitas. Cuando terminan su desarrollo, tejen un frágil capullo entre las hojas.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En cualquier lugar con vegetación.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Muchas especies son plagas agrícolas y forestales.</li> </ul>	 <p><b>GEOMETRA PAPILIONARIA</b> o Gran esmeralda; sus orugas se alimentan de hojas de hayas, alisos y avellanos.</p>  <p><b>RHEUMAPTERA HASTATA</b> está muy difundida por el hemisferio norte.</p>
--	--



  

 <p><b>DE LAS ORUGAS</b> se dice que son agrimensoras debido a su modo de locomoción, como si "midieran" el terreno.</p>	<p>Envergadura 1,4 - 7,4 cm</p> <p>Alimentación de la larva </p>
---	---



  

Orden LEPIDOPTERA	Familia HEPIALIDAE	N.º de especies 300
-------------------	--------------------	---------------------

<p><b>HEPIÁLIDOS</b></p> <p>La mayoría tienen las alas anteriores y posteriores similares. Muchos tienen una coloración apagada; otros presentan pintas plateadas y brillantes. Las alas no quedan trabadas en vuelo como en otras mariposas nocturnas sino que sólo se solapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Dejan caer sus huevos uno a uno en el suelo, cerca de las plantas huésped, y los pueden producir a centenares. Las orugas suelen minar los tallos troncos y raíces, pero unas pocas comen hojas o musgo.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en el sudeste de Asia y en Australia. Herbazales y terrenos arbolados.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Muchas especies pueden convertirse en plagas de hierbas, verduras, árboles y arbustos.</li> </ul>	<p><b>MACHO</b></p>  <p>Las orugas de <b>HEPIALUS HUMULI</b> son blanco amarillentas, con pintas oscuras. Pueden ser plagas de la patata, lechuga y las fresas.</p>  <p><b>HEMBRA</b></p> <p>alas anteriores y posteriores de formas similares</p>
---	---

 <p><b>LAS ORUGAS</b> de esta familia son blancas, con la cabeza parda.</p>	<p>Envergadura 3 - 24 cm</p> <p>Alimentación de la larva </p>
--	--



Orden LEPIDOPTERA

Familia HESPERIIDAE

N. de especies 3.000

## HESPÉRIDOS

Tienen el cuerpo grueso y se parecen mucho a las mariposas nocturnas. Las antenas terminan en una maza larga, curva y puntiaguda. Las alas anteriores suelen ser cortas y triangulares y las posteriores pueden llevar colas. Los adultos son diurnos y tienen un vuelo rápido.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos uno a uno sobre su planta huésped. Las orugas suelen alimentarse de noche de hierbas, juncias y otras herbáceas, y de hojas. De día se esconden en un refugio hecho de hojas enrolladas o plegadas.


• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo en Nueva Zelanda. En muchos hábitats abiertos, como campos cultivados y herbazales.




Δ **AMENIS BARONI** es peruana, de colores brillantes y con marcas rojo anaranjadas en las alas anteriores.



LAS ORUGAS son verdes, pardas o blancas. Tienen la cabeza grande, con el cuello diferenciado, y son ahusadas por detrás.



Δ **EUSCHEMON RAFFLESIA**, el coloreado Hespérico regente, vive en las pluvisilvas de Australia, donde se alimenta durante el día en las flores ricas en néctar.



Δ **URBANUS PROTEUS** es una especie común en América del Norte y del Sur. Sus largas alas posteriores con colas la hacen muy reconocible.

▷ **CALPODES ETHLIUS**, el Hespérico brasileño, está ampliamente difundido por Sudamérica y las Antillas. Este hespérico grande y robusto vuela a menudo a grandes distancias.



Envergadura 2-8 cm; la mayoría menos de 4,5 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA

Familia INCURVARIIDAE


N. de especies 300

## INCURVÁRIDOS

Suelen tener una coloración críptica. Algunos son de un bronceado o dorado metálicos. Otros tienen las antenas muy largas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos dentro de los tejidos vegetales. Las orugas son minadoras de semillas en sus primeros estadios y construyen un estuche con material vegetal donde viven y crisalidan.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo en Nueva Zelanda. En bosques, junto a plantas huésped.



**NEMOPHORA CUPRIACELLA** tiene un mechón de pelo anaranjado en la cabeza y las puntas de las antenas blancas.

▽ **NEMOPHORA SCABIOSELLA**, de Asia y Europa, tiene los márgenes alares oscuros.



LAS ORUGAS son pequeñas, con propodios abdominales.

antenas muy largas



Envergadura 0,8-2,5 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA

Familia LASIOCAMPIDAE

N. de especies 2.000

## LASIOCÁMPIDOS

Son muy peludos, con un cuerpo grueso pardoamarillento, pardo o gris. Las hembras son mayores que los machos y tienen el abdomen grande.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos sobre las plantas huésped. Las orugas viven juntas en redes de seda que tejen entre el follaje. Crisalidan en un capullo correoso.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo en Nueva Zelanda. Donde haya sus árboles y plantas huésped.



LAS ORUGAS son robustas, con mechones de pelos en el dorso y los flancos.

**MALACOSOMA AMERICANUM**, la Falsa lagarta americana, es una plaga de los manzanos y cerezos silvestres.



Envergadura 2,5-9,5 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA

Familia LIMACODIDAE

N. de especies 1.000

## LIMACÓDIDOS

Tienen las alas anchas y redondeadas, el cuerpo peludo y una coloración apagada. El nombre (como babosas) alude a la forma y a la locomoción de las orugas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos planos sobre hojas de las plantas huésped. Las orugas son venenosas o tienen pelos muy urticantes.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en el trópico. En arbustos y árboles.



LAS ORUGAS son de colores vivos. Carecen de propodios.

**SIBINE STIMULEA**, la Mariposa silla de montar de Norteamérica, recibe este nombre por la marca que tienen sus orugas en el dorso.

cuerpo peludo y de colores apagados

dos pintas blancas



Envergadura 2-4,5 cm

Alimentación de la larva



Orden LEPIDOPTERA

Familia LYMANTRIIDAE

N.º de especies 2.600

## LIMÁNTRIDOS

Se parecen a los noctuidos (ver pág. 165) pero son más peludos. La mayoría son de colores apagados, pero las especies tropicales pueden ser brillantes. Los machos son algo menores que las hembras, que a veces carecen de alas. Los adultos carecen de trompa y no se alimentan.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en series, en la corteza de los árboles y arbustos huésped, y a menudo incorporan los irritantes pelos del extremo de su abdomen para protegerlos. Las orugas, que pueden ser de colores brillantes, comen follaje.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, incluidos setos vivos y bosques de coníferas o de caducifolias.
- **OBSERVACIÓN** La Lagarta y la Mariposa de cola dorada son plagas graves en el hemisferio norte. Las explosiones demográficas de estas especies pueden causar grandes daños, defoliando grandes superficies.



**LAS ORUGAS** son muy peludas, por lo general con mechones de pelos en el dorso y los flancos.



**MACHO** • mechón de pelos

**LYMANTRIA DISPAR**, la Lagarta, es nativa de Europa y Asia pero fue introducida en Norteamérica para producir seda económica. Se escapó de su cautiverio y es una grave plaga.



**HEMBRA** • cuerpo grueso y peludo



**ORGYIA ANTIQUA**, la Mariposa viejecita, está difundida por el hemisferio norte. Las hembras son ápteras.



**EUPROCTIS CHRYSORRHOEA**, la Mariposa de cola dorada, tiene unas orugas peludas que viven en un nido de seda comunal.

Envergadura 2–6 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA

Familia NOCTUIDAE

N.º de especies 22.000

## NOCTUIDOS

Tienen las alas anteriores estrechas y las posteriores anchas. Suelen ser de colores apagados. En algunos las alas posteriores tienen dibujos y colores brillantes.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos uno a uno o en grupos, en la base de las plantas huésped o en el suelo. Las orugas se alimentan después del ocaso; suelen atacar sus plantas huésped, masticándolas u horadándolas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas.
- **OBSERVACIÓN** Tienen órganos de audición torácicos para detectar los murciélagos. Muchos son plagas graves en casi todo mundo. Una de ellas (ver a la derecha), que evolucionó de una mariposa perforadora de fruta, es chupadora de sangre.



**alas puntiagudas en el extremo**

**CALYPTRA EUSTRIGATA**, o Mariposa vampiro, es chupadora de sangre y utiliza sus piezas bucales armadas con púas para perforar la piel de los mamíferos.



**LAS ORUGAS** suelen alimentarse de sus plantas huésped de noche.



**HELIOTHIS ARMIGERA** es una plaga grave del algodón, el maíz y los tomates. Está difundida por el hemisferio oriental.



**XANTHOPASTIS TIMAIS** se encuentra en Sudamérica y Norteamérica tropicales. Sus orugas se alimentan de narcisos e higuieras.



**SPODOPTERA EXIGUA** tiene una distribución cosmopolita y es una plaga grave que infesta el algodón, el maíz y el arroz.



**AGROTIS IPSILON** se encuentra en todo el mundo. Sus orugas atacan el algodón, las patatas, los tomates y otros cultivos.

Envergadura 1,5–30 cm; la mayoría menos de 8 cm

Alimentación de la larva



Orden LEPIDOPTERA

Familia NOTODONTIDAE

N.º de especies 3.000

## NOTODÓNTIDOS

Suelen tener colores apagados, con un dibujo de camuflaje. En algunos hay mechones de escamas que sobresalen de los márgenes posteriores de las alas anteriores plegadas. El Pájaro luna (*Phalera bucephala*), imita ramitas rotas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos sobre las hojas de las plantas huésped. Las orugas comen hojas y se alimentan en grupos para protegerse de las aves. Algunas producen sustancias químicas y adoptan posturas amenazadoras. Algunas se denominan "procesionarias" porque se desplazan de noche en hilera cuando buscan alimentos.

De día, a menudo se refugian en masa, algunas veces en un nido laxo de seda.


• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, en sus plantas huésped, que suelen ser arbustos, árboles y plantas leguminosas.



**EPICOMA MELANOSTICA** es una especie australiana cuyas orugas se alimentan de hojas del género *Leptospermum*, comunes en partes del sur y del este de Australia.



**DATANA MINISTRA** es una especie de coloración bastante apagada de Norteamérica. Sus orugas tienen listas amarillas y negras y se alimentan de hojas de árboles.



**ANAPHE PANDA** vive en África y sus orugas tejen nidos de seda en forma de bolsa durante el día. Algunos miembros del género defolian sus árboles huésped.



**CERURA VINULA**, la Harpía, es común en Europa y parte de Asia y tiene un dibujo muy distintivo.



**LAS ORUGAS** son peludas o listadas, con protuberancias carnosas.

Envergadura 3–8 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA

Familia PYRALIDAE

N.º de especies 24.000

## PIRÁLIDOS

Suelen ser de colores apagados. En algunos, la cabeza parece tener un corto "hocico" formado por los largos palpos sensoriales que se mantienen rectos. Las alas anteriores son anchas o estrechas; las posteriores anchas y redondeadas. Las patas son largas.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en o cerca de las plantas huésped, de otros materiales del huésped o de la presa. Las orugas suelen alimentarse de hojas, tallos y raíces de la planta huésped. Algunos miembros son detritívoros; unos pocos depredan pequeños insectos y algunos crían en excrementos de perezosos o en cuernos de animales.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, sobre sus plantas huésped.

• **OBSERVACIÓN** Muchos son plagas de los cultivos y de los frutos desecados.



△ **ENDOTRICHA FLAMMEALIS** es una especie nocturna. Es nativa de las islas británicas y diversas otras partes de Europa occidental.



**LAS ORUGAS** son o bien esbeltas y cilíndricas o bien robustas. Hay propodios en algunos de los segmentos abdominales.


▷ **CHILO PHRAGMITELLA** se encuentra en carrizales, donde las orugas se alimentan de tallos de carrizos del género *Phragmites*, y de ahí el nombre científico de esta especie.



**VITESSA SURADEVA** es una especie de colores brillantes e insólito dibujo que vive en Borneo; todo este género es nativo del sudeste de Asia.

distintivos radios negros en la las alas anteriores

las alas anteriores tienen un dibujo amarillo y negro



Envergadura 1–4,5 cm

Alimentación de la larva



Orden LEPIDOPTERA

Familia SATURNIIDAE

N.º de especies 1.200

## SATÚRNIDOS

También conocidos como mariposas emperador, luna o pavones de noche, según las especies, tienen unas alas anchas y con marcas conspicuas. Las piezas bucales no son funcionales y los adultos no comen. Las antenas son plumosas en los machos y filiformes en las hembras. Las especies de *Attacus*, del sudeste de Asia, son las mayores mariposas del mundo en cuanto a superficie alar, si bien la de mayor envergadura es la "Polilla" gigante *Thysania agrippina*, de la familia Noctuidae (ver pág. 165).

• **CICLO VITAL** Ponien sus huevos en una amplia gama de árboles y arbustos y las orugas se alimentan en el follaje. Al culminar sus desarrollo, las orugas tejen densos capullos y los enganchan a las ramitas de sus plantas huésped.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En zonas boscosas tropicales y subtropicales. Las especies de *Attacus* están protegidas en algunos países, pero muchas mueren al revolotear en torno a las farolas.

• **OBSERVACIÓN** Unas pocas especies pueden ser plagas de varios árboles. La seda del capullo todavía se utiliza, si bien no tanto como la de la Mariposa de la seda (*Bombyx mori*, ver pág. 159).



LAS ORUGAS pueden adquirir gran tamaño y tienen protuberancias carnosas provistas de espinas y largos pelos.

marca blanca en zigzag  
media luna blanca en torno a la pinta oscura



antenas de las hembras menos plumosas que las de los machos

cuerpo grande y muy grueso


dibujo alar distintivo, ausente en los machos

dibujo submarginal presente en ambos sexos

**CALLOSAMIA PROMETHEA**, la Mariposa prometea, vive en Norteamérica. Las orugas se alimentan de hojas, entre ellas las de varios frutales. Los machos son en gran parte pardonegruzcos con un borde pálido; las hembras son de un pardorrojizo o pardo oscuro brillante, con marcas alares pálidas.

Envergadura 5-30 cm

Alimentación de la larva



borde oscuro en alas anteriores y cuerpo

ocelos de las alas anteriores unidos al margen alar oscuro

marcas ocelares translúcidas

cola larga con el borde exterior rojo y el borde interno amarillo pálido

cuerpo grande y peludo

**ACTIAS LUNA**, la Mariposa luna americana, vive de México a la frontera canadiense. Las orugas comen hojas de árbol.

▽ **ATTACUS ATLAS**, del sudeste de Asia, es la mayor mariposa del mundo en tamaño total. Sus orugas verde amarillentas y con espinas carnosas alcanzan hasta 10 cm. Comen plantas pero es fácil criarlas con algustre en cautividad.

alas curvadas en el extremo



antenas del macho anchas y plumosas

grandes manchas triangulares y translúcidas en las alas anteriores y posteriores

línea ondulada negra en los márgenes alares

línea roja en las alas anteriores y posteriores



Orden LEPIDOPTERA	Familia SESIIDAE	N.º de especies 1.000
-------------------	------------------	-----------------------


## SESIAS

Algunas parecen avispas o abejas. Su cuerpo es negro, azulado o pardo oscuro con marcas amarillas y anaranjadas, y el abdomen suele tener franjas. Zumban al volar, lo cual acentúa el mimetismo. Algunas fingen que pican. Las alas tienen grandes zonas transparentes, con escamas oscuras tan sólo a lo largo de las venas. El extremo del abdomen puede tener un mechón de largas escamas en forma de abanico, y las antenas tienen a menudo el extremo expandido o en forma de maza.

• **CICLO VITAL** Suelen poner sus huevos en troncos, tallos o raíces de árboles y arbustos, y las orugas horadan en su interior. Cuando las mariposas emergen de las pupas, sus alas están cubiertas de escamas; las zonas desnudas ya aparecen durante el primer vuelo.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Cerca de flores o sus plantas huésped.

• **OBSERVACIÓN** Muchas especies, como la Sesia del peral (*Synanthedon exitiosa*), son plagas de los frutales y de otros árboles y arbustos.



Δ *ALBUNA OBERTHURI* es una especie de gran tamaño del norte de Australia. Tiene unas alas posteriores transparentes y con una franja amarilla bien visible en la parte frontal y un patente mechón abdominal.



*SEsia APIFORMIS*, la Sesia o Abejilla del álamo y del chopo, mimetiza el avispa. Está difundida por el hemisferio norte, donde sus orugas dañan los álamos, chopos y sauces.



LAS ORUGAS son pálidas. Cabeza más pequeña que el tórax.

Envergadura 1,5–4 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA	Familia SPHINGIDAE	N.º de especies 1.100
-------------------	--------------------	-----------------------

## ESFINGES


Tienen el cuerpo alargado y robusto y alas anteriores largas y estrechas. La trompa, muy larga, se enrolla bajo la cabeza cuando no se usa. Cuando descansan, pliegan las alas hacia atrás en un ángulo distintivo. Los adultos son buenos voladores y la mayoría chupan néctar. Algunas se ciernen sobre las flores como los colibríes.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos uno a uno sobre las plantas; las orugas comen hojas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el trópico y subtropico. En muchos hábitats, dondequiera que se encuentren las plantas huésped.



Δ *EUCHLORON MEGAERA*, la Esfinge verde, vive en África. Sus orugas comen enredaderas y trepadoras.



*ACHERONTIA ATROPOS*, la Esfinge de la calavera, se encuentra en África y Europa. Se alimenta de la miel de las colmenas con su robusta trompa.



LAS ORUGAS suelen tener un "cuerno" del abdomen.

Envergadura 3–15 cm; la mayoría menos de 10 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA	Familia TORTRICIDAE	N.º de especies 5.000
-------------------	---------------------	-----------------------

## TORTRICÍDOS

Suelen ser pardos, verdes o grises, para confundirse con la corteza, el liquen y las hojas. Algunos son de colores vivos. Las alas anteriores son rectangulares.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos sobre las plantas huésped, donde se alimentan y crisalidan las orugas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Muchos hábitats.

• **OBSERVACIÓN** Las "judías saltarinas" mexicanas son semillas de plantas que contienen las larvas de una especie de tortricido.



LAS ORUGAS son robustas o esbeltas, con poco pelo.

*CLEPSIS RURINANA* vive en Europa y Asia. Sus orugas se hallan dentro de hojas abarquilladas de caducifolios.



Envergadura 0,8–3 cm

Alimentación de la larva



Orden LEPIDOPTERA	Familia URANIIDAE	N.º de especies 100
-------------------	-------------------	---------------------

**URÁNIDOS**

Son grandes mariposas diurnas con largas colas, colores vivos y escamas alares iridescentes y especies nocturnas apagadas sin colas.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos sobre las plantas huésped. Las orugas suelen comer plantas venenosas de la familia Euphorbiaceae. Los adultos migran en busca de mejores alimentos para sus larvas.
- **DISTRIBUCIÓN** Trópico y subtrópico. Sobre plantas huésped.
- **OBSERVACIÓN** En América del Sur y de Madagascar son tan grandes y de colores tan vivos que parecen mariposas diurnas.

**LAS ORUGAS** jóvenes de algunas especies viven juntas en una red de seda.



*CHRYSIDIA RIPHEARIA*, propia de Madagascar, tiene unas orugas amarillas y negras de mal sabor para los depredadores.

*alas anteriores con el extremo puntiagudo*

*moteado distintivo y tres colas en las alas posteriores*

Envergadura 6–10 cm

Alimentación de la larva


Orden LEPIDOPTERA	Familia ZYGAEINAE	N.º de especies 800
-------------------	-------------------	---------------------

**ZIGENAS**

Suelen ser negras con marcas brillantes o metálicas rojas, verdes o azules. Las antenas están engrosadas y la cabeza tiene un par de protuberancias peludas sobre los ojos. La mayoría producen cianuro de hidrógeno, rasgo del que advierten con su coloración.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos sobre plantas herbáceas huésped y las larvas comen hojas. Los adultos vuelan de día y comen flores. Crisidan en un capullo alargado.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo Nueva Zelanda; en el trópico y subtrópico. Sobre las plantas huésped.

**LAS ORUGAS** tienen pequeñas verrugas con mechones de pelos.



*cabeza negra*

*cuerpo esbelto*

*la coloración llamativa indica que no es comestible*

*cuerpo negro*

*ZYGAEIA FILIPENDULAE*, la Zigena común o de seis manchas, es común en toda Europa.

*ΔADSCITA STATICES* se encuentra en Europa y Asia. Sus orugas se alimentan de acedera.

Envergadura 2,5–3,5 cm

Alimentación de la larva


Orden LEPIDOPTERA	Familia LYCAENIDAE	N.º de especies 6.000
-------------------	--------------------	-----------------------

**LICÉNIDOS**

Los machos de estas mariposas diurnas pequeñas y esbeltas suelen tener otro color que las hembras. La cara superior de las alas puede ser azul iridescente, cobriza o purpúrea, pero en algunos es parda o anaranjada. La cara inferior en ambos sexos es de colores apagados, con pequeñas pintas de centro oscuro.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos sobre las plantas huésped. Las orugas comen insectos pequeños. Las larvas suelen segregar un fluido muy apreciado por las hormigas. Estas las protegen de sus enemigos y les permiten comer sus larvas. Pupan dentro de la planta huésped, en detritos o bajo tierra.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, especialmente en las regiones más cálidas. En asociación con nidos de hormigas o con plantas huésped.

**LAS ORUGAS**, rechonchas y ahusadas, parecen babosas y son verdes o pardas.




*las alas del macho son de un azul violáceo vivo*

*borde anaranjado*


*las escamas blancas del cuerpo parecen pelos*

*ΔPOLYOMMATUS ICARUS*, la Icaro o Dos puntos, es uno de los licénidos europeos más difundidos.



*marcas negras en alas anteriores*

*ΔLYCAENA PHLAEAS*, la Manto bicolor, es una mariposilla de colores vivos muy difundida por el hemisferio norte.



*marcas anaranjadas en las alas anteriores de la hembra*

*listas blancas en las alas*

*colas cortas con el borde oscuro*

**CARA INFERIOR**

*THECLA BETULAE*, la Topacio, es una especie forestal que se halla en Europa y en regiones templadas de Asia.

*cara superior de las alas brillante e irizada*

*muchas especies tienen colas en las alas posteriores*

*ΔTHECLA CORONATA*, la Topacio azul de Hewitson, se halla en las regiones tropicales de Sudamérica. Es uno de los licénidos de mayor tamaño y de colores más brillantes.

Envergadura 1,5–5 cm

Alimentación de la larva



Orden LEPIDOPTERA

Familia NYMPHALIDAE

N.º de especies 5.000

## NINFÁLIDOS

Tienen las dos patas anteriores muy reducidas, vuelan de día y varían mucho en tamaño y color. La cara superior de las alas suele ser de colores brillantes, pero la inferior tiene una coloración de camuflaje que los protege cuando descansan.

- **CICLO VITAL** Ponen grupos de huevos sobre las hojas de árboles, arbustos y plantas. Las orugas pueden alimentarse comunalmente cuando son muy jóvenes. Las pupas que a menudo tienen protuberancias verrugosas, cuelgan cabeza abajo gracias a un pequeño grupo de ganchos terminales (el cremáster).
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En prados con flores y claros de terrenos arbolados.
- **OBSERVACIÓN** Unos pocos pueden ser plagas y causar daños en cultivos como batatas y soja.



**LAS ORUGAS** suelen ser espinosas, con protuberancias y proyecciones.

▷ **NYMPHALIS ANTIOPA**, en inglés "Belleza de Camberwell", debe su nombre a la parte de Londres donde se encontró el primer ejemplar registrado.

distintivas pintas blancas en las alas anteriores

alas posteriores moteadas de negro y rojo



anchas franjas rojas

**VANESSA ATALANTA**, la Vanesa atalanta o Numerada, está muy difundida. Las orugas comen orugas y plantas afines a éstas.



líneas radiales inusuales en las alas posteriores

Δ **HELICONIUS ERATO** es nativa de América Central y del Sur.

pintas pálidas en el margen



hileras de pintas azul púrpuro

Envergadura 3-15 cm

Alimentación de la larva



▽ **MORPHO MENELAUS** vive en Sudamérica. La que aquí se muestra es la hembra. Los machos son casi por completo de color azul metálico.

marcas blancas "dentadas" en los márgenes alares

márgenes alares festoneados

▽ **CARA SUPERIOR**

manchas blancas a todo lo largo de los márgenes alares

ocelos de centro blanco



manchas blancas en la cabeza

▽ **CARA INFERIOR**



márgenes festoneados



**DANAUS PLEXIPPUS**, la Monarca, es famosa por sus migraciones a larga distancia, la más larga de las cuales se extiende desde México hasta Canadá.

**MANIOLA JURTINA**, la Loba, es una especie muy común en los pastizales y prados de Europa. Sus orugas se alimentan de hierbas.




Orden LEPIDOPTERA	Familia PAPILIONIDAE	N.º de especies 600
-------------------	----------------------	---------------------

## PAPILIÓNIDOS

Las alas suelen ser oscuras, con franjas, pintas o manchas de color blanco, amarillo, anaranjado, rojo, verde o azul. Muchos tienen colas en sus alas posteriores.


- **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus redondos huevos sobre las plantas huésped; las orugas comen hojas. Suelen pupar sobre la planta huésped, con la crisálida vertical y sujeta por un "cinturón" de seda.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en las regiones más cálidas. En hábitats ricos en flores, abiertos y sombreados.
- **OBSERVACIÓN** Contienen las especies de *Ornithoptera*, las mariposas diurnas más grandes, hoy protegidas.



márgenes alares festoneados

colas en alas posteriores

**PAPILIO GLAUCUS**, el Papilio tigre, es una especie norteamericana. El nombre común alude a las marcas de sus alas anteriores.



alas anteriores grandes y puntiagudas

mazas antenales delgadas

abdomen amarillo


pintas alares amarillas

pintas alares negras

fondo oscuro con un dibujo verde brillante

márgenes alares festoneados

**ORNITHOPTERA PRIAMUS**, la Ornitóptera de Priamo o de Cairns, vive en la pluvisilva. Aquí se muestra el macho. Las hembras son más grandes con las alas blancas y negras.



**LAS ORUGAS** emiten un olor desagradable que disuade a los depredadores.

Envergadura 4,5–28 cm

Alimentación de la larva

Orden LEPIDOPTERA	Familia PIERIDAE	N.º de especies 1.200
-------------------	------------------	-----------------------

## PIÉRIDOS

Las alas suelen ser blancas, amarillas o anaranjadas, con marcas negras o grises oscuras. La pigmentación de las escamas alares deriva de los productos de desecho en la alimentación de las orugas.

- **CICLO VITAL** Suelen poner sus huevos uno a uno sobre plantas huésped. Las orugas carecen de espinas o de protuberancias, pero las crisálidas tienen una proyección espinosa en el extremo cefálico; se mantienen verticales sobre la planta huésped gracias a un "cinturón" de seda.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats. Suelen verse en grupos, en torno a heces de aves, orina o charcos, a la luz del sol. Algunos migran en grandes números.
- **OBSERVACIÓN** Muchos son plagas de los cultivos, p. ej., la Blanca de la col (*Pieris brassicae*) y la Blanquita de la col (*P. rapae*).



extremo anaranjado en el ala anterior del macho

extremo gris en el ala anterior

marca oscura en las alas pálidas

cara superior blancusca e inferior amarilla pálida, con escamas grises esparcidas

pinta negra en alas anteriores

márgenes alares anchos y oscuros

**Δ ANTHOCHARIS CARDAMINES**, la Aurora, está difundida por Europa y Asia. La cara inferior de las alas posteriores está moteada de verde. El macho tiene las puntas de las anteriores anaranjadas.



pinta anaranjada en alas posteriores

**Δ PIERIS RAPAE**, la Blanquita de la col, es una especie poco vistosa que se encuentra por todo el mundo. El macho se muestra aquí; la hembra es de color amarillento.

**COLIAS EURYTHEME**, la Colias anaranjada, está muy difundida por Norteamérica. El macho, que aquí se muestra, es algo menor que la hembra.

Envergadura 2–7 cm

Alimentación de la larva



## ABEJAS, AVISPAS, HORMIGAS Y AVISPAS PORTASIERRA

**E**L ORDEN DE LOS HIMENÓPTEROS tiene 91 familias y 198.000 especies. Hay dos subórdenes: las avispas portasierra (Symphita) y las avispas, hormigas y abejas (Apocrita). Las familias se dividen en: avispas sociales y abejas y hormigas (Andrenidae a Vespidae), avispas parásitas (Agaonidae a Trichogrammatidae) y avispas portasierra (Argidae a Siricidae).

La mayoría tienen dos pares de alas membranosas. En todas las especies a excepción de las avispas portasierra, el primer segmento abdominal está fusionado con el tórax, mientras que el segundo y algunas veces el tercer segmento son estrechos y forman una cin-

tura. Las hembras de las avispas portasierra tienen un ovopositor en forma de sierra mientras que las de las parásitas lo tienen largo y fino. El ovopositor de las hembras de abejas, hormigas y avispas sociales ha evolucionado hacia un aguijón y los huevos salen de una abertura en su base. La metamorfosis es completa. El sexo de la progenie viene determinado por haplodiploidía, donde los huevos fecundados producen hembras y los no fecundados machos.

Muchas especies tienen un comportamiento social avanzado y juegan un papel vital en varios ecosistemas como depredadores, parásitos y polinizadores.

Orden HYMENOPTERA Familia ANDRENIDAE N.º de especies 2.500

### ABEJAS MINADORAS

Son pardorrojizas o pardonegruzcas, aunque algunas son amarillas o blancas. El tórax y el abdomen pueden ser peludos. La mayoría son solitarias.

• **CICLO VITAL** Las hembras construyen nidos en madrigueras subterráneas y ponen sus huevos en celdas, donde se desarrollan las larvas. Suelen estar cubiertas con una sustancia protectora e impermeable, segregada por una glándula abdominal, y reciben un aporte de polen y miel, el alimento de las larvas. El polen es recolectado y transportado al nido en las patas posteriores.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo Australia. En hábitats ricos en flores, sobre todo en primavera.

• **OBSERVACIÓN** Son polinizadoras vitales de las flores de primavera.



**ANDRENA FULVA**, la Abeja minadora leonada, aparece en primavera. En el césped, un pequeño montón delata su nido.



**LAS LARVAS** pueden ser esbeltas o robustas, con protuberancias en los segmentos.

**ANDRENA CINERARIA** es europea. Aquí se muestra la hembra. El macho tiene el tórax más peludo y pelos blancos en los fémures. Las hembras sólo los tienen en los fémures anteriores.



Longitud 0,4–2 cm; la mayoría 1–1,5 cm

Alimentación de la larva


Orden HYMENOPTERA Familia ANTHOPHORIDAE N.º de especies 4.000

### ABEJAS CUCO, EXCAVADORAS Y CARPINTERAS

Las abejas cuco, parecidas a avispas, son amarillas y negras o pardas y blancas. No tienen una región transportadora de polen en sus patas posteriores. Las excavadoras suelen ser robustas y peludas y las carpinteras son o muy grandes y negras o azuladas, pequeñas y verdes azuladas oscuras.

• **CICLO VITAL** Las abejas cuco parasitan nidos de abejas que nidifican en el suelo. Ponen sus huevos en ellos y cuando eclosiona, la larva se alimenta del huevo o la larva que lo ocupa. Las excavadoras hacen sus nidos en madrigueras del suelo y proveen las celdas larvales de polen y miel. Las carpinteras excavan túneles en la madera y preparan celdas. Cada una recibe una masa de polen sobre la cual la hembra pone un gran huevo único, antes de sellar con fibras de madera masticadas.


• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En una amplia variedad de hábitats ricos en flores.



**AMEGILLA ACRAENSIS** es común en África subsahariana. Esta abeja excavadora recorre grandes distancias para comer néctar de alta calidad de flores de larga corola tubular.



**LAS LARVAS** varían: pueden ser esbeltas o robustas, y pálidas o amarillas.



**MELECTA LUCTUOSA** es una abeja cuco que cría en nidos de abejas que pertenecen al género *Anthophora*. Se encuentra en Europa y en Asia.

**AMEGILLA COMBERI** es una abeja excavadora abundante en la India. Anida en el suelo y su larga lengua le permite alimentarse en flores de larga corola tubular.

Longitud 0,3–3 cm

Alimentación de la larva



Orden HYMENOPTERA

Familia APIDAE

N.º de especies 1.000

## ABEJAS MELÍFERAS Y AFINES

Los más conocidos son los robustos y peludos abejorros y las más pequeñas y esbeltas abejas melíferas. La mayoría de las hembras tienen una cesta de polen especial (el corbiculum) en la parte exterior de su tibia posterior. La coloración varía mucho.

• **CICLO VITAL** Son sociales y viven en colonias de una hembra ponedora, machos (zánganos), y hembras estériles u obreras que buscan comida y cuidan de las larvas. Los abejorros forman pequeñas colonias bajo o sobre el suelo. Los nidos están hechos de hierba con celdas de cera. Las colonias de abejas melíferas comprenden una reina, hasta 2.000 machos y miles de obreras. El nido es una serie de panales de cera de doble cara, divididos en celdas hexagonales. Las obreras utilizan un lenguaje de danza para comunicar la calidad del alimento, la dirección y la distancia.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo África subsahariana. Los abejorros son muy comunes en el norte templado. En hábitats ricos en flores y vegetación.

• **OBSERVACIÓN** Además de dar miel, cera y otros productos, estas abejas polinizan la mayoría de las plantas del mundo.



**LAS LARVAS** son pálidas y vermiformes. Las de abejorro son más gordas que las de abeja melífera.



• celdas hexagonales del panal hechas de cera

• obreras cuidando de las larvas

◁ **APIS MELLIFERA**, la Abeja melífera occidental, vive en todo el planeta y es el miembro más conocido del género de abejas melíferas *Apis*. Hacen falta millones de viajes entre las flores y el panal para llenar un tarro de miel.

**EUGLOSSA ASAROPHORA** es nativa de Panamá y Costa Rica. Los miembros de este género se conocen como abejas orquídea porque los machos usan para el cortejo aceites y resinas de orquídeas.

• coloración azul metálica brillante

• tibias posteriores expandidas



Δ **EUGLOSSA INTERSECTA** es nativa de Surinam, Guayana y norte de Brasil. Como muchas especies de *Euglossa*, tiene coloración brillante y metálica.

Alimentación de la larva

Longitud 0,3–3 cm

▷ Las especies del género **PSITHYRUS** están muy asociadas con los abejorros. Son abejas cuco que ponen sus huevos en los nidos de las especies de *Bombus*. Muchas abejas *Psithyrus* son parecidas a los abejorros, sobre todo a las especies que parasitan.



Δ **BOMBUS LUCORUM** es una especie de abejorro muy común. Construye su nido bajo tierra y es una de las primeras abejas que se observan a principios de verano en gran parte de Europa.



◁ **BOMBUS MONTICOLA** es un abejorro relativamente pequeño. Como su nombre indica, es común en las tierras altas y las zonas de montaña. Construye un nido en una madriguera subterránea, a menudo cerca de plantas de arándano.



Δ **BOMBUS TERRESTRIS**, el Abejorro terreno o zapador, se identifica por el extremo abdominal blancuzco de obreras y machos. Aquí se muestra una hembra estéril alimentándose en una flor.



Orden HYMENOPTERA	Familia BETHYLIDAE	N.º de especies 2.000
-------------------	--------------------	-----------------------

## BETÍLIDOS

Negras o parduzcas, estas avispas tienen la cabeza bastante alargada. Algunas hembras parecen hormigas; otras mutiladas (ver pág. 187). Ambos sexos pueden tener alas, pero las hembras son a menudo ápteras.

- **CICLO VITAL** Ponen huevos sobre larvas de escarabajo u orugas de mariposa —que han hallado o llevado paralizadas a un lugar resguardado. Algunas permanecen junto a las larvas mientras se desarrollan.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones cálidas. Donde haya huéspedes.



Las especies del género *BETHYLUS* tienen un aguijón muy potente que paraliza o mata.

cabeza grande en comparación con el tórax  
fémures robustos  
coloración negra

LAS LARVAS son pálidas y gruesas hacia atrás.

Longitud 0,4–2 cm; la mayoría menos de 1 cm

Alimentación de la larva ☹

Orden HYMENOPTERA	Familia CHRYSIDIDAE	N.º de especies 3.000
-------------------	---------------------	-----------------------

## CRISÍDIDOS

Se denominan avispas cuco en algunos idiomas porque roban las provisiones de las larvas de sus huéspedes, o avispas joya debido a su coloración, que es azul, verde o roja metálica o una combinación de estos colores. Su cuerpo duro las protege de los aguijonazos de abejas y avispas.

- **CICLO VITAL** La hembra encuentra un nido que contiene la larva de una abeja o avispa solitaria y pone un huevo en su interior. La larva come la larva del huésped desde el exterior, y sus provisiones.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En varios hábitats, donde encuentre a sus huéspedes.



lengua larga y tubular para chupar néctar  
estructuras grandes (como escamas) en la base olar  
hoyuelos muy marcados  
coloración verde metálica brillante  
casi todo el abdomen tiene un matiz rosado  
no todos los segmentos del abdomen se ven desde arriba

Δ **PARNOPE CARNEA** es europea. Los miembros de este género parasitan avispas solitarias cazadoras.

rostro convexo con fuertes mandíbulas  
cuerpo púrpura metálico brillante  
fémures oscuros  
abdomen anaranjado y verdoso en el extremo

coloración metálica brillante  
lábulo en las alas posteriores  
superficie dura y salpicada de hoyuelos  
extremo de color púrpura metálico

Las especies del género *CLEPTES* se hallan en el hemisferio norte. A menudo, el cuerpo no es metálico del todo.

LAS LARVAS son lisas y robustas. La mitad del cuerpo es la parte más ancha.

Longitud 0,2–2 cm; la mayoría menos de 1,2 cm

Alimentación de la larva ☹☹☹

Orden HYMENOPTERA	Familia COLLETIDAE	N.º de especies 2.000
-------------------	--------------------	-----------------------

## ABEJAS YESERAS Y ABEJAS DE CARA AMARILLA

Estas abejas suelen ser muy oscuras o negras. Los pelos del cuerpo son de color dorado pálido o blanco, y los pelos abdominales a menudo forman franjas.

- **CICLO VITAL** Las abejas yeseras cavan madrigueras en el suelo e impermeabilizan las celdas con una secreción abdominal. Las de cara amarilla anidan en tallos de plantas vacíos y en las galerías de insectos de la madera. Regurgitan polen y néctar en cada celda larval.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en el hemisferio sur. Comunes en las flores.
- **OBSERVACIÓN** Las yeseras transportan polen en sus patas posteriores, y las de cara amarilla en el buche.



cara en forma de corazón  
cuerpo liso  
abdomen a franjas negras y anaranjadas  
pelos blancos en los segmentos abdominales  
pelos blancos en las patas

Δ **HYLAEOIDES CONCINNA** es una abeja de cara amarilla con una marca facial rojiza.

< **COLLETES DAVIESANUS** es una abeja yesera nativa de Europa. Construye su nido en paredes verticales de acantilados de arena.

Longitud 0,3–1,8 cm

Alimentación de la larva ☹

Orden HYMENOPTERA	Familia DRYINIDAE	N.º de especies 1.000
-------------------	-------------------	-----------------------

## DRÍINIDOS

Los machos de estas avispas son alados. Las hembras pueden ser ápteras o parecidas a hormigas, con tarsos frontales en forma de garra.

- **CICLO VITAL** Las hembras pican a las ninfas o los adultos de ciertos hemípteros, y ponen un huevo en su interior. La larva se alimenta de los fluidos del huésped, se desarrolla en un saco larval que sobresale del cuerpo del huésped y emerge para pupar dentro de un capullo.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En varios hábitats, donde haya huéspedes.



gónatopus sepsoides es una avispa británica. Como es propio de su género, la hembra parece a una hormiga.

fémures anteriores alargados y engrosados en la parte central  
segmento tarsal como una garra  
pronoto más ancho que largo  
cuerpo como de hormiga  
pterostigma oscuro  
cuerpo negro brillante

Δ **CHELOGYNUS SCAPULARIS** es una avispa europea. Sus patas son amarillentas, con los fémures mucho más oscuros.

LAS LARVAS suelen ser pálidas y muy curvadas o tener forma de "U".

Longitud 0,2–1,2 cm; la mayoría menos de 0,8 cm

Alimentación de la larva ☹☹☹



Orden HYMENOPTERA

Familia FORMICIDAE

N.º de especies 9,000

## HORMIGAS

Viven en colonias de una docena a varios millones de individuos. Las que se ven con más frecuencia son las obreras, hembras estériles y ápteras. Las reinas reproductoras y los machos suelen tener alas. El segundo o el segundo y el tercer segmentos del abdomen forman una "cintura" que puede tener protuberancias o procesos espinosos. La mayoría varían de pardorrojizas a negras, pero también las hay amarillas y verdes. Se protegen mordiendo o picando o rociando ácido fórmico.

• **CICLO VITAL** Después de aparearse, los machos mueren y las hembras pierden las alas. Por lo general, una sola reina pone todos los huevos de la colonia. Las obreras se llevan y protegen los huevos y luego cuidan. Si las larvas hembra reciben una dieta proteínica, se transforman en reproductoras.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Todos los hábitats.

• **OBSERVACIÓN** Las hormigas son depredadoras o fitófagas importantes en muchos hábitats. En las sabanas africanas, comen mucha más carne que los leones, hienas y otros carnívoros. Algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas (género *Atta*) y la Hormiga de fuego (*Solenopsis invicta*) pueden ser plagas graves.



*OECOPHYLLA SMARAGDINA*, la Hormiga tejedora, construye refugios con hojas. Las obreras juntan los bordes de las hojas y otras obreras los adhieren con la seda producida por las larvas. La larva es sostenida entre las mandíbulas de la obrera y utilizada como una lanzadera.



**LAS LARVAS** son blancas, vermiformes y curvas. Puede haber pelos en el cuerpo.



*MEGAPONERA FOETENS* vive en África y depreda termites. Cuando encuentra presas, traza senderos de feromonas cuando regresa a reclutar más obreras.

▽ Las especies, del género *MYRMECIA*, u hormigas bulldog australianas, son muy grandes.



*DINOPONERA GRANDIS* es nativa de partes de Sudamérica. Las grandes obreras son cazadoras solitarias. Colonias pequeñas.



REINA

△ Las colonias de *DORYLUS NIGRICANS* pueden contener millones de hormigas, producidas por una sola reina. Cuando están en una fase nómada, las obreras transportan la progenie de la reina en sus mandíbulas.

▷ *DORYLUS NIGRICANS* es a menudo atraída por las luces de noche. Debe su nombre vulgar de "Mosca" salchicha a la forma del cuerpo de los machos.



MACHO



▷ *ATTA LAEVIGATA* es una de las cerca de 200 especies de hormigas cortadoras de hojas que viven en Sudamérica tropical. Las obreras llevan al nido trozos de hojas sobre los cuales crecen los hongos que les servirán de alimento.

▷ *FORMICA RUFA* es común en toda Europa. Es una importante depredadora en los bosques.



Longitud 0,1–2 cm

Alimentación de la larva:



Orden HYMENOPTERA	Familia HALICTIDAE	N.º de especies 3.500
-------------------	--------------------	-----------------------

## HALÍCTIDOS

Algunas especies se sienten atraídas por el sudor. La mayoría son pardas o negras, pero algunas tienen un brillo verde o azul metálico. El cuerpo puede tener depresiones u hoyuelos y ser bastante ralo. Muchas son solitarias. Otras son sociales en varios grados.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos dentro de redes construidas en el suelo o en madera descompuesta. Impermeabilizan las celdas en las que se incuban los huevos con una secreción que evita el crecimiento de hongos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Muy difundidas, sobre todo en zonas ricas en flores y en los linderos de terrenos forestales.



*HALICTUS QUADRICINCTUS* está difundida por el sur de Europa y la región mediterránea. Es una de las mayores especies europeas del género.



**LAS LARVAS** pueden tener protuberancias por encima, y espinas diminutas.

Longitud 4–5 mm; la mayoría menos de 10 mm

Alimentación de la larva ☼

Orden HYMENOPTERA	Familia MEGACHILIDAE	N.º de especies 3.000
-------------------	----------------------	-----------------------

## MEGAQUÍLIDOS

Suelen ser solitarios, con el cuerpo robusto, pardo oscuro o negro, y pueden tener marcas amarillas o pálidas; algunos son de color verde o azul metálico. Las especies recolectoras de polen lo llevan en un cepillo de pelos situado debajo del abdomen.

- **CICLO VITAL** La mayoría ponen sus huevos en nidos en cavidades naturales de madera muerta, tallos vacíos y conchas de caracol. Algunos tapizan las celdas con hojas o pétalos y otros con pelos de las hojas. Las abejas alfareras construyen celdas de arcilla bajo las piedras y en madrigueras. Algunas especies usan los nidos de otras abejas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats.
- **OBSERVACIÓN** Vitales para polinizar las cosechas, se llevan a veces en camión a los campos.



*CHALICODOMA MONTICOLA* anida en tallos vegetales vacíos (cañas de bambú) y construye los tabiques de sus celdas con barro o una mezcla de barro y resina.



**LAS LARVAS** son robustas y a menudo más gruesas por detrás.

Longitud 0,7–2 cm

Alimentación de la larva ☼

Orden HYMENOPTERA	Familia MUTILLIDAE	N.º de especies 5.000
-------------------	--------------------	-----------------------

## MUTÍLIDOS

Se llaman hormigas aterciopeladas porque las hembras tienen un pelo muy sedoso, son ápteras y parecen a hormigas. Los machos tienen las alas bien desarrolladas. Estas avispas son negras o pardorrojizas, con pintas o franjas de cortos pelos rojos, amarillos o plateados. Tienen toscos hoyuelos en el cuerpo.

- **CICLO VITAL** Las larvas comen larvas y pupas de otras avispas y abejas –las que hacen nidos en el suelo o en la madera o de papel–. Al hallar la celda de un huésped, la hembra la abre pero vuelve a sellarla si su larva es demasiado joven. Si está desarrollada o es una prepupa, pone un huevo sobre ella antes de sellarla. Al eclosionar, el mutílido devora al huésped y pupa en la celda.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones subtropicales y tropicales. Las hembras se ven a menudo en el suelo, en hábitats secos.
- **OBSERVACIÓN** Las hembras tienen aguijones muy poderosos.



MACHO



HEMBRA



**LAS LARVAS** tienen, de perfil, segmentos abdominales muy redondeados por encima.



HEMBRA



MACHO

◁ *MUTILLA EUROPAEA* está muy difundida por Europa. Parásita varias especies de abejorros (ver págs. 180-181).

◁ *SPHAEROPHTHALMA MELANCHOLICA* vive en Sudamérica. Pone sus huevos en los nidos de ciertas abejas y avispas –en el suelo y en tallos de plantas, respectivamente.

Longitud 0,3–2,5 cm

Alimentación de la larva ☼



Orden HYMENOPTERA

Familia POMPILIDAE

N.º de especies 4000

## POMPÍLIDOS

La mayoría son azules oscuros o negros, con las alas matizadas de amarillo oscuro, azul o negro. Son esbeltos y las patas posteriores son largas y espinosas. Los machos son más pequeños y más esbeltos. Algunas especies son muy grandes.


• **CICLO VITAL** Las hembras vuelan o corren por el suelo en busca de arañas. Deben luchar con sus presas, pero su fuerte veneno las paraliza incluso si son muy grandes. Luego las arrastran a un nido de barro en una grieta o bajo tierra, aunque algunas atacan a la araña en su propia madriguera. Antes de sellar el nido, la hembra pone un huevo único, por lo general sobre el abdomen de la araña. Algunas hembras lo hacen en una araña capturada por otra avispa antes de que ésta selle el nido; otras, abren nidos ya sellados.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en el trópico y el subtropico. En hábitats diversos, donde haya arañas.

• **OBSERVACIÓN** Su picadura suele ser muy dolorosa.




Δ Los machos del género *POMPILUS* (en la figura) tienen 12 artejos; las hembras 13. Hay seis segmentos visibles en el abdomen del macho y siete en el de la hembra.



*PEPSIS HEROS*, el "Gavilán" de las tarántulas, es la especie de mayor tamaño. Las hembras sobrevuelan el suelo, en busca de sus arañas presa.


Longitud 0,5–7 cm; la mayoría menos de 2,5 cm

Alimentación de la larva



Las especies del género *HEMPEPSIS* suelen vivir en Sudamérica y en el sudeste de Asia. Los machos suelen defender su territorio contra otros machos para tener éxito en la reproducción.

▽ *MACROMERIS VIOLACEUS*, que es nativa del sureste de Asia, debe su nombre a las alas purpúreas e iridescentes.



Δ Las especies del género *PRIOCNEMIS* viven sobre todo en el hemisferio norte. Este espécimen tiene el abdomen esbelto y las patas largas y espinosas.



**LAS LARVAS** son pálidas y vermiformes, más anchas por el centro.



Orden HYMENOPTERA

Familia SCOLIIDAE


N.º de especies 350

## ESCÓLIDOS

Avispas muy grandes, con el cuerpo grueso y robusto. Son negro azulados con marcas pardorrojizas. El extremo de las alas, que puede ser claro, ahumado, azul metálico o anaranjado, se ve finamente arrugado. El cuerpo tiene finos pelos oscuros o de color dorado. Los machos son más pequeños y más esbeltos que las hembras, con antenas más largas y gruesas. En ambos sexos, hay una muesca bien visible en el interior del margen del ojo.

• **CICLO VITAL** Después de aparearse, las hembras cazan entre la hojarasca o cavan en el suelo en busca de larvas de escarabeidos. Las paralizan con su picadura y ponen un huevo único en su exterior. Cuando la larva emerge, devora al huésped y pupa dentro de un capullo tosco que teje en torno a sus restos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en regiones tropicales. En diversos hábitats, donde haya escarabeidos.



EN DESCANSO

Longitud 1-5,6 cm


Alimentación de la larva



**LAS LARVAS** son gruesas y blancas, con una cabeza pequeña y parda con hoyuelos y pelos pequeños.



△ **SCOLIA HYALINA**, de Brasil, es típica de la familia y tiene una distintiva muesca en el borde interior del ojo. Los ocelos son propios del orden: tres ojos simples en disposición triangular en la parte alta de la cabeza.





Orden HYMENOPTERA

Familia SPHECIDAE

N.º de especies 8.000

## ESFÉCIDOS

Algunos excavan sus madrigueras en la arena, otros anidan en tallos de plantas, en la madera descompuesta, en suelos arcillosos en madrigueras de insectos, y otros no excavan el nido. Todos son solitarios y bastante lampiños, a menudo de colores brillantes y con formas variadas.

- **CICLO VITAL** La hembra captura un insecto o una araña, lo paraliza y se lo lleva a un nido donde lo entierra -junto con un huevo suyo- para que la larva tenga alimento al emerger. Puede haber uno o varios insectos, o bien la hembra puede ir llevándolos al nido. Unas pocas especies ponen sus huevos en el nido de otros esfécidos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats.



**LAS LARVAS** son ahusadas y blancas, con mandíbulas robustas.

▷ **CHLORION LOBATUM** vive en el sudeste de Asia. Parasita grillos, a los que arrastra hasta una madriguera, dentro de la cual pone un huevo antes de sellarla.



cuerpo y cabeza de color verde metálico

patas fuertes y espinosas



alas planas sobre el cuerpo

coloración verde azulada

antenas sensibles

Δ Las especies del género **AMPULEX** son cazadoras de cucarachas y pueden entrar en las casas en busca de sus presas. Es nativo de varias regiones tropicales.



marcas amarillas en el cuerpo

mandíbulas y patas potentes

gorgojo

la avispa pica al gorgojo en la cara inferior del abdomen



**CERCERIS ARENARIA** captura gorgojos y los paraliza con su aguijón. Luego lo entierra en su madriguera, donde la avispa pone entonces sus huevos.

**EDITHA MAGNIFICA**, de Brasil, tiene marcas muy brillantes y está especializado en la caza de mariposas, sobre todo de la familia Pieridae (ver pág. 177).

Longitud 0,4–4,8 cm

Alimentación de la larva 🐛🍷

Orden HYMENOPTERA

Familia TIPHIIDAE

N.º de especies 1.600


## TÍFIDOS

Son brillantes y su forma varía de bastante esbelta a robusta. Algunos tienen hembras ápteras que parecen hormigas.

- **CICLO VITAL** En el apareamiento, la hembra puede ser transportada en vuelo por el macho. Luego, ella paraliza huéspedes para sus larvas, en general larvas de escarabajos o cicindelas, y pone un huevo en su cuerpo.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Varios hábitats.



**LAS LARVAS** son alargadas, con protuberancias en la cara superior del abdomen.



patas fuertes para cavar

superficie brillante

**THYNNUS VENTRALIS** vive en Australia. Sus hembras son ápteras y sus larvas parasitan larvas de escarabeidos (ver pág. 128).

Longitud 0,5–2,8 cm

Alimentación de la larva 🐛🍷

Orden HYMENOPTERA

Familia VESPIDAE

N.º de especies 4.000

## VÉSPIDOS

Enrollan o pliegan sus alas en sentido longitudinal, en vez de llevarlas planas. Casi todos tienen una coloración advertidora en tonos de pardo o negro y anaranjado o amarillo. Los más conocidos son las avispas sociales, con nidos de fibras masticadas. Incluyen a las avispas alfareras, que hacen nidos tapizados de arcilla en tallos y grietas.

- **CICLO VITAL** Las avispas sociales tienen reinas y obreras, cooperan en el cuidado de la progenie y tienen varias generaciones simultáneas. La reina típica inverna, hace un nido en primavera y cría ella su primera progenie. En el nido, las larvas crecen en celdas de "panales" horizontales y las obreras, que son hembras estériles, les dan insectos masticados. A medida que la colonia crece, también lo hace el nido.

- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Varios hábitats.
- **OBSERVACIÓN** Como muchos insectos de este orden, la picadura de los véspidos es muy dolorosa.



alas plegadas en sentido longitudinal

**VESPUULA VULGARIS** es muy útil en el jardín ya que elimina orugas y otras plagas. Hace su nido con fibras de madera.

▷ **VESPUULA GERMANICA** vive en las regiones cálidas del planeta. Sus colonias pueden ser perennes, con más de una reina.



**LAS LARVAS** tienen el cuerpo más ancho a un tercio de distancia de la cabeza.



abdomen anaranjado

Δ **VESPA CRABRO**, el Avispón, hace su nido en árboles huecos. Sus colonias tienen sólo unos pocos centenares de obreras.

manchas amarillas en el tórax

puntos negros en el abdomen



Longitud 0,4–3,6 cm

Alimentación de la larva 🐛🍷



Orden	HYMENOPTERA	Familia	AGAONIDAE	N.º de especies	650
-------	-------------	---------	-----------	-----------------	-----

## AVISPAS DE LAS HIGUERAS

Los machos y hembras son muy distintos. Las hembras, diminutas y aplanadas, poseen alas. Los machos apenas parecen avispas: la mayoría son ápteros, con una cabeza de formas extrañas, unas patas intermedias débiles y el abdomen plegado bajo el cuerpo. Su nombre común se debe que estas avispas y las higueras o *Ficus* dependen unas de otras. Las higueras sólo pueden ser polinizadas por ellas que a su vez sólo se reproducen dentro de los higos. Cada especie poliniza una especie de *Ficus*.

• **CICLO VITAL** Puede ser complejo. En general, una hembra entra en un higo joven por un agujero, poliniza sus flores femeninas y pone un huevo en algunos de los óvulos. Las larvas se desarrollan allí y se alimentan de agallas producidas durante la puesta. Los machos suelen emerger antes que las hembras y aparearse con ellas antes de su emergencia, mordiendo la agalla para llegar hasta ellas. Entretanto, las flores masculinas en el interior del higo ya han producido polen que las hembras recogen al salir y transportan hasta la higuera vecina.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas en regiones tropicales, subtropicales y templadas cálidas. Donde crecen árboles del género *Ficus*.

• **OBSERVACIÓN** Algunas son parásitas de las larvas de otras avispas polinizadoras de higueras. No obstante, algunas de estas parásitas se clasifican en otras familias.

segmento basal de las antenas • cabeza aplanada • alas ausentes



**CERATOSOLEN MEGACEPHALUS** es una especie africana. Aquí se muestra a la hembra mientras pone sus huevos dentro de un higo. Ha perdido sus alas y los extremos de sus antenas en su empeño por entrar en el higo.

patas anteriores fuertes • cuerpo negro brillante • ovopositor



**BLASTOPHAGA PSENESES** vive en todo el planeta. Poliniza *Ficus carica*, la higuera común. Aquí se ve una hembra posada en un higo. Hay diez veces más hembras que machos.

**LAS LARVAS** son pequeñas, pálidas y vermiformes. Crecen en los higos.



• ovopositor muy largo  
• coloración azul verde metálica  
• tarsos pálidos

Las especies del género **SYCOSCAPTER** son parásitas y viven en África. Los recientes análisis con ADN indican que pueden pertenecer a la familia Pteromalidae (ver pág. 201).



Longitud 1–3 mm

Alimentación de la larva

Orden	HYMENOPTERA	Familia	BRACONIDAE	N.º de especies	25.000
-------	-------------	---------	------------	-----------------	--------

## BRACÓNIDOS

Muchos braconidos son pequeños y poco vistosos, de coloración parda, pardorrojiza o negra. Algunos tienen unos dibujos de venas muy tenues en las alas.

• **CICLO VITAL** Son parásitos y cada especie utiliza un huésped distinto: por lo general, orugas de mariposa, y también larvas de pulgones, moscas y otros insectos. Unos pocos son hiperparasitoides.

Las hembras ponen sus huevos sobre o dentro del huésped; si es grande, centenares de larvas de avispa pueden alimentarse de él. Las larvas que parasitan pulgones, que se encuentran en el follaje, los sujetan a la hoja con un capullo de seda. Estos pulgones momificados contienen la avispa en pupación. La avispa adulta hace un agujero muy pulcro en el cadáver y se aleja volando.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En una amplia variedad de hábitats, donde encuentre huéspedes.

• **OBSERVACIÓN** Muchas especies se utilizan para controlar las poblaciones de insectos plaga.



antenas largas • cabeza ancha y redondeada


• alas ahumadas

• abdomen azul metálico

• ovopositor

Δ Las especies del género **BATHYALAX** viven en África y el sudeste de Asia. Algunas sirven para controlar a las orugas que infestan los cereales.

**LAS LARVAS** son pálidas y vermiformes. Las especies se distinguen por detalles de las mandíbulas.



• antenas largas  
• franjas anchas en las alas

• color de fondo amarillo en las alas

• tibia posterior negra  
• tarsos posteriores negros

**ARCHIBRACON SERVILLEI** es común en África tropical. Aquí se muestra es un macho.

• mitad posterior negra

• ojos grandes y oscuros

• alas translúcidas

• parte posterior del tórax negra

• abdomen rojizo

• patas rojizas

▽ **PYGOSTOLUS STICTICUS** es una de las cinco especies similares que viven en el hemisferio norte, donde atacan gorgojos.



Longitud 0,2–1,6 cm; la mayoría menos de 0,7 cm

Alimentación de la larva



Orden HYMENOPTERA	Familia CHALCIDIDAE	N.º de especies 1.800
-------------------	---------------------	-----------------------

### CALCÍCIDOS

Suelen ser marrón oscuro, negro, rojo o amarillo. El cuerpo puede tener relieves o depresiones y, a veces, un brillo metálico. El primer segmento de la pata posterior es grande y los fémures posteriores están muy dilatados y denticulados por debajo. Las hembras tienen un ovopositor corto y poco conspicuo.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos dentro de larvas y pupas de insectos. Algunos son hiperparasitoides.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En diversos hábitats, dondequiera que se encuentren huéspedes adecuados.

**LAS LARVAS** son vermiformes, blancas y con la cabeza pequeña.

**CHALCIS SISPES** es nativa de partes de Europa y Asia. Sus larvas parasitan las de mosca acorazada (ver pág. 152).

Longitud 0,2–1,5 cm; la mayoría menos de 0,8 cm

Alimentación de la larva ☞

Orden HYMENOPTERA	Familia CYNIPIDAE	N.º de especies 1.250
-------------------	-------------------	-----------------------

### AVISPAS DE LAS AGALLAS

Son negras o pardorrojizo brillante, en general con alas bien desarrolladas. El tórax tiene un aspecto giboso y el abdomen de la hembra es aplanado.

- **CICLO VITAL** La hembra pone sus huevos dentro del tejido de varias especies de robles o de otras plantas leñosas. El huésped desarrolla una abultada agalla que protege y alimenta a las larvas. Las agallas varían mucho en tamaño, color, textura y localización y pueden contener una o más larvas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en el hemisferio norte. En muchos hábitats, donde haya árboles y las plantas huésped.
- **OBSERVACIÓN** Las agallas puede albergar comunidades de organismos, entre ellos avispas parásitas.

**ANDRICUS QUERCUSRADICIS** es una avispa muy extendida por Europa que usa distintos robles como huésped.

◁ Las especies del género **ANDRICUS** están muy difundidas por Europa. Muchas son muy similares.

**LAS LARVAS** son pálidas, vermiformes, lisas y ahuecadas hacia atrás.

superficie brillante y sembrada de hoyuelos

tórax grande

abdomen liso y brillante

Longitud 1–9 mm

Alimentación de la larva ☞

Orden HYMENOPTERA	Familia ENCYRTIDAE	N.º de especies 3.800
-------------------	--------------------	-----------------------

### ENCÍRTIDOS

Varían bastante sobre todo en el aspecto de la cabeza y las antenas. La mayoría son robustos, delgados o algo aplanados. Pueden ser anaranjados, rojos o pardos, a menudo con un brillo metálico. El tórax es convexo y las patas intermedias, que sirven para saltar, tienen un espón tibial grande y curvo.

- **CICLO VITAL** Suelen poner sus huevos en las ninfas y los adultos de otros insectos, por lo general cochinillas, pulgones y mosquitos blancos. Algunas parasitan orugas o larvas de gorgojo. Unas pocas son hiperparasitoides. A veces, los huevos se dividen varias veces para producir entre 10 y 2.000 larvas según el tamaño del huésped. Las larvas pupan dentro del huésped.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, donde haya huéspedes.
- **OBSERVACIÓN** Son importantes agentes de control biológico y muchos se han usado contra graves plagas de los cultivos. *Copidosoma koehleri*, por ejemplo, sirve para controlar la Mariposa del tubérculo de la patata en la India.

Las especies del género **COPIDOSOMA** viven en partes de Europa y de Asia. Sus huéspedes son varias mariposas nocturnas, entre ellas algunas de la familia Noctuidae (ver pág. 165).

**LAS LARVAS** varían, pero muchas son pálidas y se ahúsan hacia atrás.

Longitud 0,5–4,5 mm; la mayoría 1–2 mm

Alimentación de la larva ☞

Orden HYMENOPTERA	Familia EULOPHIDAE	N.º de especies 3.400
-------------------	--------------------	-----------------------

### EULÓFIDOS

Estas pequeñas avispas varían de alargadas a rechonchas. Son lisas y las antenas tienen menos de diez artejos. Pueden ser amarillas, pardas o negras, a veces con brillo metálico.

- **CICLO VITAL** Las hembras suelen cazar larvas minadoras de hojas y formadoras de agallas dentro de las cuales ponen sus huevos. Algunas atacan las larvas o las pupas de mariposas, escarabajos, moscas y hemípteros. Otras usan huevos de insectos como huésped, y unas pocas son hiperparasitoides. La larva devora el huésped y pupa.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, donde haya huéspedes.
- **OBSERVACIÓN** Muchos se usan en programas específicos de control biológico contra insectos plaga.

**LAS LARVAS** son pálidas y vermiformes, rechonchas y con la cabeza pequeña.

**TETRASTICUS GALACTOPUS** es hiperparasitoide. Ataca las larvas de la avispa parásita *Cotesia glomeratus*, que se halla dentro del cuerpo de su huésped, la Mariposa blanca de la col.

Longitud 0,5–5 mm; la mayoría 1–3 mm

Alimentación de la larva ☞



Orden HYMENOPTERA	Familia EURYTOMIDAE	N.º de especies 1.400
-------------------	---------------------	-----------------------

## EURITÓMIDOS

Son amarillos, rojizos o de color negro apagado. Unos pocos tienen un brillo metálico. Se parecen a los calcídidos (ver pág. 196), pero sin las coxas posteriores engrosadas y sin proyecciones en los fémures.

• **CICLO VITAL** Muchos ponen sus huevos dentro de semillas, donde se desarrollan las larvas. Algunas son minadoras de hojas o formadoras de agallas. Otras parasitan escarabajos, avispas o larvas de mosca, y las más pequeñas atacan los huevos de los saltamontes o de ciertos hemípteros. Unas pocas parasitan al principio los insectos formadores de agallas y luego, al crecer, devora los tejidos de la agalla.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Muchos hábitats.



*SYCOPHILA BIGUTTATA* se desarrolla en agallas producidas por cinípidos en robles y encinas. Las larvas son parásitas de las que forman agallas.



*EURYTOMA BRUNNIVENTRIS* está asociada con avisas formadoras de agallas. Sus larvas parasitan las avisas u otros insectos del interior de la agalla y comen su tejido.



**LAS LARVAS** son diminutas, blancas y vermiformes. Algunas con pelos.

Longitud 2–6 mm

Alimentación de la larva

Orden HYMENOPTERA	Familia GASTERUPTIDAE	N.º de especies 500
-------------------	-----------------------	---------------------

## GASTERÚPTIDOS

Esbeltos y de colores oscuros son muy parecidos a los icneumonídeos pero tienen un corto cuello y el abdomen se une al tórax muy por encima de las coxas posteriores. Las patas posteriores son largas y sus tibias están abultadas en la punta. El ovopositor puede ser muy largo.

• **CICLO VITAL** Después de aparearse, las hembras buscan nidos de avisas o abejas solitarias en el suelo o dentro de tallos o madera para poner sus huevos. Sus larvas se comen los huevos y el alimento de la larva huésped.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en zonas cálidas. En diversos hábitats, donde haya huéspedes.

• **OBSERVACIÓN** Los gasterúptidos tienen un vuelo cernido distintivo, con las patas posteriores bamboleándose bajo el cuerpo.



Las especies del **GASTERUPTION** se ven alimentándose en las flores a la luz del sol.



**LAS LARVAS** pueden ser bastante peludas con tres dientes en las mandíbulas.

ovopositor muy largo y fino

Longitud 1,2–2,8 cm

Alimentación de la larva

Orden HYMENOPTERA	Familia ICHNEUMONIDAE	N.º de especies 60.000
-------------------	-----------------------	------------------------

## ICNEUMÓNIDOS

Por lo general esbeltas, estas avisas pueden ser de pardo amarillentas a negras, y tener un dibujo pardo y negro o amarillo y negro. El delgado abdomen suele estar unido al tórax por un fino pedúnculo. El ovopositor suele ser largo y muy visible, aunque es corto en algunas especies.

• **CICLO VITAL** Las

hembras suelen atacar larvas y pupas de escarabajos, moscas, mariposas, avisas portasierra y otras avisas. Algunas especies usan

arañas. Con sus largos ovopositores, ponen sus huevos sobre o dentro del huésped.


• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en zonas templadas. En muchos hábitats donde existen los huéspedes.

• **OBSERVACIÓN** Muchos son beneficiosos al controlar las poblaciones de otros insectos.

**LAS LARVAS** son pálidas. En algunas, la cola se acorta con la edad.



ovopositor largo para perforar madera o penetrar en madrigueras




Las especies del género *PARACOLLYRIA* son nativas de África. Su coloración brillante, como de avispa, es advertidora y es mimetizada por otros insectos.

*JOPPA ANTENNATA* tiene los artejos antenales abultados y una coloración contrastada, como de avispa.




*Δ RHYSSA PERSUASORIA* es de gran tamaño y parasita las larvas de los sírfidos (ver pág. 205) mientras éstas se alimentan de madera.





Longitud 0,3–4,2 cm


Alimentación de la larva



Orden HYMENOPTERA	Familia MYMARIDAE	N.º de especies 1.400
<b>MIMÁRIDOS</b> Incluye los insectos voladores más pequeños del mundo. Son de color pardo oscuro, negro o amarillo, pero nunca metálicos. Las estrechas alas anteriores no tienen dibujos de venas conspicuos pero sí unas orlas de pelos. Las alas posteriores, con pedúnculos y en forma de correa, están también orladas con pelos diminutos. <b>• CICLO VITAL</b> Las hembras parasitan los huevos de otros insectos. La mayoría se especializan en los huevos de cicadélidos y otros hemípteros, pero también parasitan otros insectos. <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En muchos hábitats, donde haya huéspedes. <b>• OBSERVACIÓN</b> Varias especies sirven para controlar insectos plaga.		
		
<b>ANAGRUS OPTABILIS</b> es un parasitoide especialista de los huevos de ciertos hemípteros (Delphacidae). Especies emparentadas sirven para controlar las cigarrillas que atacan el arroz.		
Longitud 0,2–5 mm; la mayoría 0,5–1,5 mm		
Alimentación de la larva (A)		

Orden HYMENOPTERA	Familia PROCTOTRUPIDAE	N.º de especies 500
<b>PROCTOTRÚPIDOS</b> La mayoría son de coloración muy oscura o negra y de superficie lisa. El abdomen está ahusado en ambos extremos y es a menudo más pálido que el tórax y la cabeza. Hay un pterostigma conspicuo en las alas anteriores bastante grandes. <b>• CICLO VITAL</b> Las hembras ponen los huevos dentro de larvas de escarabajos, y veces de mosquitos de las agallas, que viven en la hojarasca o la madera en descomposición. La larva desarrollada hace un agujero en la membrana entre los dos segmentos abdominales de su huésped y emerge casi por completo. Pupa con su extremo posterior en contacto con los restos del huésped. <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En terrenos arbolados y una amplia gama de hábitats húmedos.		
		
<b>EXALLONYX LONGICORNIS</b> está muy difundida en Europa y Asia, donde parasita larvas de estafilínidos (ver pág. 130).		
Longitud 0,3–1 cm; la mayoría menos de 0,8 cm		
Alimentación de la larva (A)		

Orden HYMENOPTERA	Familia PTEROMALIDAE	N.º de especies 4.000
<b>PTEROMÁLIDOS</b> Suelen ser de delgados a bastante robustos, negros, azules o verde metálico, pardoverdosos o pardoamarillentos. El tórax suele tener hoyuelos. De lado, el liso abdomen suele ser triangular en las hembras y oblongo en los machos. <b>• CICLO VITAL</b> Varía bastante. Las larvas pueden ser endo- o ectoparasitoides, o hiperparasitoides y la mayoría parasitan larvas o pupas de moscas, escarabajos, avisas, pulgas y mariposas. Las hembras pueden tener que horadar el tejido vegetal para llegar hasta los huéspedes formadores de agallas, minadores de hojas o de tallos. Algunas ponen un huevo; otras, centenares, si el huésped es grande. <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En muchos hábitats, donde haya huéspedes. <b>• OBSERVACIÓN</b> Algunas especies controlan las plagas dañinas de los cultivos.		
		
Las especies de <b>PTEROMALUS</b> son parasitoides comunes. Sus larvas se desarrollan dentro de las larvas y pupas de muchos insectos.		
Longitud 1–8 mm; la mayoría menos de 5 mm		
Alimentación de la larva (A)		

Orden HYMENOPTERA	Familia SCELIONIDAE	N.º de especies 3.000
<b>ESCELIÓNIDOS</b> Estas avisas suelen ser negras, aunque algunas son amarillas o pardas. Son de bastante esbeltas a bastante robustas, y el abdomen suele ser aplanado, con vértices muy angulosos a los lados. <b>• CICLO VITAL</b> Las hembras suelen poner sus huevos en los de otros insectos, sobre todo lepidópteros, hemípteros, coleópteros y ortópteros. Algunas especies se pegan al insecto huésped hasta que aova. Para evitar que otra avispa ponga sus huevos en un huevo que han parasitado, las hembras lo marcan con su olor. Al emerger, la larva devora el huésped y pupa dentro de él. <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Muy difundidos en muchos hábitats, pero sobre todo en herbazales abiertos. Algunos son parásitos especializados de mantis y saltamontes en zonas semiáridas y desiertos. <b>• OBSERVACIÓN</b> Son parásitos de algunas plagas de los cultivos y varias especies se emplean para controlarlas.		
		
<b>TRIMORUS PEDESTRE</b> se encuentra en Europa y Asia. Ambos sexos son ápteros. Esta especie no tiene necesidad de volar, ya que parasita huevos de carábidos.		
Longitud 0,05–1 cm; la mayoría menos de 3 mm		
Alimentación de la larva (A)		



Orden HYMENOPTERA	Familia TORYMIDAE	N.º de especies 1.250
-------------------	-------------------	-----------------------

## TORÍMIDOS

Estas avispas suelen ser alargadas, con una coloración azul o verde. El tórax está sembrado de hoyuelos, mientras que el abdomen es liso.

- **CICLO VITAL** La mayoría parasitan moscas y avispas formadoras de agallas. A veces, las hembras barrenan la agalla con su ovopositor y ponen sus huevos en la larva huésped del interior. Otras parasitan orugas, ootecas de mantis y larvas de abejas y avispas. Las herbívoras se desarrollan en las semillas de varios árboles.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, donde haya huéspedes apropiados.

Entre las especies de *TORYMUS* figuran muchas avispas que buscan larvas en agallas. El ovopositor es a menudo muy largo.

Las antenas perciben vibraciones del interior de la agalla.

Las larvas son pálidas, vermiformes y a menudo peludas.

Longitud 0,1–1,4 cm; la mayoría menos de 0,5 cm

Alimentación de la larva

Orden HYMENOPTERA	Familia TRICHOGRAMMATIDAE	N.º de especies 600
-------------------	---------------------------	---------------------

## TRICOGRAMÁTIDOS

Son avispas muy pequeñas. La mayoría son pálidas y bastante robustas. Las alas carentes de venas tienen unos pelos pequeños que forman unas líneas características y una orla alrededor.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos dentro de los huevos de muchos otros insectos. El desarrollo larval y la pupación pueden tardar sólo tres días.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, donde haya huevos de insectos —por lo general a la vista, en el follaje.

Las larvas son ceras diminutas, pálidas y se hallan en los huevos del huésped.

*TRICHOGRAMMA SEMBLIDIS*, como otras especies emparentadas, sirve para controlar muchas mariposas plaga. Aquí, los huevos parasitados son los de la *Sialis* común (*Sialis lutaria*).

Longitud 0,3–1,2 mm

Alimentación de la larva

Orden HYMENOPTERA	Familia ARGIDAE	N.º de especies 800
-------------------	-----------------	---------------------

## ÁRGIDOS

Son robustos, negro y rojo o amarillo. Algunos con brillo metálico. El último artejo es largo y en los machos tiene forma de "V" o de "Y".

- **CICLO VITAL** Algunos ponen sus huevos en los tejidos de árboles y arbustos, y la mayoría de larvas se alimentan en el follaje. Pupan en un capullo de seda.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones tropicales, y templadas. Donde haya plantas y árboles huéspedes.
- **OBSERVACIÓN** Unos pocos son plagas de rosales y manzanos.

*ARGE CILIARIS*, una avispa portasierra europea, es una de las 200 especies de este género. Sus larvas comen filipéndulas.

Las larvas parecen orugas.

*ARGE PAGANA* suele poner sus huevos en los rosales. Es común en gran parte de Europa y Asia, hasta Japón.

Longitud 0,4–1,6 cm

Alimentación de la larva

Orden HYMENOPTERA	Familia CEPHIDAE	N.º de especies 150
-------------------	------------------	---------------------

## CÉFIDOS

Estas avispas portasierra son esbeltas y alargadas. Muchas especies son de color negro, con marcas torácicas y franjas abdominales amarillas.

- **CICLO VITAL** Las hembras suelen poner un solo huevo dentro de tallos de hierbas, arbustos y árboles huéspedes. Las larvas los barrenan y pupan en su interior, dentro de un capullo.
- **DISTRIBUCIÓN** En el hemisferio norte. En pastizales, prados y cereales.

Las especies de *CEPHUS* son esbeltas, con antenas de 16 a 30 artejos. Las larvas minan plantas y pueden dañar los cereales.

*HARTIGIA LINEARIS*, como el resto del género, horada los tallos de los rosales.

Las larvas son ceras con patas torácicas rudimentarias y sin propodios.

Longitud 0,4–2,6 cm; la mayoría menos de 1,4 cm

Alimentación de la larva




Orden HYMENOPTERA	Familia CIMBICIDAE	N.º de especies 150
-------------------	--------------------	---------------------

## CIMBÍCIDOS

Estas avispas portasierra parecen abejas lampiñas. Muchas son gruesas, con el abdomen algo aplanado. Suelen ser negras o amarillentas y negras. Tienen menos de 7 artejos, el último engrosado.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en plantas huésped. Las larvas comen hojas y pupan en un capullo.
- **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte, Sudamérica y este de Asia. Dondequiera que se encuentren las plantas huésped.

*CIMBEX FEMORATUS*, británica, es de cuerpo grueso y las larvas comen abedules.



antenas en forma de maza

abdomen algo aplanado

*Δ PACHYLOSTICA VIOLA* es de Sudamérica. Sus larvas probablemente comen hojas de árboles.

LAS LARVAS son curvas, con patas torácicas y propodios abdominales.

Longitud 2-3 cm

Alimentación de la larva


Orden HYMENOPTERA	Familia PAMPHILIDAE	N.º de especies 200
-------------------	---------------------	---------------------

## PANFÍLIDOS

Estas avispas portasierra tienen la cabeza ancha y el cuerpo aplanado. La mayoría son robustas y negras con márgenes amarillos.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en tejidos vegetales. Las larvas comen bajo redes de seda o en el follaje, solas o en grupos.
- **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte. En árboles y arbustos.

*ACANTHOLYDA POSTICALIS* vivía sólo en bosques de pino escocés pero hoy habita en plantaciones de coníferas más al sur.



cabeza ancha

cuerpo aplanado

LAS LARVAS no tienen propodios.

Longitud 1-1,5 cm

Alimentación de la larva


Orden HYMENOPTERA	Familia PERGIDAE	N.º de especies 350
-------------------	------------------	---------------------

## PÉRGIDOS

Son robustos, con el abdomen redondeado. Las antenas pueden ser simples, ramificadas o en forma de sierra.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en tejidos vegetales. Las larvas comen en grupos sobre el follaje. Producen sustancias químicas como defensa.
- **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio sur salvo África. Donde haya árboles huésped, sobre todo eucaliptos.
- **OBSERVACIÓN** En Australia, algunos infestan eucaliptos.

*PERGA DORSALIS* es una especie australiana cuyas larvas pueden ser graves plagas de los eucaliptos.



las antenas acaban en pequeñas mazas

marcas naranjas

borde de ataque del ala anterior oscuro

tórax robusto

LAS LARVAS, con cortos propodios, pueden tener un color advertidor.

Longitud 0,4-2,5 cm

Alimentación de la larva


Orden HYMENOPTERA	Familia SIRICIDAE	N.º de especies 100
-------------------	-------------------	---------------------

## AVISPAS DE LA MADERA

Estas grandes avispas portasierra, con una púa de la punta del abdomen, son pardorrojizas, negras y amarillas, o púrpura azulado metálico.

- **CICLO VITAL** Las hembras barrenan la madera de los árboles vivos o caídos para poner un huevo cada vez e infectarlos con un hongo productor de roya. Las larvas se alimentan del hongo y de la madera. Pupan en un capullo de seda y de madera masticada.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En terrenos coníferas y de caducifolias.

*Δ TREMEX COLUMBA* está muy difundida por Norteamérica. Sus larvas horadan la madera de los arces y robles.



cabeza más ancha detrás de los ojos


alas pardo ahumado

franjas abdominales negras

parte posterior del abdomen negra, con una púa anaranjada

ovopositor

*Δ SIREX NOCTILIO* vive en el hemisferio norte. Sus larvas horadan las coníferas. La hembra se muestra aquí; los machos son menos metálicos y tienen el abdomen rojo anaranjado.



cabeza ancha detrás de los ojos

ojo


coloración azul púrpura brillante

matiz parduzco en los márgenes externos de las alas

coloración púrpura mate

púa terminal

*▽ UROCERUS GIGAS*, la Sírice gigante, aunque parezca peligrosa, es inofensiva. Las hembras se observan con frecuencia pero los machos son más difíciles de ver.



mancha grande y amarilla detrás de cada ojo

cuerpo grande, negro y amarillo

púa terminal

ovopositor

Longitud 2-4 cm

Alimentación de la larva



Orden	Hymenoptera	Familia	Tenthredinidae	N.º de especies	6.000
-------	-------------	---------	----------------	-----------------	-------


## TENTREDÍNIDOS

Estas avispas portasierra varían mucho en aspecto y hábitos. Pueden ser pardas, negras o verdes, de colores brillantes o parecidas a avispas. Los sexos pueden tener coloraciones distintas.

• **CICLO VITAL** Las hembras horadan con el ovopositor las hojas, ramitas y brotes de las plantas huésped y ponen los huevos dentro. Las larvas se alimentan en el exterior y son solitarias y con una coloración de camuflaje, o gregarias y con una coloración advertidora. Algunas minan hojas o forman agallas. Pupan en un capullo de seda, bajo tierra o en la hojarasca.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas salvo Nueva Zelanda; en regiones norteañas y templadas frías. En jardines, pastos y terrenos arbolados.

• **OBSERVACIÓN** Muchas especies son graves plagas de frutales y verduras y de árboles forestales.



Δ *DOLERUS TRIPLICATUS* es una especie europea. Sus larvas se alimentan de las hojas de juncos del género *Juncus*.



< *TENTHREDO SCROPHULARIAE* mimetiza a las avispas y vive en Europa y Asia. Sus larvas comen gordolobo y escrofularia.



LAS LARVAS suelen parecer orugas, con cabeza redonda y propodios.

Las especies del género *TENTHREDO* son grandes depredadoras muy agresivas de adultas. Son rojas, pardas, amarillas o negras.

Longitud 0,3–2,2 cm; la mayoría menos de 1,6 cm

Alimentación de la larva

# HEXÁPODOS NO INSECTOS

## COLÉMBOLOS

**E**L ORDEN DE LOS COLÉMBOLOS contiene 18 familias y 6.500 especies. Tienen en la cara inferior del abdomen un tubo ventral para el mantenimiento del equilibrio salino e hídrico y que, en algunas especies, sirve para aferrarse a las superficies lisas. Poseen un órgano saltador (fúrcula), que puede plegarse bajo el abdomen, donde engrana con un cierre. La acción muscular al

liberar la fúrcula puede proyectarlos lejos de los depredadores.

Los machos depositan su esperma en el suelo o en la abertura genital de la hembra. Son adultos tras 5 a 13 mudas, pero continúan mudando hasta que mueren. Los colémbolos son vitales en las cadenas alimentarias del suelo, donde puede haber centenares de miles en un solo metro cuadrado.

Orden	COLEMBOLA	Familia	ENTOMOBRYIDAE	N.º de especies	1.400
-------	-----------	---------	---------------	-----------------	-------

## ENTOMOBRIÍDOS

Su coloración varía del amarillo pálido al pardo o el negro. Algunos tienen dibujos o están moteados. Son alargados, con un pronoto pequeño, y en muchos el cuarto segmento abdominal es mayor que el tercero. Las antenas pueden medir más del doble que el cuerpo.

• **CICLO VITAL** Aovian en el suelo o en la hojarasca. Comen filamentos de hongos o materia vegetal descompuesta.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En hojarasca, suelo y hongos, en muchos hábitats. Algunos, en cuevas.



Las especies de *ENTOMOBRYA* abundan sobre la corteza y en piedras y rocas. Algunas pasan todo el invierno sobre la corteza arbórea.

Longitud 1–8 mm; la mayoría menos de 5 mm

Alimentación

Orden	COLLEMBOLA	Familia	ISOTOMIDAE	N.º de especies	1.000
-------	------------	---------	------------	-----------------	-------

## ISOTÓMIDOS

Estos colémbolos pueden ser blancos, amarillos, verdes o pardos, y la superficie superior suele ser más oscura que la inferior. Los segmentos del abdomen son casi iguales en tamaño.

• **CICLO VITAL** Los machos depositan espermatozoides redondeados en el suelo y las hembras los introducen en su abertura genital. Unos pocos isotómidos son partenogenéticos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En varios tipos de suelo y en torno a charcas y arroyos. Unas pocas especies abundan en desiertos, regiones polares y montañas.



*ISOTOMA VIRIDIS* es abundante entre la hojarasca y las matas de musgo. El tubo ventral y el órgano saltador curvo son claramente visibles en este espécimen.

Longitud 1–8 mm; la mayoría menos de 5 mm

Alimentación



Orden COLLEMBOLA	Familia NEANURIDAE	N.º de especies 1.000
------------------	--------------------	-----------------------

## NEANÚRIDOS

Suelen ser más largos que anchos, pero algunas especies son rechonchas o incluso aplanadas. Muchas son de color azul, gris o rojo y unas pocas tienen franjas de colores. El cuerpo puede ser liso o bien tener pelos romos o protuberancias de coloración brillante.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en o bajo el suelo, la hojarasca, el estiércol, las piedras, la madera muerta y la corteza. Las larvas se parecen a los adultos y siguen mudando después de madurar.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En diversos hábitats, bajo las piedras y la corteza, en la hojarasca, el suelo, el estiércol y la madera en descomposición.

• **OBSERVACIÓN** La especie de color azul oscuro *Anurida maritima* abunda en las costas del hemisferio norte, donde come los restos de artrópodos muertos y caracoles. Sobrevive escondiéndose dentro de bolsas de aire que se forman entre las rocas en la marea alta.



*NEANURA MUSCORM* se halla en todo el planeta, en terrenos arbolados, bajo la madera en descomposición y en el suelo. Produce sustancias químicas para disuadir a las arañas.

Longitud 0,2–1 cm	Alimentación
-------------------	--------------

Orden COLLEMBOLA	Familia ONYCHIURIDAE	N.º de especies 600
------------------	----------------------	---------------------

## COLÉMBOLOS CIEGOS

Suelen ser esbeltos y pálidos o blancos. Unas pocas especies son de color gris azulado o algo rojizo. Como indica su nombre común, carecen de ojos en su mayoría. No tienen fúrcula, aunque algunas especies tienen vestigios. El cuerpo posee unos pocos poros de pared fina en la cutícula de la mayoría de segmentos, que segregan un líquido desagradable que disuade a los depredadores.

• **CICLO VITAL** Ponen los huevos en el suelo, la hojarasca, la madera muerta y los hongos. Las ninfas se parecen a los adultos y la muda continúa después de alcanzar la madurez sexual.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En bosques y pastos, en cuevas y zonas alpinas e incluso en el Ártico. En el suelo, hojarasca, madera en descomposición y carpóforos de hongos.



Las especies de *ONYCHIURUS* viven el suelo. Algunas pueden encontrarse en hábitats costeros marinos.

Longitud 2–9 mm; la mayoría menos de 4 mm	Alimentación
---	--------------

Orden COLLEMBOLA	Familia PODURIDAE	N.º de especies 1
------------------	-------------------	-------------------

## COLÉMBOLO ACUÁTICO

La única especie de esta familia –*Podura aquatica*– es común y diminuta. Su coloración varía del pardo o pardorrojizo al azul oscuro o negro. Su fúrcula está muy bien adaptada a la vida en el agua. Es bastante plana y alargada y llega hasta el tubo ventral del abdomen (que ayuda a adherirse a la superficie del agua).

• **CICLO VITAL** Pasa gran parte de su vida comiendo detritos sobre el agua. Pone sus huevos entre la vegetación en y en torno a las masas de agua.

• **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte. En la superficie de las aguas dulces, en acequias, estanques, canales y zonas pantanosas.

• **OBSERVACIÓN** La fúrcula es muy larga en esta especie porque, para poder saltar con eficiencia, debe mantener una gran superficie en contacto con la película elástica que existe en la superficie del agua.

patas más pálidas que el cuerpo  
muchos individuos agrupados en una zona protegida del estanque



*PODURA AQUATICA* está bien adaptado a la vida en el agua. Se encuentra incluso en charcas temporales, en verano, y pueden congregarse tantos que la charca se ve de color oscuro.

Longitud Hasta 2 mm	Alimentación
---------------------	--------------

Orden COLLEMBOLA	Familia SMINTHURIDAE	N.º de especies 900
------------------	----------------------	---------------------

## COLÉMBOLOS GLOBULARES

Son de marrón pálido a oscuro o verdes, y todos son esféricos. La segmentación del abdomen no es aparente y las antenas son largas y acodadas. Los sexos son a menudo distintos.

• **CICLO VITAL** Muchos machos cogen a las hembras con las antenas en el apareamiento. Éstas ponen sus huevos en el suelo, en pequeñas series, y el desarrollo hasta la madurez sexual puede durar tan poco como un mes. Existen ciertas pruebas de cuidados maternos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, en árboles, hojarasca y carpóforos de hongos y en acequias, ciénagas y charcas. También en lugares muy húmedos como cuevas.

• **OBSERVACIÓN** Algunas especies son plagas importantes de las plántulas de los cultivos. *Sminthurus viridis*, que a veces se denomina Pulga de la alfalfa, es una plaga muy difundida de esta planta y de algunas verduras; en una ocasión, se registraron 70.000 colémbolos globulares en apenas un metro cuadrado de pastos.

cuerpo esférico y pálido  
conspicuos ojos oscuros  
antenas largas y distintivas



*SMINTHURIDES AQUATICUS* está muy difundido en la superficie de charcas y otras aguas estancadas pero no se congregan tantos como el Colémbolo acuático.

Longitud 1–3 mm	Alimentación
-----------------	--------------



## PROTUROS

**L**OS MIEMBROS DEL ORDEN de los proturos, que contiene 4 familias y 400 especies, viven en el suelo. El primer espécimen se descubrió en 1907.

Estos diminutos animales carecen de ojos y de antenas, aunque hay un par de manchas diminutas a cada lado de la cabeza que podrían ser vestigios de antenas. En lugar de las antenas, las dos patas anteriores son órganos sensoriales. Las patas intermedias y posteriores se usan para andar. Como los colémbolos (ver págs. 207-209) y los dipluros (ver pág. 211), tienen piezas bucales perforadoras-chupadoras que guardan dentro de una bolsa y que proyectan hacia

fuera cuando se alimentan. Las mandíbulas son afiladas y en forma de vara. Los tres primeros segmentos abdominales pueden mostrar vestigios de estructuras tipo pata. No presentan cercos.

Durante el apareamiento, el macho transfiere indirectamente su esperma, al depositar en el suelo un espermatóforo que la hembra recoge con sus genitales. Cuando salen del huevo, las larvas tienen ocho segmentos en el abdomen y un segmento caudal (telson). Tras la tercera muda, tienen ya su dotación completa de once segmentos abdominales, además del telson, pero faltan otras dos mudas para que maduren.

Orden PROTURA	Familia EOSENTOMIDAE	N.º de especies 90
---------------	----------------------	--------------------


### EOSENTÓMIDOS

Pálidos y blandos, tienen la cabeza cónica y el cuerpo alargado. Las patas no sobresalen mucho, lo que les permite pasar fácilmente a través de diminutas grietas. Las patas anteriores son más robustas que las intermedias y las posteriores, y tienen pelos y otros órganos sensoriales. Hay espiráculos visibles en los segmentos posterior e intermedio del tórax.

• **CICLO VITAL** Los huevos son redondos y con dibujos, o bien tienen verrugas.

La puesta suele hacerse en el suelo o en la hojarasca. Las larvas parecen pequeños adultos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, sobre todo, húmedos y frescos. Numerosos en el suelo, la hojarasca, el musgo, el humus y la madera muerta.



*EOSENTOMON DELICATUM* es nativo de Europa pero el género en su totalidad se distribuye por todo el planeta. Esta especie vive en suelos gredosos.



Las especies del género *EOSENTOMON* suelen vivir cerca del suelo o en la hojarasca.

Longitud 0,5–2 mm

Alimentación

## DIPLUROS

**H**AY 9 FAMILIAS Y 800 ESPECIES en el orden de los dipluros. Estos hexápodos de color pálido tienen el cuerpo blando, carecen de ojos y presentan dos cercos abdominales que pueden ser largos o en forma de pinzas. No deberían confundirse con los colémbolos verdaderos (ver pág. 46). Tienen largas antenas y unas piezas mordedoras dentro de una bolsa. Los machos depositan espermató-

foros pedunculados que las hembras introducen en su abertura genital. La puesta se efectúa en series y las hembras pueden vigilarlas.

Viven en la vegetación en descomposición, en los montones de compost y en el suelo, así como bajo las piedras y la madera. Con su cuerpo esbelto y flexible y sus patas fuertes, pueden moverse por el suelo con facilidad.

Orden DIPLURA	Familia CAMPODEIDAE	N.º de especies 200
---------------	---------------------	---------------------

### CAMPODEIDOS

Son blancos o amarillentos con cercos largos y multisegmentados y proyecciones de soporte bajo el abdomen. Respiran por unos espiráculos del tórax.

• **CICLO VITAL** Suelen poner sus huevos en el suelo. Inicialmente inmóviles las larvas van volviéndose más activas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Diversos hábitats, como cuevas. Abundan bajo el suelo; también viven bajo la corteza en madera en descomposición y en la vegetación.

*CAMPODEA FRAGILIS* es una especie común en Europa y Asia, que vive en la vegetación descompuesta.

cercos largos y distintivos

coloración pálida



Longitud 0,4–1,2 cm

Alimentación

Orden DIPLURA	Familia JAPYGIDAE	N.º de especies 200
---------------	-------------------	---------------------

### JAPÍGIDOS

Son pálidos, esbeltos y flexibles, con antenas telescópicas que pueden acortar a voluntad cuando avanzan. Los cercos son oscuros, correosos y en forma de pinzas, similares a los de las tijeretas (ver págs. 69-70). Inhalan aire por unos espiráculos.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en el suelo. Las crías van pareciéndose a los adultos tras las mudas sucesivas. Capturan pequeños artrópodos con los cercos abdominales.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En varios hábitats, en grietas del suelo.

• **OBSERVACIÓN** Pueden distinguirse de las tijeretas por su ausencia de ojos.



*HOLJAPYX DIVERSIUNGIUS* es nativo de Norteamérica. Es una especie abundante que vive en el suelo y que mide entre 0,8 y 1 cm de longitud.

Longitud 0,6–3 cm

Alimentación



# CRUSTÁCEOS

## ISÓPODOS

**E**L ORDEN DE LOS ISÓPODOS cuenta con 100 familias y 10.000 especies. La mayoría son marinos, pero 3.800 especies (32 familias) del suborden Oniscoidea son anfibias o viven en hábitats terrestres. Se llaman cochinillas de la humedad y tienen el cuerpo aplanado y segmentado con siete pares de patas similares. La hembra lleva sus huevos dentro de una bolsa de incubación

debajo del abdomen. Las larvas no salen hasta cierto tiempo después de la eclosión.

La mayoría de las cochinillas de la humedad prefieren los ambientes húmedos y frescos, aunque algunas se han adaptado a muchos hábitats, incluidas regiones muy áridas. Algunas especies tienen una coloración críptica que se confunde con su entorno.

Orden ISÓPODA	Familia ARMADILLIDIDAE	N.º de especies 250
---------------	------------------------	---------------------

**ARMADILLÍDIDOS**

Tienen una sección transversal convexa y un margen posterior redondeado. Muchos se enrollan en una bola para protegerse.

- **CICLO VITAL** Las hembras llevan los huevos en una bolsa hasta que eclosionan. Las larvas recién eclosionadas tienen menos pares de patas que los adultos. La madre puede brindar cierta protección a las crías.
- **DISTRIBUCIÓN** Europa y Mediterráneo. En la hojarasca y los montones de escombros.



**ARMADILLIDIUM ALBUM** es pálido, con marcas oscuras, y vive en saladares y zonas costeras. No forma una bola tan compacta como los gloméridos (ver pág. 242).

Longitud 0,5–2,5 cm      Alimentación

Orden ISÓPODA	Familia PORCELLIONIDAE	N.º de especies 500
---------------	------------------------	---------------------

**PORCELIÓNIDOS**

La superficie corporal lisa o verrugosa suele ser gris o pardogrisácea, con varias otras marcas. Algunas especies tienen el cuerpo más estrecho y pueden correr con rapidez.

- **CICLO VITAL** Las hembras llevan los huevos en su bolsa incubadora hasta que eclosionan.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en regiones templadas. Principalmente en la hojarasca y entre los escombros.
- **OBSERVACIÓN** Como en todos los isópodos, los desechos amoniacales se excretan como amoniaco y no como orina. Ello confiere a las grandes colonias un olor característico.



**PORCELLIO SCABER** está muy extendido. Suele ser grisáceo, pero en la costa abundan las formas anaranjadas y crema.

Longitud 0,9–2 cm      Alimentación

# ARÁCNIDOS

## ESCORPIONES

**L**AS 9 FAMILIAS Y 1.400 ESPECIES del orden de los escorpiones forman el grupo más antiguo de los arácnidos.

El cefalotórax lleva cuatro pares de patas andadoras y grandes pedipalpos con una garra a modo de pinza. Hay un par principal de ojos en el centro de la cabeza y un número variable de pares a los lados. El último segmento de la “cola” móvil (telson) lleva el aguijón y su glándula de


veneno, que se utiliza para paralizar a las presas. La picadura de algunos escorpiones puede ser mortal. La reproducción se inicia con un complejo ritual de cortejo; luego, los machos depositan esperma en el suelo y las hembras lo recogen con sus genitales. Paren crías vivas que llevan en la espalda hasta su primera muda. Prefieren las zonas cálidas y cazan de noche.

Orden SCORPIONES	Familia BOTRIURIDAE	N.º de especies 90
------------------	---------------------	--------------------

**BOTRIÚRIDOS**

Estos escorpiones tienen un cefalotórax estrecho. A diferencia de otras familias del orden, sus tibias carecen de espolones.

- **CICLO VITAL** El cortejo puede ser largo y en él puede intervenir el aguijón. Los huevos eclosionan dentro del cuerpo de la hembra. Las crías nacen vivas y trepan sobre su dorso.
- **DISTRIBUCIÓN** Sudamérica, Australia, África y el Himalaya. En zonas secas y húmedas; en madrigueras.



**CENTROMACHETES POCOCCI** es una de tres especies chilenas muy similares. Depreda grillos de campo y también come orugas.

Longitud 2,5–12 cm      Alimentación

Orden SCORPIONES	Familia BUTHIDAE	N.º de especies 520
------------------	------------------	---------------------

**BÚTIDOS**

En estos escorpiones, el esternón del cefalotórax es vagamente triangular. Algunas patas tienen púas en las tibias.

- **CICLO VITAL** Las crías nacen vivas y trepan al dorso de la madre. Las ninfas pueden tardar años en madurar.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats, desde desiertos hasta bosques húmedos, donde vive en grietas rocosas y bajo piedras y cortezas.
- **OBSERVACIÓN** Contiene la mayoría de los escorpiones peligrosos. Su potente veneno paraliza los músculos, incluidos los respiratorios y cardíacos.



**BUTHUS OCCITANUS**, que es común en la región mediterránea, se halla en el suelo, bajo piedras y leños.

Longitud 0,8–12 cm      Alimentación



Orden SCORPIONES	Familia CHACTIDAE	N.º de especies 140
------------------	-------------------	---------------------

<b>CHÁCTIDOS</b> No son muy robustos y pueden ser bastante esbeltos. La placa esternal puede tener cinco lados y ser más ancha que larga o bien larga y estrecha. La coloración varía de marrón pálido a oscuro o algo amarillento. No suelen ser buenos excavadores pero algunos se entierran para evitar el calor y la sequía del verano. • <b>CICLO VITAL</b> La hembra produce crías vivas que emergen de su abertura genital y trepan a su espalda. El primer estadio dura de un par de días a dos semanas. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> América del Norte y del Sur, Europa y norte de África. En hábitats ni demasiado secos ni demasiado húmedos. Entre la vegetación o bajo rocas, piedras y leños. Algunos, en cuevas.		
--	--	--

Longitud 1,5-9 cm	Alimentación *
-------------------	----------------



*CHACTAS GESTROI* vive en partes de América Central y del Sur.

Orden SCORPIONES	Familia SCORPIONIDAE	N.º de especies 130
------------------	----------------------	---------------------

<b>ESCORPIÓNIDOS</b> Muchos son robustos y algunos pueden ser bastante grandes. El esternón en la cara inferior del cefalotórax tiene cinco lados. Patas sin espolones tibiales. Son de marrón pálido a marrón oscuro o negro. Muchos excavan en el suelo para hallar presas. • <b>CICLO VITAL</b> Los machos pueden aguijonar a las hembras en el apareamiento. La hembra produce crías vivas que trepan a su dorso. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> África, Próximo Oriente, Asia y Australia. En grietas y cuevas. • <b>OBSERVACIÓN</b> Sólo pican para dominar a las presas o para defenderse.		
--	--	--

Longitud 6-21 cm	Alimentación *
------------------	----------------



*PANDINUS IMPERATOR* es uno de los mayores escorpiones del mundo. Las especies de este género se hallan desde África central hasta el Yemen.

## PSEUDOESCORPIONES

**E**L ORDEN DE LOS PSEUDOESCORPIONES se divide en 23 familias y 3.300 especies. Son similares a los verdaderos escorpiones pero son muy pequeños y carecen de cola abdominal y de aguijón. El cefalotórax tiene un caparazón dorsal y el abdomen tiene 11 o 12 segmentos. Los pedipalpos, grandes y a modo de pinzas, que pueden ser dentadas, sirven para capturar presas y para la defensa. Las partes abultadas de las pinzas tienen glándulas de veneno.

Los machos depositan paquetes de esperma en el suelo y las hembras los recogen con sus genitales. Ponen sus huevos en una bolsa que llevan debajo. Construyen nidos de seda dentro de los cuales mudan, crían su progenie e hibernan. Prefieren los hábitats húmedos, entre la hojarasca o bajo las piedras.

Orden PSEUDOESCORPIONES	Familia CHELIFERIDAE	N.º de especies 300
-------------------------	----------------------	---------------------

<b>QUELIFÉRIDOS</b> Tienen glándulas de veneno en ambos dedos de las pinzas y éstas no tienen dientes en sus superficies internas. Suelen tener dos ojos. Son de marrón pálido a marrón oscuro o negro, con un matiz rojo u oliváceo a veces, y con marcas oscuras. • <b>CICLO VITAL</b> En el apareamiento, el macho y la hembra pueden danzar agarrados por los pedipalpos. La hembra guarda los huevos en un saco inferior y existen tres estadios ninfales. Algunas ninfas de primer estadio permanecen con la madre. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en las regiones más cálidas. En la hojarasca o sobre la corteza. • <b>OBSERVACIÓN</b> La especie <i>Chelifer cancrivorus</i> se encuentra e menudo dentro de los edificios.		
---	--	--

Longitud 1,5-5 mm	Alimentación *
-------------------	----------------



Las especies de *DACTYLOCHELIFER* viven en partes del hemisferio norte. Algunas especies se hallan confinadas a hábitats costeros.

Orden PSEUDOESCORPIONES	Familia CHERNETIDAE	N.º de especies 600
-------------------------	---------------------	---------------------

<b>QUERNÉTIDOS</b> Los dedos de las pinzas tienen dientes y sólo hay glándulas de veneno en el dedo móvil. Los ojos están poco desarrollados o faltan. Los machos pueden ser distintos a las hembras. Ambos sexos son brillantes, con una coloración que varía en las gamas del pardo. • <b>CICLO VITAL</b> El macho y la hembra realizan una danza de cortejo agarrándose por los pedipalpos. La hembra lleva los huevos en un saco que tiene debajo. Al eclosionar, las ninfas pueden agarrarse a los flancos de su madre. Hay tres estadios ninfales. • <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En la hojarasca, detritos y los nidos y madrigueras de aves y pequeños mamíferos.		
---	--	--

Longitud 1,5-5 mm	Alimentación *
-------------------	----------------



Las especies del género *CHERNETUS* viven en el hemisferio norte y en regiones tropicales de Sudamérica. El espécimen que aquí se muestra vive en cuevas, en Venezuela.




Orden PSEUDOSCORPIONES	Familia CHTHONIIDAE	N.º de especies 570
------------------------	---------------------	---------------------

## CTONÍIDOS

El abdomen suele ser mucho más largo que el caparazón, que a su vez cubre la superficie dorsal del resto del cuerpo y puede ser más ancho en la parte anterior que en la posterior. Tienen cuatro ojos y grandes quelíceros. En los dos primeros pares de patas, los tarsos tienen un único segmento; en los pares tercero y cuarto tienen dos. La coloración varía de los tonos pardos al verde oliva y las patas tienen un matiz rosa.

- **CICLO VITAL** La hembra incuba los huevos dentro de su bolsa y suele liberar sus crías vivas en el suelo, la hojarasca o la corteza. Hay tres estadios ninfales.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo el extremo sur o norte. En varios lugares resguardados, en el suelo y la hojarasca, y bajo la corteza de los árboles. Otras especies se encuentran entre los escombros de las costas marinas, en o cerca de edificios, en terrenos baldíos, en cuevas y en jardines e invernaderos.



Las especies de *CHTHONIUS* están muy difundidas y se hallan en la hojarasca, en la base de las hierbas, bajo piedras y en los nidos de aves y pequeños mamíferos.

Longitud 1–2 mm	Alimentación *
-----------------	----------------

Orden PSEUDOSCORPIONES	Familia NEOBISIIDAE	N.º de especies 500
------------------------	---------------------	---------------------

## NEOBÍSIDOS

El caparazón es bastante anguloso o cuadrangular desde arriba y sus quelíceros son grandes. En todos los pares de patas andadoras, los tarsos tienen dos segmentos; la pinza del pedipalpo tiene una glándula de veneno sólo en el dedo fijo. Por lo general hay cuatro ojos, pero puede haber menos o ninguno en las especies que viven en cuevas. Son de tonos oliváceos al marrón oscuro, con matices rojos, amarillos o crema en algunas especies. Las patas suelen ser verdosas. Paralizan con veneno a sus pequeñas presas y luego las desmenuzan con sus grandes quelíceros.

- **CICLO VITAL** La hembra lleva los huevos en su bolsa y suele liberar las crías vivas en el suelo, la hojarasca o la corteza. Hay tres estadios ninfales.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el hemisferio norte. Muchas especies—sobre todo las más pequeñas—viven en la hojarasca y el suelo, y algunas en cuevas.



*NEOBISIUM MARITIMUM* es nativo de las costas de Irlanda, Inglaterra y Francia. Vive en grietas rocosas y bajo piedras, desde la zona más alta del litoral hasta la de las salpicaduras.

Longitud 1–5 mm	Alimentación *
-----------------	----------------

## SOLÍFUGOS

**A**UNQUE SE PARECEN a los escorpiones y arañas, las 12 familias y 1.000 especies de los solífugos forman un orden separado. Tienen un abdomen flexible que se estrecha al unirse al cefalotórax triseccionado y una cabeza con tres pares de ojos pequeños. Todos son depredadores; usan sus quelíceros en forma de pinza para matar a sus presas. Los pedipalpos, sin pinzas y a modo de

patas, poseen unos órganos en ventosa para apresar pequeños vertebrados y artrópodos. Tienen muchos pelos y órganos sensitivos en la base del último par de patas andadoras.

La mayoría viven en el sudeste de Asia, África y Norteamérica. Los machos introducen su esperma en la abertura genital de las hembras y éstas ponen sus huevos en una madriguera.

Orden SOLIFUGAE	Familia AMMOTRECHIDAE	N.º de especies 72
-----------------	-----------------------	--------------------

## AMOTRÉQUIDOS

Pueden estar coloreados en toda una gama de pardos. Los tarsos del primer par de patas no tienen garras y el margen frontal de la cabeza es redondeado. Muchos son nocturnos pero algunos son activos de día. Los nocturnos suelen enterrarse de día, pero algunas de las especies más pequeñas se esconden en colonias de termitas o en túneles de insectos que horadan la madera.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos, quizás en varias series, en una madriguera.
- **DISTRIBUCIÓN** Regiones más cálidas de América Central, América del Sur (hasta el sur de Argentina) y del Norte. En zonas secas y desiertos.

margen de la cabeza redondeado, ojos, abdomen oscuro y brillante



*AMMOTRECHELLA STIMPSONI* es nativa de Florida. Esta especie se encuentra bajo la corteza de árboles descompuestos y se alimenta de una gran variedad de presas, entre ellas termitas.

Longitud 0,4–2 cm	Alimentación *
-------------------	----------------

Orden SOLIFUGAE	Familia EREMOBATIDAE	N.º de especies 120
-----------------	----------------------	---------------------

## EREMOBÁTIDOS

Pueden ser robustos y con las patas cortas, o delgados y con las patas largas. Los tarsos de los primeros tres pares de patas tienen un solo segmento; los del cuarto par de uno a tres. La parte frontal de la cabeza parece cuadrangular. La coloración varía del marrón oscuro al claro.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en madrigueras. Los jóvenes se alimentan sobre todo de presas.
- **DISTRIBUCIÓN** Partes cálidas y secas de América Central y del sur de América del Norte. En zonas secas, semidesiertos y desiertos; en regiones montañosas.



Las especies de *EREMOBATES* abundan en el suroeste de EE UU. Antes de aparearse, las parejas levantan los pedipalpos y abren los quelíceros.

Longitud 0,8–4 cm	Alimentación *
-------------------	----------------



Orden SOLIFUGAE	Familia GALEODIDAE	N.º de especies 180
-----------------	--------------------	---------------------

## GALEÓDIDOS

Tienen el cuerpo amarillo, marrón claro, con matices rojos u oscuros. Los tarsos del primer par de patas tienen un segmento, los del segundo y el tercero dos, y los del cuarto par tres. Las uñas de los últimos tres pares de patas son peludas. Cazan después del ocaso, refugiándose del calor del día en madrigueras que han cavado en el suelo arenoso.

- **CICLO VITAL** En el apareamiento, el macho puede llevar a la hembra. Pone un espermatóforo en la abertura genital de ésta, que pone sus huevos en un hoyo.
- **DISTRIBUCIÓN** Asia y el norte de África. En regiones semiáridas y desérticas.
- **OBSERVACIÓN** Las grandes especies matan y comen lagartos.



*GALEODES CITRINUS* tiene a menudo una coloración general amarilla. Aquí se muestra la hembra cavando un hoyo poco hondo en el suelo, en el que luego pondrá los huevos.



- abdomen aterciopelado
- ojos
- quelíceros
- el pedipalpo carece de uña

*GALEODES ARABS* abunda en el norte de África. Suele saltar sobre las presas y luego se retira a su madriguera para descansar y digerirlas.


Longitud 1-7,2 cm	Alimentación *
-------------------	----------------

Orden SOLIFUGAE	Familia SOLPUGIDAE	N.º de especies 200
-----------------	--------------------	---------------------

## SOLPÚGIDOS

Son de color pajizo claro, pardos o algo amarillentos, algunos con marcas brillantes. Los tarsos del primer par de patas tienen un solo segmento, los del segundo y el tercero tienen cuatro y los del último par seis o siete. Todos los pares de patas menos el primero tienen uñas lisas. Algunos son activos de día; otros se esconden en madrigueras que cavan en la arena, hendeduras o bajo las piedras.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos dentro de hoyos en el suelo. Los solpúgidos pequeños y las ninfas comen termites.
- **DISTRIBUCIÓN** África y partes de Oriente Medio. En terrenos arbolados, sabanas secas y regiones desérticas y semiáridas.



*METASOLPUGA PICTA* vive en el desierto del Namib, en el sur de África. Como todos los solpúgidos, muerde si no se le manipula con cuidado, pero no tiene glándulas de veneno.

Longitud 0,6-6 cm	Alimentación *
-------------------	----------------

## UROPIGIOS

EL ORDEN DE LOS UROPIGIOS consiste en apenas dos familias que comprenden 99 especies. Estos aplanados arácnidos pueden defenderse rociando ácidos acético y fórmico con un par de glándulas situadas en el extremo de su abdomen. El cefalotórax es más largo que ancho y está cubierto por un caparazón que lleva un par de ojos en el borde frontal y varios ojos a cada lado. Los que-

líceros son más parecidos a los colmillos de las arañas que a las pinzas de los escorpiones y el abdomen, con 12 segmentos, termina en una "cola" en forma de látigo que es distinta de la de los escorpiones. Los robustos pedipalpos se utilizan para capturar y triturar las presas. La reproducción es similar a la de los verdaderos escorpiones y las hembras llevan las crías eclosionadas en la espalda.

Orden UROPYGI	Familia THELYPHONIDAE	N.º de especies 75
---------------	-----------------------	--------------------

## TELIFÓNIDOS

Son aplanados, pardos y, en general, nocturnos. Cavan túneles con sus largos pedipalpos.

Tienen cuatro pares de patas. Los tres pares posteriores son andadores. El par frontal es más fino y largo y tiene un función principalmente sensorial. El cefalotórax carece de divisiones. Llevan un par de ojos centrales en la parte frontal y cuatro o cinco pares de ojos a cada lado.

- **CICLO VITAL** En las danzas de cortejo, el macho guía a la hembra sobre un espermatóforo que ha colocado en el suelo y que ahora introduce en su abertura genital. Tras la eclosión, la hembra lleva a las crías encima varias semanas, hasta que puedan valerse por sí mismas.

### • DISTRIBUCIÓN

India, Malaisia y Papúa Nueva Guinea; partes del noreste de Sudamérica; y regiones tropicales y subtropicales de Norteamérica. En el suelo, la hojarasca y la madera descompuesta, bajo las piedras y en cuevas. Algunos especies en desiertos.

### • OBSERVACIÓN

No pican pero sus potentes pedipalpos dan dolorosos pellizcos.



Las especies de *THELYPHONUS* viven en Tailandia. Los poderosos pedipalpos se aprecian muy bien en este espécimen.

Longitud 1-7,2 cm, excluido el "látigo"	Alimentación *
---	----------------



## AMBLIPIGIOS

**E**L ORDEN DE LOS AMBLIPIGIOS contiene 3 familias y 130 especies. Tienen el cuerpo rechoncho y de perfil aplanado, y un cefalotórax ancho. El primer segmento del abdomen redondeado es pedunculado. Tienen ocho ojos: un par central y tres pares laterales. Los grandes pedipalpos pueden ser largos y finos o cortos y robustos. Espinosos, con la punta afilada y con seis segmentos, son

útiles para agarrar y sostener presas. Los quelíceros segmentados y a modo de colillos sirven para arrancar trozos de la presa. Las patas del primer par, muy largas y con muchos segmentos, tienen una función sensorial.

Nocturnos, no pican ni muerden y depredan insectos y otros artrópodos. Los huevos eclosionan bajo el abdomen de la hembra y las crías trepan a su espalda.

Orden	AMBLIPIGI	Familia	PHRYNIDAE	N.º de especies	52
-------	-----------	---------	-----------	-----------------	----

## FRÍNIDOS

Suelen estar coloreados con varios tonos de pardo, con marcas más oscuras. Las tibias del cuarto par de patas están divididas en tres o cuatro segmentos. En algunas especies, los pedipalpos de los machos son proporcionalmente más largos que los de las hembras.


• **CICLO VITAL** Como sucede con todos los miembros de este orden, los machos depositan un espermatóforo en el suelo, donde lo recogen los genitales de la hembra. Las hembras llevan sus huevos y luego las crías dentro de una bolsa de incubación. Después las crías trepan al dorso de la madre y son transportadas de un lado a otro hasta que se valen por sí mismas.

• **DISTRIBUCIÓN** Zonas tropicales y subtropicales. En lugares húmedos: bajo la corteza y en la hojarasca, en zonas boscosas; entre piedras y rocas y en cuevas.

manchas oscuras en el abdomen  
margen pálido en el cefalotórax  
pedipalpos robustos y cortos  
largas púas en los pedipalpos



*PHRYNUS ASPERATIPES* viven en el suroeste de EEUU. Tiene pequeñas pinzas al final de los pedipalpos.



los segmentos espinosos y afilados de los pedipalpos se pliegan hacia dentro para agarrar a la presa

tarsos muy puntiagudos

abdomen aplanado

quelíceros

las largas patas del primer par llevan órganos sensoriales

no hay "cola" en el abdomen

Las especies de *PHRYNUS* son medianas o grandes y viven en las regiones cálidas de Norte y Sudamérica, y sobre todo en América Central y las islas del Caribe. Hay varias especies cavernícolas.

Longitud 0,5–6 cm

Alimentación \*

## OPILIONES

**E**L ORDEN DE LOS OPILIONES contiene 40 familias y 5.000 especies que reciben el nombre común de segadores. Carecen de esbelta cintura entre el cefalotórax y el abdomen. Tienen un par de ojos en la parte frontal del cefalotórax, que a menudo llevan en una estructura levantada. Los quelíceros, a modo de pinzas, tienen tres segmentos y los pedipalpos seis. Sus patas pueden ser cortas o

largas. Los cuatro pares de patas andadoras tienen siete segmentos y una o dos garras únicas. Unas glándulas del cefalotórax producen secreciones olorosas como medio de defensa.

A diferencia de otros arácnidos, la fecundación es directa: los machos tienen un pene que transfiere esperma. Las hembras pueden tener un ovopositor con el que ponen huevos en grietas del suelo.

Orden	OPILIONES	Familia	COSMETIDAE	N.º de especies	450
-------	-----------	---------	------------	-----------------	-----

## COSMÉTIDOS

Suelen ser de colores apagados. Algunas especies tropicales son verdes o amarillas y unas pocas pueden cambiar de color para confundirse con su entorno.

• **CICLO VITAL** La fecundación es directa. Los huevos se depositan en el suelo o en otras zonas húmedas y protegidas.

• **DISTRIBUCIÓN** Regiones tropicales de América del Norte y del Sur. Bajo las piedras o entre detritos, en herbazales, bosques y semidesiertos.



*VONONES SAYI*, de Panamá, una de sus depredadores con secreciones tóxicas.

Longitud 0,5–1,1 cm

Alimentación \*

Orden	OPILIONES	Familia	GONYLEPTIDAE	N.º de especies	750
-------	-----------	---------	--------------	-----------------	-----

## GONILÉPTIDOS

Suelen ser robustos, con el abdomen ancho y a veces aplanado en la punta, y de colores brillantes. La primera parte de la pata posterior está engrosada y puede tener púas. Los ojos están muy juntos, en dos pequeñas protuberancias. Los machos suelen ser más pequeños, y con las patas mucho más espinosas. Son activos después del ocaso y pueden segregar sustancias químicas como defensa.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en lugares muy húmedos y resguardados. Por lo general, las hembras no cuidan de los huevos, aunque hay una especie que construye una pared protectora de barro.

• **DISTRIBUCIÓN** Bosques tropicales de Sudamérica. Bajo leños y piedras.

uña en el pedipalpo  
pequeñas protuberancias  
primer segmento de la cuarta pata engrosado



Las especies de *DISCOCYRTUS* son nativas de las pluvisilvas brasileñas. Con sus cuerpos triangulares y patas posteriores dilatadas, tienen el aspecto típico de esta familia.

Longitud 0,5–1,4 cm

Alimentación \*



Orden OPILIONES      Familia LEIOBUNIDAE      N.º de especies 450

## LEIOBÚNIDOS

La forma corporal varía bastante. Tienen patas largas y finas, con dos filas de pequeños "dientes" en el primer segmento. El segundo par de patas andadoras puede ser 15 veces más largo que el cuerpo.

• **CICLO VITAL** Se sabe poco sobre el cortejo y la puesta. En algunas especies, los machos y hembras se congregan en tocones o montículos de musgo, donde los machos luchan, a menudo mordiendo las patas. Los más grandes suelen ganar y aparearse con las hembras.

• **DISTRIBUCIÓN** Regiones templadas del hemisferio norte, en Norteamérica y Europa; algunas regiones tropicales salvo África. En lugares húmedos, en terrenos arbolados y entradas de cuevas.

• **OBSERVACIÓN** Usan sus ojos para distinguir la luz de la oscuridad, pero no son capaces de percibir imágenes.



*LEIOBUNUM ROTUNDUM* es activo de noche y baja de los árboles para cazar en el suelo. Sus tarsos largos y flexibles pueden enrollarse en torno a las hojas de hierba.

Longitud 0,2–1,2 cm, únicamente el cuerpo

Alimentación

Orden OPILIONES      Familia PHALANGIIDAE      N.º de especies 200

## FALÁNGIDOS

Suelen ser blandos y pueden tener muchas proyecciones espinosas. El primer segmento de la pata es liso pero los otros pueden tener aristas a veces con púas. Machos y hembras pueden ser distintos; los machos tienen un dilatado quelícero. Son nocturnos pero algunos son también activos de día.

• **CICLO VITAL** Las hembras usan su ovopositor largo y flexible para poner sus huevos bajo la corteza o en grietas del suelo. Las crías permanecen en la vegetación baja al principio, y luego trepan a los árboles y arbustos.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en las regiones templadas. Bajo piedras y entre la hojarasca, en zonas arboladas y herbosas.

• **OBSERVACIÓN** Varias especies se han adaptado a vivir en las casas.



*PHALANGIUM OPILIO* es de color gris blancuzco a amarillo con una marca en forma de silla de montar en el dorso. Vive en bosques, jardines y herbazales del hemisferio norte.

Longitud 0,2–1,2 cm, únicamente el cuerpo

Alimentación

## GARRAPATAS Y OTROS ÁCAROS

**L**AS GARRAPATAS Y AFINES forman el orden de los ácaros con 300 familias y 30.000 especies. Se hallan en todos los tipos de hábitat, incluidos los acuáticos, y su estilo de vida varía mucho. Muchos son importantes plagas de los cultivos y de los productos almacenados o parasitan al hombre y otros animales.

La mayoría de las especies miden menos de 1 mm, aunque las garrapatas pueden

ser mucho mayores, sobre todo tras ingerir sangre. El cuerpo carece de divisiones y el corto abdomen de segmentos. Llevan las piezas bucales en una extensión. Los quelíceros pueden ser pinzas de dos o tres segmentos o estar adaptados para perforar y chupar. Adultos y ninfas tienen cuatro pares de patas andadoras de seis segmentos; las larvas del primer estadio sólo tienen tres.

Orden ACARI      Familia ACARIDAE      N.º de especies 550

## ACÁRIDOS

Suelen ser pálidos. El abdomen tiene largos pelos. Las patas pueden ser largas pero en algunas especies son muy cortas.

• **CICLO VITAL** Ponen sus huevos donde se alimentan (ver Distribución). Hay tres estadios ninfales. Muchas especies viven asociadas con algunos artrópodos y algunas en la materia en descomposición.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En productos frescos o almacenados, queso, hongos, colmenas y dentro de los colchones.

• **OBSERVACIÓN** Unos pocos son plagas de los alimentos secos y almacenados. Algunos comen la piel de los mamíferos o pican al hombre y pueden causar enfermedades cutáneas o potenciar alergias.



*ACARUS SIRO*, el Ácaro de la harina, vive en todo el planeta, en la harina, los cereales y varias semillas, en almacenes y molinos. Puede formar enormes poblaciones.

Longitud Menos de 1 mm

Alimentación

Orden ACARI      Familia ARGASIDAE      N.º de especies 150

## GARRAPATAS BLANDAS

Suelen ser redondeadas y en forma de baya, aunque algunas están aplanadas dorsoventralmente. El cuerpo, duro y correoso, puede tener arrugas o pliegues y los quelíceros atraviesan la piel de sus huéspedes: mamíferos aves y serpientes. Son ectoparásitas y se alimentan sobre todo de noche.

• **CICLO VITAL** Suelen poner sus huevos en los nidos y madrigueras de sus huéspedes. Adultos y ninfas suelen ser asociados con estos animales.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en regiones cálidas y secas. Donde viven los huéspedes.

• **OBSERVACIÓN** Muchas transmiten enfermedades e infestan animales domésticos, como aves de corral.



*ARGAS PERSICUS* es una plaga de los pollos en muchas zonas del mundo. Transmite la fiebre recurrente de las aves de corral.

Longitud 0,2–1 cm; la mayoría menos de 0,6 cm

Alimentación



Orden ACARI	Familia DERMANYSSIDAE	N.º de especies 25
-------------	-----------------------	--------------------

## DERMANÍSIDOS

Se alimentan de sangre de aves y mamíferos con sus quelíceros en forma de aguja. Tras chuparla, pasan de ser gris pálido a rojo. Muchas hembras tienen una sola placa dorsal con pelos cortos.

- **CICLO VITAL** Los machos transfieren su espermatozoides a la hembra. Ésta pone sus huevos, p. ej., en nidos, madrigueras y gallineros. La larva de primer estadio no se alimenta aunque los subsiguientes estadios ninfales sí lo hacen.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Asociadas con aves y mamíferos huéspedes.
- **OBSERVACIÓN** Algunas infestan las aves de corral y otras transmiten enfermedades que matan a los animales y afectan al hombre.

el cuerpo translúcido enrojece tras ingerir sangre

pedipalpos

cuatro pares de patas de tamaño similar



**DERMANYSSUS GALLINAE**, el Ácaro rojo de las gallinas, se encuentra en todo el planeta, en muchas aves. Se alimentan de noche y se esconden en grietas durante el día.

Longitud 0,2–0,8 mm	Alimentación
---------------------	--------------

Orden ACARI	Familia IXODIDAE	N.º de especies 650
-------------	------------------	---------------------

## GARRAPATAS DURAS

Son aplanadas, con una placa dura, a veces con dibujos, en el dorso. En los machos, cubre todo el cuerpo; en hembras e inmaduros sólo la mitad frontal. El abdomen blando y flexible permite ingerir mucha sangre. La coloración varía del amarillo al pardo rojizo o negruzco, y algunas especies están muy marcadas.

- **CICLO VITAL** Después de aparearse, las hembras se atracan de sangre y se desprenden del huésped para poner los huevos entre la vegetación. Tras la eclosión, las larvas de seis patas trepan por las hojas y se adhieren a los huéspedes que pasan. La larva se alimenta unos días y se desprende del huésped para mudar a una ninfa de ocho patas. La ninfa se engancha a un huésped y al cabo de unos días, se desprende para mudar a adulto.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Donde hay aves, mamíferos y reptiles.
- **OBSERVACIÓN** Muchas transmiten enfermedades e infestan vacas, ovejas, caballos, aves de corral, etc. Algunas transmiten enfermedades víricas que afectan al hombre: encefalitis, enfermedad de Lyme, fiebre de Marsella y fiebre moteada de las Montañas Rocosas.



**AMBLYOMMA AMERICANUM**, la Garrapata estrella solitaria, infesta mamíferos y también pica al hombre. Vive en el centro de EE UU.


Longitud 0,2–1 cm; más grande llena de sangre	Alimentación
---	--------------

Orden ACARI	Familia LAELAPIDAE	N.º de especies 650
-------------	--------------------	---------------------

## LLELÁPIDOS

Son ectoparásitos de insectos o de mamíferos. Los primeros tienen unas débiles estructuras a modo de pelos en el cuerpo. Los segundos las tienen más espinosas para adherirse mejor. La placa dorsal no está dividida en dos.

- **CICLO VITAL** Los machos transfieren su espermatozoides a las hembras con los quelíceros. Muchas especies comen linfa o sangre de mamíferos y ponen huevos en su madriguera. Algunas producen larvas vivas.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En muchos hábitats: en gallineros, nidos de pequeños animales, hormigueros, estiércol, detritos de la marea y productos almacenados.
- **OBSERVACIÓN** Muchos transmiten enfermedades.



**HAEMOLAEALAPS GLASGOWI** está muy extendida entre las ratas. Transmite el virus de la fiebre hemorrágica epidémica en los roedores, y posiblemente en el hombre.

Longitud 0,5–5 mm; la mayoría menor de 2 mm	Alimentación
---	--------------

Orden ACARI	Familia MICROTROMBIDIDAE	N.º de especies 500
-------------	--------------------------	---------------------

## MICROTROMBÍDIDOS

Suelen ser pardos y muy peludos. Las patas tienen seis segmentos y la parte frontal de la placa dorsal lleva siempre dos pares de ojos.

- **CICLO VITAL** Parasitan otros artrópodos. Ponen hasta 4.000 huevos en el suelo. Las larvas se alimentan de un huésped apropiado. Luego, mudan a ninfas, comen huevos de insectos que hallan en el suelo y se transforman en adultos.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En varios hábitats, especialmente en zonas secas, arenosas o semiáridas.



Longitud 0,5–2 mm	Alimentación
-------------------	--------------

Orden ACARI	Familia PARASITIDAE	N.º de especies 375
-------------	---------------------	---------------------

## PARASÍTIDOS

Suelen tener forma de pera y ser pardoamarillentos, con una o dos placas visibles en el dorso. En los machos, el segundo par de patas puede ser más robusto para sujetar a las hembras cuando se aparean.

- **CICLO VITAL** Ponen sus huevos en detritos orgánicos. Las ninfas viven sobre insectos y muchas comen pequeños insectos, sus larvas y otros ácaros.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En estiércol y detritos vegetales, sobre otros ácaros en productos almacenados y en nidos de mamíferos y avispas.



Las especies de **PARASITUS** son comunes y se hallan en nidos de abejas y avispas, entre la hojarasca y la madera en descomposición.

Longitud 0,75–2 mm	Alimentación
--------------------	--------------



Orden ACARI	Familia SARCOPTIDAE	N.º de especies 120
-------------	---------------------	---------------------

<b>ÁCAROS DE LA ROÑA</b> También llamados ácaros de la sarna, son de un marrón pálido y translúcido. Tienen patas cortas y compactas y un cuerpo casi esférico algo aplanado de perfil. Sus quelíceros atraviesan la piel (infestando al hombre con la sarna y a los animales con la roña). <b>• CICLO VITAL</b> Suelen alimentarse de la epidermis y la linfa del huésped, dejando túneles en la piel. Se aparean dentro de la piel y las hembras ponen hasta 50 huevos en los túneles durante su vida. Las crías crecen y comen en los folículos pilosos. <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En la piel o en los folículos pilosos de los mamíferos. <b>• OBSERVACIÓN</b> Causan mucho picor. Rascarse produce pérdida de pelo y graves infecciones secundarias.		
---	--	--

Longitud 0,2–0,4 mm	Alimentación
---------------------	--------------



*SARCOPTES SCABEI*, el Arador de la sarna, es también causa de la roña. Hay muchas variedades, cada una de ellas asociada a un huésped.

finas arrugas transversales en el cuerpo

Orden ACARI	Familia TETRANYCHIDAE	N.º de especies 650
-------------	-----------------------	---------------------

<b>TETRANÍQUIDOS</b> Son anaranjados, rojos, verdes o amarillos, parecidos a arañas. Se alimentan en grandes números sobre las plantas huésped, que pueden marchitarse y adquirir manchas pálidas. Producen seda con glándulas situadas delante y suelen cubrir las plantas afectadas con una fina "telaraña". <b>• CICLO VITAL</b> Los huevos, rojos, redondeados y bastante grandes, se depositan sobre las hojas, las ramitas o la corteza. Viven bajo las hojas, protegidos por sus telas de seda. <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En plantas, árboles y arbustos. <b>• OBSERVACIÓN</b> Muchos son plagas importantes de plantas. Pueden afectar al trigo, los cítricos y otros frutales, el trébol, el algodón y el café.		
--	--	--

Longitud 0,2–0,8 mm	Alimentación
---------------------	--------------



Las especies de *TETRANYCHUS* se alimentan de plantas y pasan el invierno en la hojarasca, de la que emergen en primavera para infestar plantas.

pelos del cuerpo finos y pálidos


Orden ACARI	Familia TROMBICULIDAE	N.º de especies 3.000
-------------	-----------------------	-----------------------

<b>TROMBICÚLIDOS</b> Son marrón medio o pálido, o a veces rojo. Son ovalados o algo estrechos por el centro. Tienen pelos y algunos son aterciopelados. Parasitan mamíferos (incluido el hombre), reptiles y aves. <b>• CICLO VITAL</b> Ponen los huevos en el suelo húmedo y las larvas trepan a la hierba para adherirse a un huésped que pasa. Las larvas de primer estadio se alimentan sobre mamíferos, aves, serpientes y lagartos, cuya piel penetran con sus quelíceros como sierras, para comer tejido y linfa. Unos pocos se alimentan en el sistema traqueal. Una vez saciada, la larva se desprende, muda y depreda pequeños artrópodos como colémbolos (ver págs. 207-209). <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. En el suelo, hojarasca, y madrigueras del huésped, o sobre él. <b>• OBSERVACIÓN</b> En el hombre, causan graves picores, dermatitis y reacciones alérgicas. Unos pocos le transmiten un tipo de tifus de los roedores.		
---	--	--

Longitud 1–3 mm	Alimentación
-----------------	--------------



*NEOTROMBICULA AUTUMNALIS* vive en el suelo y emerge con tiempo cálido y húmedo. Los estadios inmaduros pican a las aves, mamíferos y el hombre.

Orden ACARI	Familia TROMBIDIDAE	N.º de especies 250
-------------	---------------------	---------------------

<b>ÁCAROS ATERCIOPELADOS</b> Muchos son rojos o anaranjados y muy peludos, lo que les da un aspecto aterciopelado. El cuerpo no presenta un estrechamiento en el centro. <b>• CICLO VITAL</b> A menudo después de la lluvia, los adultos emergen del suelo para aparearse y poner huevos. Algunas larvas son parásitas de insectos como saltamontes y de otros artrópodos. <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en el trópico. En varios hábitats terrestres, desde sabanas hasta bosques, en general en o sobre el suelo. Algunas especies están asociadas con el agua dulce.		
--	--	--

Longitud 0,2–1 cm; la mayoría menos de 0,5 cm	Alimentación
---	--------------

capa de pelos densa y aterciopelada

superficie con protuberancias



Las especies del género *TROMBIDIUM* suelen verse en el suelo desnudo, sobre todo cuando las fuertes lluvias les desenterran.

Orden ACARI	Familia VARROIDAE	N.º de especies 5
-------------	-------------------	-------------------

<b>ÁCAROS DE LA VARROASIS</b> Suelen ser de color leonado pálido y más anchos que largos, con el cuerpo liso, ovalado y ligeramente convexo. Parasitan abejas. <b>• CICLO VITAL</b> Ponen sus huevos en las celdas de cría de las abejas y sus ninfas se alimentan de larvas de abeja. Los adultos se adhieren a abejas adultas para alimentarse de ellas y dispersarse. <b>• DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas.		
---	--	--

Longitud 1–1,75 mm	Alimentación
--------------------	--------------



*VARROA PERSICUS* se adhiere a abejas melíferas salvajes y domésticas.



## ARAÑAS

**L** OS MIEMBROS DE LAS 101 familias y 40.000 especies del orden de las arañas se diferencian por su aspecto general y su capacidad de segregar hilos de seda y de tejer telas.

El cefalotórax está cubierto por un caparazón y unido al abdomen por un pedúnculo. La parte frontal del caparazón lleva los ojos. La mayoría tienen ocho ojos simples, pero algunas tienen seis, cuatro, dos o ninguno. Los quelíceros poseen un colmillo articulado en el extremo y casi todas las especies tienen glándulas de veneno. Los pedipalpos poseen seis segmentos y su función es sensorial. En los machos, se usan también para transferir

esperma. Hay cuatro pares de patas andadoras con siete segmentos. El abdomen no está segmentado y lleva órganos productores de seda (las hileras) y una abertura genital: el epigino. Para alimentarse diluyen los tejidos corporales de su presa con sus jugos digestivos, produciendo un líquido que luego absorben. Las hembras ponen sus huevos en una bolsa de seda, que algunas especies llevan hasta la eclosión.

Se encuentran en casi todos los hábitats terrestres, desde los desiertos hasta las cumbres de montaña. Aunque no vuelan, recorren grandes distancias flotando en el aire con sus hilos de seda.

Orden ARANEA	Familia AGELENIDAE	N.º de especies 700
--------------	--------------------	---------------------

## AGELÉNIDOS

Son peludos con patas largas. La estrecha parte frontal del cefalotórax lleva seis ojos y el abdomen, ovalado y esbelto, puede tener barras, "acentos circunflejos" o pintas oscuras. Las dos hileras posteriores tienen dos segmentos y son más largas que las anteriores. Suelen construir un refugio en el borde de una telaraña plana.

• **CICLO VITAL** Después de aparearse, el macho se muere. La bolsa de los huevos se guarda dentro de la telaraña. La hembra regurgita el alimento.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En varios hábitats, entre ellos herbazales, prados y jardines. Construyen sus telas en arbustos, entre piedras, sobre rocas o paredes, bajo leños y dentro de las casas.



hileras posteriores  
coloración uniforme



patas largas y peludas  
pedipalpos  
cefalotórax con dibujos  
fémur más oscuro que el resto de la pata  
dibujo distintivo en el abdomen

**TEGENARIA GIGANTEA** es común en casas y jardines europeos. Las grandes arañas que viven en sótanos y buhardillas son de este género.

Longitud 0,6-2 cm	Alimentación *
-------------------	----------------

Orden ARANEA	Familia ARANEIDAE	N.º de especies 4.000
--------------	-------------------	-----------------------

## ARANEIDOS

Suelen tener un abdomen muy grande que puede presentar dibujos y colores brillantes. En algunas especies, puede tener una extraña forma angular. Las patas tienen tres garras y pueden ser muy espinosas. Tienen ocho ojos y los cuatro centrales suelen formar un cuadrado. Los machos suelen ser menores. Las redes tienen a menudo un centro bien marcado, con líneas radiales y espirales. Algunas especies capturan mariposas nocturnas con un solo hilo con una gota de pegamento al final.

• **CICLO VITAL** Hay un complejo ritual de cortejo. La bolsa de los huevos queda camuflada dentro de la tela, se se adhiere o a la corteza, o se entierra en la hojarasca.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En una gran variedad de hábitats, desde herbazales y prados hasta bosques y jardines.

• **OBSERVACIÓN** Algunas especies tropicales construyen redes enormes. Las enormes redes de las especies *Nephila* se usan para la pesca en Papúa Nueva Guinea.



proyecciones a modo de púa en el abdomen  
coloración moteada de camuflaje  
cefalotórax

**MICRATHENA GRACILIS**, la Araña tejedora espinosa, vive en bosques caducifolios de Norteamérica. Este género tiene unas protuberancias espinosas en el abdomen.

Longitud 0,2-4,6 cm	Alimentación *
---------------------	----------------

Orden ARANEAE	Familia ARGYRONETIDAE	N.º de especies 1
---------------	-----------------------	-------------------

## ARAÑA ACUÁTICA

Sólo hay una especie, *Argyroneta aquatica*. Vive más o menos permanentemente bajo el agua y tiene un distintivo y denso acúmulo de pelos cortos en su abdomen gris. Las patas son pardoamarillentas, y los pares tercero y cuarto tienen extensos mechones de pelos más largos que ayudan a recoger aire. Construye una "campana de buceo" con una lámina de seda, la adhiere a la vegetación sumergida y la llena de aire. El abdomen y las patas posteriores sirven para transportar burbujas de aire desde la superficie, y la araña se sacude el aire con las patas para llenar la campana, donde se queda con sus largas patas colgando a la espera de presas que pasen. Entre éstas se incluyen alevines de pequeños peces y renacuajos, que la araña arrastra hasta la campana para comérselas.

• **CICLO VITAL** Después de aparearse, los huevos son envueltos en seda y colocados en la parte alta de la campana de buceo.

• **DISTRIBUCIÓN** Europa y partes de Asia. En aguas estancadas o de curso lento.



aire atrapado en los pelos e introducido en la campana con las patas  
"campana" sujeta a la vegetación con una tela de seda

**ARGYRONETA AQUATICA**, la Araña acuática europea, incluso pasa el invierno en su tela en forma de campana. Añade más seda para reforzar la estructura y se queda allí hasta la primavera.

Longitud 0,7-1,5 cm	Alimentación *
---------------------	----------------



Orden	ARANEAE	Familia	CTENIDAE	N.º de especies	600
-------	---------	---------	----------	-----------------	-----

ARAÑAS MERODEADORAS

Suelen ser grises o pardas. La parte posterior de su caparazón tiene un surco distintivo en dirección longitudinal. La mayoría de especies son cazadoras nocturnas y agresivas. Buscan presas en el suelo y al amanecer regresan a sus oscuros escondrijos.

- **CICLO VITAL** Suelen poner sus huevos en un saco que llevan debajo del cuerpo.
- **DISTRIBUCIÓN** Trópico y subtropical. En el suelo o sobre plantas de porte bajo.
- **OBSERVACIÓN** Las picaduras de algunas de estas arañas pueden ser peligrosas para el hombre.



Las especies del género *CTENUS* se parecen a los lícidos (ver pág. 232). Este espécimen moteado y de coloración apagada es africano.

Longitud	1,5–5 cm	Alimentación	☿
----------	----------	--------------	---

Orden	ARANEAE	Familia	DIPLURIDAE	N.º de especies	250
-------	---------	---------	------------	-----------------	-----

DIPLÚRIDOS

Suelen ser marrón oscuro, con 6 u 8 ojos dispuestos en dos grupos y un caparazón plano. Sus redes tienen un refugio en forma de embudo que conduce a una grieta de los árboles o rocas.

- **CICLO VITAL** Las hembras fabrican sacos de huevos en forma de disco que guardan en el fondo del embudo.
- **DISTRIBUCIÓN** Regiones tropicales y subtropicales de Norteamérica, África, Asia y Australia. En diversos hábitats, en el suelo y en árboles.



*ATRX ROBUSTUS*, o Araña de tela de embudo de Sidney. Su picadura puede ser mortal.

Longitud	0,6–2,8 cm	Alimentación	☿
----------	------------	--------------	---

Orden	ARANEAE	Familia	DYSDERIDAE	N.º de especies	250
-------	---------	---------	------------	-----------------	-----

DISDÉRIDOS

Suelen tener seis ojos dispuestos más o menos en círculo. Los quelíceros son a menudo grandes y los largos colmillos pueden perforar la cutícula. El abdomen puede ser gris rosado o con dibujos. Suelen ser nocturnos y cazan en el suelo o construyen nidos de seda tubulares en la madera, o entre las piedras. Los filamentos que irradian desde la entrada atrapan las presas.

- **CICLO VITAL** Las hembras pueden envolver sus huevos en seda. Los guardan en un refugio tapizado de seda.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En hábitats variados, en grietas naturales de la madera o entre las piedras.
- **OBSERVACIÓN** El género *Segestria*, que anida en tubos, se clasifica a veces en una familia distinta.



*DYSDERA CROCAT* es común en todo el mundo. Se llaman arañas devoradoras de cochinillas de la humedad, ya que comen estos crustáceos.

Longitud	0,6–2,4 cm	Alimentación	☿
----------	------------	--------------	---

Orden	ARANEAE	Familia	ERESIDAE	N.º de especies	120
-------	---------	---------	----------	-----------------	-----

ERÉSIDOS

Son robustos y peludos, con un caparazón grande y un cefalotórax de borde frontal cuadrado con ocho ojos. Los machos pueden mostrar colores brillantes. Construyen su red en los arbustos o hacen telas tubulares en huecos del suelo que conectan con el exterior con redes en forma de embudo.

- **CICLO VITAL** Las hembras vigilan los sacos de huevos dentro del refugio o los llevan bajo el cuerpo.
- **DISTRIBUCIÓN** Partes de África, Europa y Asia. En varios hábitats, en arbustos y en el suelo.



*ERESUS CINNABERINUS*, de Europa, prefiere los lugares soleados en brezales arenosos y secos.

Longitud	1–2 cm	Alimentación	☿
----------	--------	--------------	---

Orden	ARANEAE	Familia	HETEROPODIDAE	N.º de especies	1.000
-------	---------	---------	---------------	-----------------	-------

HETEROPÓDIDOS

Suelen tener colores apagados, con dibujos moteados. El caparazón suele ser igual de ancho que largo y, como el abdomen, tiene un perfil aplanado. Los ocho ojos son del mismo tamaño y cuatro de ellos se dirigen hacia delante desde el borde frontal del caparazón. Las patas pueden ser muy espinosas y suelen llevarlas extendidas hacia los lados. Se esconden bajo la corteza y las piedras o en la vegetación de día, o pueden verse sobre los troncos, y cazan de noche. Andan muy bien de lado.

- **CICLO VITAL** El cortejo puede ser bastante complejo. La hembra fabrica un saco de huevos de seda que esconde bajo una piedra o la corteza y vigila hasta la eclosión de los huevos, cuando abre el saco para liberar a las crías.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. En varios hábitats, en el suelo y en los troncos de los árboles.



Δ Las especies del género *HETEROPODA* suelen importarse en las cajas de plátanos. Aunque han picado a trabajadores, no son peligrosas.



< *HETEROPODA VENATORIA* es útil para el hombre en las regiones tropicales, ya que come pequeños escorpiones y cucarachas.

Longitud	1–3 cm	Alimentación	☿
----------	--------	--------------	---



Orden ARANEAE	Familia LINYPHIIDAE	N.º de especies 4.200
---------------	---------------------	-----------------------


## ARAÑAS ENANAS

Muchas son pequeñas. Los quelíceros son bastante grandes, con dientes afilados, y las patas tienen cerdas gruesas y fuertes. Los machos pueden tener unas extrañas proyecciones en su caparazón que a veces llevan los ojos. Son de amarillo pálido a negro, algunas con manchas pálidas en sus patas a franjas. Muchas enganchan sus telas a la vegetación. Los insectos caen en la tela donde la araña los muerde desde abajo con sus quelíceros y los arrastra bajo la tela.

• **CICLO VITAL** Las hembras pueden agarrar al macho en el apareamiento. Enganchan sus sacos de huevos a plantas, piedras, etc.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en el trópico. Entre la vegetación y las piedras en bosques, herbazales, zonas de monte bajo y marjales. Pueden recorrer grandes distancias flotando en el aire sobre hilos de seda.

• **OBSERVACIÓN** En algunos idiomas, las llaman "araña dinero" porque, si caen sobre alguien y dan tres vueltas en torno a la cabeza, tendrá buena fortuna.



Las especies de *GONATUM* son muy comunes y varias están muy difundidas por el hemisferio norte. Viven en la vegetación baja o en arbustos y prefieren los lugares sombreados.

Longitud 0,1–1 cm; la mayoría menos de 0,5 cm	Alimentación
---	--------------

Orden ARANEAE	Familia LYCOSIDAE	N.º de especies 3.000
---------------	-------------------	-----------------------

## LICÓSIDOS

Varían del gris pálido al pardo oscuro y tienen franjas, rayas, pelos blancos o puntos blancos. La zona de la "cabeza" suele ser estrecha, y los dos pares de patas frontales tienen muchas púas recias. Tienen cuatro ojos grandes: los dos posteriores se dirigen hacia los lados y los dos adyacentes hacia delante. También tienen cuatro ojos pequeños. Ven muy bien y sus presas en el suelo o entre la hojarasca, por lo general de noche.

• **CICLO VITAL** El cortejo puede ser complejo. Las hembras de las especies activas en el suelo llevan su saco de huevos enganchado a sus hileras. Las cavadoras lo guardan en una madriguera de seda. Cuando nacen las crías, la madre puede llevarlas sobre su dorso.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, incluso en el Ártico. Muy difundidas. Muchas son vitales para los cultivos, donde depredan, p. ej., pulgones, y algunas viven en marjales, sobre plantas y sobre el agua.



*PARDOSA AMENTATA* es común en Europa, donde prefiere los hábitats abiertos. Esta especie puede ser bastante variable de aspecto: el abdomen puede ser pardo o gris, por ejemplo.

Longitud 0,4–4 cm	Alimentación
-------------------	--------------

Orden ARANEAE	Familia OONOPIDAE	N.º de especies 250
---------------	-------------------	---------------------

## OONÓPIDOS

Suelen ser rojos, rosados, anaranjados o amarillo pálido. El abdomen puede tener placas endurecidas, tanto en los lados como en el dorso. La mayoría tienen seis ojos muy juntos; pero algunos sólo dos o cuatro, o bien ninguno. No construyen telas; después del ocaso, depredan pequeños insectos en la hojarasca. Unos pocos comen restos de presas caídas en las telas de otras arañas.

• **CICLO VITAL** Ponen muy pocos huevos en su refugio diurno que envuelven en un saco de seda.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas; la mayoría, en bosques tropicales. Algunos, en torno a las casas.

seis ojos, con los dos centrales muy juntos

abdomen más pálido que el cefalotórax



*OONOPS DOMESTICUS* vive en las casas europeas. En zonas más meridionales, también se halla en el exterior. Se desplaza distintivamente, intercalando cortas carreras precipitadas con un andar lento.

Longitud 1–3 mm	Alimentación
-----------------	--------------


Orden ARANEAE	Familia PHOLCIDAE	N.º de especies 350
---------------	-------------------	---------------------

## FÓLCIDOS

Los ojos se disponen en dos grupos de tres, con otro par en medio. El caparazón suele ser muy redondo. Las patas son mucho más largas que el cuerpo, como ocurre en los opiliones (ver pág. 221). Pueden ser grises, verdes o pardos, con las patas pálidas. Los tarsos son muy largos y flexibles. Construyen telas irregulares y enmarañadas, y envuelven la presa con seda antes de picarle.

• **CICLO VITAL** Las hembras ponen de 15 a 20 huevos, que envuelven en un fardo de seda y llevan en sus mandíbulas hasta que eclosionan.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En el trópico, muchos viven en cuevas o en la hojarasca. En las regiones templadas, en rincones oscuros de los edificios.



Las especies de la familia *PHOLCIDAE* son abundantes en cuevas y grietas rocosas, en las regiones más cálidas.

*PHOLCUS PHALANGOIDES* es hoy muy común en edificios de todo el mundo, aunque evita las bajas temperaturas.

Longitud 0,3–1,4 cm	Alimentación
---------------------	--------------




Orden ARANEAE	Familia PISAURIDAE	N.º de especies 550
---------------	--------------------	---------------------

**PISAURIDOS**

Grandes y de patas largas, son muy similares a los licósidos (ver pág. 232) pero con ojos más pequeños. Son de gris pálido a marrón oscuro y las patas pueden ser pardas o blancas, con o sin franjas amarillas. En lugar de capturar sus presas con telas, corren por el suelo en su busca. El caparazón es oval, con marcas longitudinales.

- **CICLO VITAL** Las hembras llevan el saco de huevos en sus quelíceros. Cuando las crías están a punto de nacer, muchas tejen una "tela parvulario" a modo de tienda en torno al saco, entre la vegetación. A continuación, la hembra las vigila.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Muy difundidas en varios hábitats, en el suelo, en la superficie de aguas tranquilas o sobre plantas acuáticas.



abdomen con listas centrales y laterales  
ancha lista longitudinal  
patas pardas con espinas negras

Las especies del género *DOLOMEDES* son grandes y semiacuáticas. Capturan renacuajos y alevines de peces, e insectos. Comunes en el hemisferio norte, saltan en la superficie del agua.

Longitud 1-2,6 cm	Alimentación *
-------------------	----------------

Orden ARANEAE	Familia SALTICIDAE	N.º de especies 5,000
---------------	--------------------	-----------------------

**ARAÑAS SALTADORAS**

La mayoría de estas arañas, así llamadas porque saltan sobre la presa, son de colores apagados aunque algunas especies tropicales son brillantes con vivas marcas. Cuatro de los ocho ojos forman una hilera en la parte frontal del caparazón. Los dos centrales son mucho mayores que los demás. La mayoría de especies son cazadoras diurnas, con una visión excelente; acechan a las presas y se abalanzan sobre ellas. Un hilo de seda impide que se caigan cuando cazan en superficies verticales.

- **CICLO VITAL** Las hembras ponen sus huevos entre la vegetación, el musgo, la corteza y las piedras, dentro de una gran celda de seda. Los vigilan hasta la eclosión.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, en las regiones cálidas. En una variedad de hábitats, incluidos bosques, herbazales, brezales y jardines. En paredes, en el suelo, en arbustos y a menudo en lugares soleados.



coloración apagada  
franjas claras y oscuras en las patas  
cuerpo compacto

Las especies del género *EUOPHRYX* suelen hallarse bajo las piedras o cerca del suelo en plantas bajas. Algunas se han especializado en la caza de hormigas.


Longitud 0,2-1,6 cm	Alimentación *
---------------------	----------------

Orden ARANEAE	Familia SCYTODIDAE	N.º de especies 180
---------------	--------------------	---------------------

**ARAÑAS ESCUPIDORAS**

Suelen ser de color crema o pardoamarillento con marcas negras y con franjas negras en las patas. Sólo tienen seis ojos, y el primer par de finas patas suele ser más largo que los otros tres. A primera vista, el caparazón del cefalotórax parece igual de grande que el abdomen. Visto de lado, está abovedado por atrás, donde hay grandes glándulas que producen una sustancia pegajosa. Su nombre común alude a su técnica única de captura de presas. No construyen telas, sino que utilizan el rápido movimiento lateral de sus quelíceros para "escupir" dos chorros en zigzag a la presa desde muy cerca y envolverla con su pegamento.

- **CICLO VITAL** La hembra lleva un saco de huevos pálido y nudoso debajo de su cuerpo hasta la emergencia de las crías.
- **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, salvo Australia y Nueva Zelanda. La mayoría, en regiones cálidas. Bajo rocas y en edificios.
- **OBSERVACIÓN** Todas las especies de esta familia pertenecen al género *Scytodes*.



patas marrón pálido con franjas negras  
cefalotórax casi igual que el abdomen  
abdomen crema, con franjas y puntos oscuros y simétricos

*SCYTODES THORACICA*, nativa en Norteamérica y Europa, es una araña con marcas oscuras que se encuentra dentro de los edificios. El macho es algo menor que la hembra.


Longitud 0,4-1,2 cm	Alimentación *
---------------------	----------------

Orden ARANEAE	Familia SICARIIDAE	N.º de especies 100
---------------	--------------------	---------------------

**ARAÑAS CANGREJO DE SEIS OJOS**

También llamadas arañas pardas por su color, suelen tener una marca en forma de violín en su caparazón y un surco longitudinal. Tienen seis ojos dispuestos en tres pares y pelos en las patas y el cuerpo. Construyen telas irregulares, pegajosas y en forma de lámina.

- **CICLO VITAL** Las hembras ponen de 30 a 300 huevos por saco y guardan los sacos en la parte posterior de la red. Algunas especies viven varios años, agrandando la tela a medida que crecen.
- **DISTRIBUCIÓN** Regiones cálidas de América del Norte y del Sur, Europa y África. En muchos hábitats: bosques, monte bajo, plantaciones de cítricos, jardines y casas. En lugares sombreados, entre las rocas y la corteza y en edificios.
- **OBSERVACIÓN** La picadura de estas arañas es muy peligrosa ya que causa degeneración de los tejidos.



patas largas y delgadas  
coloración parda  
caparazón ancho

*LOXOSCELES RUFESCENS*, una araña con una marca en forma de violín en el dorso, puede picar al hombre y causar lesiones de lenta curación. Común en Europa e introducida en Australia.

Longitud 0,6-1,8 cm	Alimentación *
---------------------	----------------



Orden ARANEAE	Familia THERAPHOSIDAE	N.º de especies 400
---------------	-----------------------	---------------------

## TARÁNTULAS

Pese a su nombre no están emparentadas con las tarántulas *Lycosa* inspiradoras del baile de la tarantela. Son grandes y peludas y suelen ser pardas o negras, con marcas rosas, rojas, pardas o negras. Los "colmillos" pican verticalmente. Tienen ocho ojos pequeños, agrupados y juntos delante del caparazón. La mayoría cazan en el suelo, de noche, artrópodos y pequeños vertebrados como ranas y ratones. Trituran su presa, vierten sus jugos digestivos encima y sorben luego el líquido con sus grandes quelíferos.

• **CICLO VITAL** Algunas especies viven en los árboles y otras cavan madrigueras en el suelo. Las hembras ponen una serie de huevos en la madriguera. El saco puede ser como una pelota de golf y contener 1.000 huevos. Las crías se quedan en la madriguera hasta su primera muda. Luego, se dispersan para encontrar comida y cavar la suya.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas, sobre todo en Sudamérica. En el trópico y subtropico, en desiertos, bosques y hábitats abiertos.

• **OBSERVACIÓN** Muchas viven de 10 a 30 años y algunas son mascotas. Dado su tamaño, se cree que su picadura es mortal. Aunque algunas tienen un veneno potente, muchas no son venenosas. Las especies más venenosas suelen ser pequeñas.



Δ **BRACHYPELMA EMILIA**, la Tarántula mexicana de patas rojas, es muy grande y vive en el suelo.



**POEILOTHERIA REGALIS**, de Sri Lanka, es la araña arborícola más grande del mundo. Come insectos, como mariposas nocturnas, y pequeños reptiles.

Longitud 3-12 cm	Alimentación
------------------	--------------

Orden ARANEAE	Familia THERIDIIDAE	N.º de especies 2.200
---------------	---------------------	-----------------------

## TERÍDIDOS

Son pardos o negros, a menudo con marcas y robustas cerdas en sus patas posteriores. El abdomen es muy redondeado. La mayoría son activos por la noche y algunos cazan en el suelo. Construyen telarañas irregulares en el follaje, en grietas, hendeduras y escombros, o bajo los edificios.

• **CICLO VITAL** Ponen unos 200-250 huevos que enganchan a la tela dentro de un saco. Después de su primera muda, las crías construyen sus redes.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En la vegetación, bajo las piedras, en la hojarasca y en edificios.

• **OBSERVACIÓN** Las infames viudas negras (entre ellas la Viuda negra americana) y la Araña de dorso rojo australiana pertenecen a esta familia. Negras y del tamaño de un guisante, tienen marcas de color carmesí bajo el abdomen. Su potente veneno puede ser letal pero hay un antídoto.



**LATRODECTUS MACTANS**, la venenosa Viuda negra, se encuentra en muchos países tropicales y subtropicales.

Longitud 0,2-1,5 cm; la mayoría 1 cm	Alimentación
--------------------------------------	--------------

Orden ARANEAE	Familia THOMISIDAE	N.º de especies 2.500
---------------	--------------------	-----------------------


## ARAÑAS CANGREJO

Deben el nombre a sus movimientos laterales y a su forma rechoncha, aunque algunas son alargadas. El caparazón es casi circular, y el abdomen corto y a menudo con dibujos.

Los dos primeros pares de patas, para capturar presas, son mayores y más espinosos que los otros dos. Muchas son rosadas, amarillas o blancas para confundirse con las flores sobre las que se posan.

• **CICLO VITAL** Las hembras guardan y vigilan sus huevos en un saco que enganchan a las plantas.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. Prados y jardines; sobre las flores; en plantas y la corteza.



Δ **MISUMENA VATIA** es común en Europa y Norteamérica. Las hembras se observan a menudo sobre flores blancas o amarillas y pueden cambiar de color para camuflarse.

**TIBELLUS OBLONGUS** acecha inmóvil sobre las hojas de hierba, con la cabeza dirigida hacia abajo, y captura los insectos que pasan. Muy difundida por los prados húmedos de Europa.

Longitud 0,4-1,4 cm	Alimentación
---------------------	--------------



# MIRIÁPODOS

## PAURÓPODOS

**E**L ORDEN DE LOS PAURÓPODOS comprende 5 familias y 500 especies. Estos miriápodos pequeños y de cuerpo blando suelen ser de coloración pálida y carecen de ojos. La cabeza lleva un par de antenas ramificadas y unas piezas bucales poco desarrolladas. Detrás de la cabeza hay un tronco compuesto por 9 a 11 segmentos y hay pelos que sobresalen de la superficie superior de la cabeza

y del tronco. Las placas dorsales de los segmentos del tronco (tergitas) están fusionadas en pares. Los adultos suelen tener de 9 a 11 pares de patas.

Viven en el suelo o en la hojarasca, donde son detritívoros y comen filamentos de hongos. Unos pocos son depredadores. La reproducción empieza cuando el macho deposita un espermátforo que es recogido por la hembra.

Orden PAUROPODA	Familia PAUROPODIDAE	N.º de especies 450
-----------------	----------------------	---------------------


### PAURÓPODOS

Son pálidos y delgados, con patas bastante largas. Por encima, tienen pelos largos, pálidos y delgados que cumplen una función sensorial. Las antenas tienen cuatro artejos y el último se divide en dos ramas. Aunque son pequeños, se desplazan con bastante rapidez por las grietas del suelo.

• **CICLO VITAL** Las hembras suelen poner sus huevos uno a uno o bien en pequeñas series, en el suelo o entre la materia vegetal en descomposición. El ciclo vital es de tres o cuatro meses.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En terrenos arbolados, en el suelo, en la hojarasca y en leños muertos, en lugares húmedos sin riesgo de sequías. Algunos están muy difundidos.

• **OBSERVACIÓN** Contienen la mayoría de las especies de este orden.



*ALLOPAUROPOUS DANICUS* vive en el hemisferio norte. Tiene unos pelos largos y finos que no son visibles en este espécimen montado en un portaobjetos.



Las especies del género *PAUROPOUS* parecen ciempiés (ver págs. 240-41) vermiformes y muy pequeños. Abundan en el humus y en la hojarasca forestal.

Longitud 0,5-2 mm

Alimentación

## SÍNFILOS

**E**L ORDEN DE LOS SÍNFILOS, un grupo pequeño, contiene 2 familias y 175 especies. Estos miriápodos son pequeños y de cuerpo blando y suelen ser blancos, grises o de color marrón pálido. La cabeza lleva un par de antenas largas y filiformes, y tres pares de piezas bucales. Carecen de ojos. Detrás de la cabeza hay un tronco de hasta 14 segmentos. En los adultos, los primeros 12 suelen tener un par de patas de seis segmentos. El último segmento del tronco tiene un par de cortas hileras, de aspecto similar a los cercos de los insectos, pero cuya función es producir una fina seda. Contrariamente a los paurópodos (ver

pág. 238), los sínfilos tienen tergitas no fusionadas en pares en los segmentos del tronco. Algunas de ellas son también dobles. Debido a ello, los sínfilos son muy flexibles.

Viven en el suelo o en la hojarasca, a menudo en grandes números, donde se alimentan de materia vegetal. La fecundación es indirecta: la hembra recoge un espermátforo que el macho ha depositado. No está claro si los sínfilos están más relacionados con los ciempiés (ver págs. 240-241) o con los paurópodos (ver pag. 238) y los milpiés (ver págs. 242-43); tienen características de ambos grupos.

Orden SYMPHYLA	Familia SCUTIGERELLIDAE	N.º de especies 100
----------------	-------------------------	---------------------

### ESCUTIGERÉLIDOS

Son sínfilos cortos y robustos con tergitas correosas. Suelen ser gris pálido, pajizo o blanco. Son muy flexibles y pueden correr muy deprisa serpenteando y cambiando de dirección por grietas diminutas para escapar a los depredadores.

• **CICLO VITAL** Las hembras recogen con la boca el espermátforo pedunculado que los machos han depositado en el suelo y guardan el esperma en una bolsa de la boca. También extraen con la boca los huevos de su abertura genital, luego los untan con esperma y los enganchan a una planta o los dejan en una grieta del suelo. Ponen series de unos 30 huevos cada vez. Cuando eclosionan, las crías tienen seis pares de patas. Luego adquieren nuevos segmentos corporales y patas en cada muda sucesiva. Algunas especies de sínfilos pueden vivir tres o cuatro años.

• **DISTRIBUCIÓN** Cosmopolitas. En el suelo y la hojarasca.

• **OBSERVACIÓN** Muchas especies comen raíces y causan pérdidas en cultivos de tubérculos.



*SCUTIGERELLA IMMACULATA* se encuentra generalmente en los jardines. Como sucede con diversas otras especies de este orden, puede convertirse en una plaga, aunque es de escasa importancia, que afecta a los invernaderos.

Longitud 3-8 mm

Alimentación



## CIEMPIÉS

**L**OS 4 ÓRDENES, 22 FAMILIAS y 3.000 especies de la clase de los quilópodos –los ciempiés– son depredadores y suelen cazar de noche. Matan a las presas, a veces ratones, con sus garras venenosas. Son alargados y por lo general aplanados, con una cabeza que lleva piezas bucales y antenas segmentadas. El tronco tiene al menos 16 segmentos, la mayoría con un par de patas, siendo el

último el más largo. Por lo general amarillento o pardo, el cuerpo puede mostrar un matiz verde o rojo y tiene finos pelos sensoriales.

El cortejo es común. Los machos dejan caer el esperma en el suelo y las hembras lo recogen. Ponen los huevos uno a uno o en series y los entierran. Aunque viven en regiones templadas, son propios del trópico y el subtropico.

Orden	GEOPHILIDA	Familia	GEOPHILIDAE	N.º de especies	200
<b>GEOFÍLIDOS</b>					
Son de color pajizo o pardo, largos y esbeltos, con al menos 35 segmentos y patas cortas.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Suelen poner sus huevos en el suelo, a veces bajo la corteza dándoles la vuelta con su uña de veneno. Las crías nacen ya con la mayoría de sus patas.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas. Muchos hábitats, en madrigueras, hojarasca y detritos.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Su nombre significa “amigo de la tierra”.</li> </ul>					
Longitud		1–5 cm		Alimentación	

cuerpo  
filiforme

patas  
cortas



Las especies de *GEOPHILUS* protegen sus masas de huevos bajo tierra, enroscando su cuerpo en torno a ellos. Puede haber hasta 181 pares de patas.

Orden	LITHOBIIDA	Familia	LITHOBIIDAE	N.º de especies	1.500
<b>LITOBÍIDOS</b>					
Suelen ser pardorrojizos, pero algunos son de colores brillantes. El cuerpo, aplanado y correoso, tiene 15 pares de patas, los dos últimos más largos. Algunos tienen ojos formados por hasta 34 ocelos.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Ponen huevos redondos uno a uno, con dos días de diferencia entre ellos, bajo tierra. Las crías nacen con 7 pares de patas y adquieren un segmento y un par de patas en cada muda.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, especialmente en las zonas templadas del hemisferio norte. En la mayoría de hábitats, en grietas y hendeduras.</li> </ul>					
Longitud		0,6–3,8 cm		Alimentación	



las antenas son 1/3 del cuerpo

coloración pardocastaña

el último par de patas es más largo

▷ **LITHOBIUS VARIEGATUS** es común en la hojarasca de bosques caducifolios. Trepa a los árboles para alimentarse.

◁ **LITHOBIUS FORFICATUS** se encuentra bajo las piedras y la corteza en todo el hemisferio norte.



uñas de veneno

grupos de ocelos a cada lado de la cabeza

segmentos marrón oscuro, con un matiz púrpura

cabeza ancha

línea central oscura

franjas oscuras y claras en las patas posteriores

Orden	SCOLOPENDRIDA	Familia	SCOLOPENDRIDAE	N.º de especies	400
<b>ESCOLOPÉNDRIDOS</b>					
Son robustos y suelen ser de colores brillantes y pueden ser amarillos, rojos, anaranjados o verdes, a menudo con listas o franjas oscuras. Tienen 21 o 23 pares de patas y por lo general cuatro ocelos a cada lado de la cabeza.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Las hembras pueden cavar bajo el suelo, la hojarasca, las rocas o la corteza para poner sus huevos. Las crías nacen con todas las patas.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, en el trópico y subtropico. En el suelo y la hojarasca o en grietas y hendeduras. Algunos trepan a los árboles y arbustos.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> Con sus 30 cm de longitud, <i>Scolopendra gigantea</i>, de Sudamérica es el mayor ciempiés del mundo. Las picaduras de este género causan dolor agudo, fiebre y vómitos.</li> </ul>					
Longitud		3–30 cm		Alimentación	



las glándulas contienen un poderoso veneno

◁ Las especies del género *SCOLOPENDRA* excavan con el cuerpo cámaras en el suelo, donde pueden descansar varios días.

patas amarillas



*SCOLOPENDRA CINGULATA* es común en los países mediterráneos, debajo de las piedras y de los trozos de madera en descomposición. Es parda pero puede tener un matiz verdoso.

segmentos verde oliváceo, con márgenes oscuros


las patas posteriores tienen dientes en forma de púa para la defensa

Orden	SCUTIGERIDA	Familia	SCUTIGERIDAE	N.º de especies	150
<b>ESCUTIGÉRIDOS</b>					
Son bastante cortos, pardos con marcas más pálidas. Tienen 15 pares de patas muy largas. Las posteriores son mucho más largas. El cuerpo se mantiene recto gracias a unas placas (tergitas) rígidas que se solapan. La redonda cabeza lleva grandes ojos compuestos.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CICLO VITAL</b> Las hembras ponen un huevo cada vez –en el suelo, en grietas y entre los escombros– y no lo protegen. Las crías nacen con siete pares de patas y adquieren un nuevo segmento con patas en cada muda.</li> <li>• <b>DISTRIBUCIÓN</b> Cosmopolitas, sobre todo en regiones cálidas. En varios hábitats, incluidos edificios y cuevas.</li> <li>• <b>OBSERVACIÓN</b> <i>Scutigera coleoptrata</i>, el Ciempiés de las casas, alcanza a 40 cm.</li> </ul>					
Longitud		1–5 cm		Alimentación	

captura a las presas con las patas

patas centrales más largas que las frontales

franjas en las patas



Las especies de *SCUTIGERA* son insectívoros que corren con gran rapidez. Unas pocas son comunes dentro de los edificios todo el año y también al aire libre en verano.



MILIPIÉS

**L**A CLASE DE LOS DIPLÓPODOS comprende 13 órdenes, 115 familias y 10.000 especies. La mayoría son de colores apagados y de movimientos lentos, con el cuerpo duro y cilíndrico, mandíbulas fuertes y antenas de siete artejos. Los cuatro primeros segmentos del tronco carecen de patas, y los otros llevan dos pares cada uno. La mayoría tienen muchas menos de 1000 patas y ninguno más de

750. Los machos rodean a las hembras para transferirles su esperma. Éstas ponen sus huevos en nidos en el suelo, y las crías nacen con seis patas, adquiriendo patas y segmentos a medida que mudan. La mayoría viven en el suelo, la hojarasca o los escombros, donde comen materia orgánica en descomposición u hongos. Para protegerse se enrollan en una bola o segregan productos tóxicos.

Orden GLOMERIDA	Familia GLOMERIDAE	N.º de especies 200
-----------------	--------------------	---------------------

GLOMÉRIDOS

El tronco tiene 13 segmentos. Las placas dorsales que cubren estos segmentos les permite enrollarse en una apretada bola con la cabeza bien escondida. Las especies pequeñas tienen colores apagados pero las grandes pueden tener marcas brillantes. Los adultos poseen 15 pares de patas.

- **CICLO VITAL** Como en todos los milpiés, las hembras ponen sus huevos en nidos que han construido en el suelo.
- **DISTRIBUCIÓN** Muy difundidos por las regiones cálidas y frías del hemisferio norte. En el suelo y en cuevas.



segmento corporal distinto detrás de la cabeza

cuerpo ancho

*GLOMERIS MARGINATA* puede confundirse con una cochinilla de la humedad (ver pág. 212) cuando está enrollado, pero es más brillante.

Longitud 0,2-2 cm	Alimentación
-------------------	--------------

Orden JULIDA	Familia JULIDAE	N.º de especies 450
--------------	-----------------	---------------------

CARDADORES

Estos milpiés tienen el cuerpo cilíndrico y suelen ser de coloración apagada, aunque unas pocas especies pueden ser rojas o de color crema pálido con pintas pardas.

- **CICLO VITAL** Como todos los milpiés, las hembras suelen poner sus huevos en nidos en el suelo. Suele haber siete estadios ninfales.
- **DISTRIBUCIÓN** En el hemisferio norte y sobre todo en Europa y Asia. En una gran variedad de hábitats, en el suelo y la hojarasca, o debajo de las piedras y de la madera en descomposición. Algunas especies pueden encontrarse en cuevas y a grandes altitudes.



segmentos corporales redondeados y rígidos

cabeza escondida

Las especies del género *JULUS* usan, como es típico en los milpiés, sus segmentos corporales fuertes y rígidos para reptar por el suelo y la hojarasca.

Longitud 0,8-8 cm	Alimentación
-------------------	--------------

Orden POLYDESMIDA	Familia POLYDESMIDAE	N.º de especies 200
-------------------	----------------------	---------------------

POLIDÉSMIDOS

También llamados milpiés de espalda plana, los miembros de esta familia son menos redondeados que otros milpiés. Carecen de ojos y suelen ser de colores apagados, con expansiones que se proyectan horizontalmente en la parte superior de los segmentos del cuerpo. En la mayoría de especies, muchos de los segmentos corporales contienen glándulas que pueden producir sustancias tóxicas para disuadir a los depredadores.

- **CICLO VITAL** Como en otros milpiés, las hembras ponen huevos en nidos que construyen en el suelo. Los estadios más jóvenes viven en el suelo. Los más avanzados y los adultos buscan su alimento en la superficie.
- **DISTRIBUCIÓN** Hemisferio norte. En la hojarasca de los terrenos arbolados. Algunas especies viven en cuevas.
- **OBSERVACIÓN** Algunas especies de *Motyxia* son luminiscentes. Hay otras que pueden vivir bajo el agua.



expansión lateral del segmento corporal

antenas

patas

superficie brillante y con hoyuelos

patas pareadas

expansiones laterales hacia atrás

coloración parda

márgenes blancos o amarillo anaranjados en algunas especies

Las especies de *POLYDESMUS* pueden confundirse con los ciempiés por su forma aplanada. Sin embargo pueden distinguirse por sus patas pareadas, bien patentes en el espécimen de la derecha.


Longitud 0,5-3,2 cm	Alimentación
---------------------	--------------

Orden SPIROSTREPTIDA	Familia SPIROSTREPTIDAE	N.º de especies 800
----------------------	-------------------------	---------------------

ESPIROSTRÉPTIDOS

Algunos son de colores brillantes, aunque la mayoría son apagados. Los segmentos suelen ser lisos pero pueden presentar hoyuelos.

- **CICLO VITAL** Ponen los huevos en nidos del suelo.
- **DISTRIBUCIÓN** En el hemisferio sur, en el trópico y subtropical. En bosques y en zonas semiáridas. Algunos en los árboles.
- **OBSERVACIÓN** Contienen el milpiés mayor del mundo, la especie africana *Graphidostreptus gigas*.



cabeza roja distintiva

pintas advertidoras anaranjadas

patas rojas

Las especies de *SPIROSTREPTUS* son milpiés tropicales, gigantes y de colores brillantes. Su coloración advierte a los depredadores de que segregan sustancias tóxicas por sus segmentos corporales.

cola roja

Longitud 1,2-28 cm	Alimentación
--------------------	--------------



## GLOSARIO

Muchos de los términos que aquí se describen se ilustran en la introducción (ver págs. 6-45). Las palabras en **negrita** se definen en otra entrada del glosario.

## • ABDOMEN

El más posterior de los tres segmentos principales de un insecto típico. La cabeza y el **tórax** son los otros dos segmentos principales.

## • AGALLA

Excrecencia anormal en ciertas partes de una planta causada por un insecto u otro organismo (el formador de agallas). Los pulgones (ver pág. 99) y las avispa (ver pág. 196) forman agallas.

## • AGUIJÓN

Ovopositor modificado que algunos insectos himenópteros (ver pág. 178) utilizan para defenderse. Órgano de los escorpiones para inocular veneno.

## • AMETÁBOLO

Sin metamorfosis obvia.

## • ANTENAS

Apéndices pares y móviles en la cabeza de los insectos; son sensibles al gusto y al tacto.

## • APLANADO

DORSOVENTRALMENTE  
Aplanado por arriba y por abajo (en vez de lateralmente).

## • ARÁCNIDOS

**Artrópodo** cuyo cuerpo está dividido en dos partes principales (el **cefalotórax** y el **abdomen**), y que tiene quelíceros, cuatro pares de patas andadoras y ojos simples.

## • ARTRÓPODO

Miembro del **filum** o tipo **Arthropoda**. Tienen el cuerpo segmentado con patas articuladas y un exoesqueleto resistente.

## • BALANCÍN

Cada uno de los dos órganos pequeños y en forma de maza que ayudan a los dípteros (ver pág. 136) a mantener el equilibrio en vuelo. Evolucionó a partir de lo que antes eran alas posteriores.

## • BRANQUIA

Órgano respiratorio de muchos animales acuáticos, entre ellos algunas ninfas de insecto.

## • CAPARAZÓN

La placa dorsal endurecida y protectora que cubre el **cefalotórax** de algunos artrópodos.

## • CAPULLO

Envoltorio protector fabricado por la larva desarrollada de muchos insectos justo antes de la pupación. Se compone de seda.

## • CASTA

Grupo especializado dentro de una colonia de insectos.

## • CEFALOTÓRAX

La sección corporal de los arácnidos y crustáceos hecha de la fusión de cabeza y **tórax**.

## • CERCO

Cada una de las dos "colas" que sobresalen del extremo del **abdomen** de algunos insectos, a menudo con una función sensorial.

## • CREMÁSTER

Apéndice ganchudo en la parte posterior de una crisálida.

## • CRISÁLIDA

La pupa de una mariposa.

## • CRUSTÁCEO

**Artrópodo** con mandíbulas y branquias. Los crustáceos son típicamente marinos; los principales ejemplos terrestres son las cochinillas de la humedad (ver pág. 212).

## • CUCO

Dicese del insecto que utiliza la comida almacenada por otro para alimentar a sus propias crías.

## • CUTÍCULA

Ver **Exoesqueleto**.

## • DEPREDAADOR

Animal que come otros animales.

## • DORSAL

Relativo a la cara superior o "espalda" de una estructura u organismo. Ver también **Ventral**.

## • ECOSISTEMA

Conjunto o red de relaciones e interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente.

## • ECTOPARÁSITO

Parásito que vive en el exterior de su **huésped**, alimentándose de él sin matarlo. Son ejemplos los piojos (ver pág. 83) y las pulgas (ver pág. 135).

## • ÉCTOPARASITOIDE

Parasitoide que vive en el exterior de un **huésped**, alimentándose de él y matándolo con el tiempo.

## • ÉLITRO

Rígida ala anterior de un escarabajo que protege el ala posterior.

## • ENDOPARÁSITO

Parásito que vive en el interior de su **huésped**, alimentándose de él pero sin matarlo necesariamente.

## • ENDOPARASITOIDE

Parasitoide que vive en el interior de un **huésped**, alimentándose de él y matándolo con el tiempo.

## • ÉSPERMATÓFORO

Estructura o "paquete" producido por algunos artrópodos para contener el esperma y transferirlo a la hembra.

## • ESPIRÁCULOS

Agujeros de respiración de los insectos que conducen al sistema respiratorio interno.

## • ÉSTERNITA

Superficie ventral del segmento corporal de un artrópodo; p. ej. la "placa pectoral" de un escorpión.

## • ÉSTIGMA

Ver **Pterostigma**.

## • EXOESQUELETO

Estructura protectora o de soporte (cutícula) que cubre el cuerpo de los artrópodos.

## • FÉMUR

Tercer segmento de la pata (a partir del cuerpo), situado justo encima de la tibia. El fémur es a menudo el mayor segmento de la pata.

## • FEROMONA

Sustancia química producida para afectar a otros animales; p. ej. para atraer a la pareja o para disuadir a los depredadores.

## • FÓRCULA

Órgano abdominal saltador y ahorquillado de los colémbolos (ver pág. 207).

## • HALTERIO

Ver **Balancín**.

## • HAPLODIPLOIDIA

Proceso de fecundación en algunos insectos, según el cual de los huevos fecundados nacen hembras y de los no fecundados, machos.

## • HEMIMETÁBOLO

Con metamorfosis incompleta.

## • HEXÁPODO

Artrópodo con seis patas.

## • HILERA

Estructura cónica y móvil en el extremo del **abdomen** de las arañas que segrega la seda.

## • HIPERPARASITOIDE

Parasitoide que utiliza otro parasitoide como **huésped**.

## • HOJARASCA

Capa de hojas caídas, microhábitat de muchos artrópodos.

## • HOLOMETÁBOLO

Con metamorfosis completa.

## • HUÉSPED

Organismo que es atacado por un **parásito** o **parasitoide**.

## • INSECTO

**Artrópodo hexápodo** cuyo cuerpo segmentado se divide en tres segmentos. Tienen antenas y uno o dos pares de alas.

## • INSTAR

Fase del ciclo vital de un insecto entre dos mudas cualesquiera. La fase adulta es el instar final.

## • LARVA

Fase juvenil de un insecto que presenta metamorfosis completa.

## • LIGAMAZA

Excremento líquido rico en carbohidratos de especies que se alimentan de savia tales como los pulgones (ver pág. 99).

## • MANDÍBULAS

En los insectos pueden ser dentadas y utilizarse para morder o bien modificadas para la perforación, como en los mosquitos.

## • METAMORFOSIS

Transformación en una serie de fases desde el insecto inmaduro hasta el adulto. En muchos insectos, estas fases forman una metamorfosis completa, en la que las fases juveniles son muy distintas del adulto, como sucede con los escarabajos (ver pág. 109) o las mariposas (ver pág. 158). En la metamorfosis completa, las fases juveniles se llaman **larvas**. Su nombre científico es **holometabolía**.

En otros insectos, hay una metamorfosis incompleta en la que el joven recuerda una versión más pequeña del adulto; por ejemplo, en las efeméras (ver pág. 48) y en las chinches y cigarras (ver pág. 85). En este caso las crías se llaman **ninfas**. El nombre científico es **hemimetabolía**.

## • MINADORA DE HOJAS

Larva que excava dentro de las hojas y que a menudo deja unos túneles de forma distintiva.

## • MUDAR

Desprenderse un animal de la envoltura exterior del cuerpo (el **exoesqueleto**).

## • NAYADE

Larva acuática de algunos insectos, sobre toda libélulas (ver pág. 51).

## • NINFA

Dicese de las fases juveniles de insectos que se desarrollan por metamorfosis incompleta o gradual.

## • OCELO

1. Órgano receptor de luz simple situado en la cabeza de muchos insectos. Es frecuente que tres ocelos adopten una disposición triangular en lo alto de la cabeza.

2. Marca similar a un ojo como la que se observa en las alas de algunas mariposas.

## • OJO COMPUESTO

El ojo de gran tamaño compuesto por numerosas facetas separadas (llamadas **omátidos**) que se observa en muchos insectos.

## • OJO SIMPLE

Ver **Ocelo** (1).

## • OVOPOSITOR

Tubo para poner huevos propio de muchos insectos hembra. Puede quedar oculto o ser muy visible.

## • PALPOS

Par de órganos sensoriales de las piezas bucales de los artrópodos.

## • PARÁSITO

Dicese de una especie que vive del cuerpo o de los tejidos de otra —el **huésped**— sin causar su muerte. Ver también **Ectoparásito** y **Endoparásito**.

## • PARASITOIDE

Dicese de la especie que vive del cuerpo o de los tejidos de otra —el **huésped**— y provoca su muerte. Ver también **Ectoparasitoide**, **Endoparasitoide** e **Hiperparasitoide**.

## • PARTENOGENESIS

Reproducción sin que medie fertilización.

## • PATAS ANDADORAS

Patatas que se utilizan para andar y no para otros propósitos, tales como matar y manipular las presas o transferir esperma a la hembra.

## • PEDIPALPOS

El segundo de los seis pares de apéndices en el **cefalotórax** de algunos arácnidos. Se usan para andar o para transferir esperma, o para matar y manipular presas.

## • PROBOSCIDE

Piezas bucales alargadas de algunos insectos para chupar alimentos.

## • PRONOTO

Superficie dorsal del primer segmento del **tórax**.

## • PROPODIO

Pata no segmentada de ciertas larvas de insecto; p. ej., una de las cortas patas del **abdomen** de una oruga.

## • PROTÓRAX

El primero de los tres segmentos que forman el **tórax** de un insecto.

Los otros son el **mesotórax** y el **metatórax**.

## • PSEUDÓPODOS

Ver **Propodio**.

## • PTEROSTIGMA

Zona más dura y a menudo más oscura en los márgenes frontales de las alas de muchos insectos y en especial de las libélulas (ver pág. 51).

## • PUPA

Los dos estadios durante los cuales los tejidos se reorganizan para formar un cuerpo adulto en los insectos que se desarrollan por metamorfosis completa. La pupa no se alimenta y por lo general es inmóvil.

## • PUPACIÓN

Convertirse en pupa.

## • QUELICEROS

El primero de los seis pares de apéndices del **cefalotórax** en los arácnidos. En forma de pinza o uña; sirven para manipular presas.

## • ROSTRO

Conjunto formado por las piezas bucales alargadas y chupadoras de las chinches (ver pág. 85) o de la parte alargada de la cabeza de los gorgojos (ver pág. 117) o las moscas escorpión (ver pág. 133).

## • SOLITARIO

Que no forma grupos gregarios.

## • TARSO

El "pie" (o último segmento de la pata) de un insecto; tiene un número variable de segmentos llamados **tarsómeros**.

## • TELSON

Segmento final del **abdomen** de los arácnidos y crustáceos.

## • TIBIA

Segmento de la pata situado entre el fémur y el tarso.

## • TÓRAX

Segmento central de los tres que forman el cuerpo de un insecto (los otros dos son la cabeza y el **abdomen**). Las alas y las patas están unidas al **tórax**.

## • TROMPA

Ver **Proboscide**.

## • VENTRAL

Relativo a la cara inferior de una estructura o de un organismo.

## • VESTIGIAL

Órgano o parte del cuerpo cuya estructura se ha simplificado y su tamaño y función se han reducido en la evolución de la especie.

## • ZANGANO

Macho de abeja de la miel, cuya función es aparearse con la reina.



## ÍNDICE ALFABÉTICO

## A

- Abeja mellífera  
occidental 180  
Abeja minadora  
leonada 178  
abejas carpinteras  
179  
abejas cuco 179  
abejas de cara  
amarilla 183  
abejas del sudor 186  
abejas excavadoras  
179  
abejas melíferas 180  
abejas minadoras  
178  
abejas yeseras 183  
Abejilla del álamo y  
del chopo 170  
Abejorro terreno o  
zapador 181  
abejorros 180  
*Acantholyda posticalis*  
204  
Acanthosomatidae  
85  
Acantósomátidos 85  
Acari 223  
Acaridae 223  
Ácaro de la harina  
223  
Ácaro rojo de las  
gallinas 224  
ácaros 223  
ácaros  
aterciopelados  
227  
ácaros de la roña 226  
ácaros de la sarna  
226  
ácaros de la varroasis  
227  
*Acarus siro* 223  
*Acerinus rectidens* 126  
*Acherontia atropos*  
171  
Acrididae 64  
Acroceridae 141  
*Actias luna* 168  
*Adscita statice* 172  
*Aedes cantans* 138  
*Aedothrips tenuicornis*  
101  
Aeolothripidae 101  
*Aeolothrips* sp. 101  
Aeshnidae 53  
Afrofóridos 95  
Agaonidae 194  
Agelenidae 228  
*Agelopsis* sp. 228  
*Agestrata luzonica*  
114  
agromícidos 141  
Agromyzidae 141  
*Agrotis ipsilon* 165  
*Agulla* sp. 104  
Alacrán cebollero  
61  
*Alaus* sp. 119  
*Albuna oberthuri* 170  
Aleyrodidae 99  
alídidos 86  
*Allodahlia* sp. 70  
*Allopaupus danicus*  
238  
Alydidae 86  
*Alydus calcaratus* 86  
amblipigios 220  
*Amblyomma*  
*americanum* 224  
Amblypygi 220  
*Amegilla acraensis*  
179  
*Amegilla comberi* 179  
*Amenis baroni* 162  
ametábolos, insectos  
(definición) 23  
*Ammotrechella*  
*stimpsoni* 217  
Ammotrechidae 217  
amotréquidos 217  
*Amphimallon*  
*solstitialis* 128  
*Ampulex* sp. 192  
*Anagrus optabilis* 200  
*Anaphe panda* 166  
*Anatis ocellata* 116  
*Anchiale maculata* 67  
*Andrena cineraria*  
178  
*Andrena fulva* 178  
Andrenidae 178  
*Andricus*  
*quercusradicis* 196  
*Andricus* sp. 196  
*Anerina thoracica*  
150  
*Angamiana aetherea*  
96  
*Anisomorpha*  
*buprestoides* 67  
Anobiidae 109  
*Anobium punctatum*  
109  
*Anopheles gambiae*  
138  
*Anthia* sp. 112  
*Anthia thoracica* 112  
*Anthocharis*  
*cardamines* 177  
Anthocoridae 86  
*Anthocoris* sp. 86  
*Anthomyia imbrida*  
141  
Anthomyiidae 141  
*Anthophora* sp. 179  
Anthophoridae 179  
*Anthrenus museum*  
118  
Anthribidae 110  
*Antianthe expansa* 38  
antomfidos 141  
*Anurida maritima*  
208  
Aphididae 99  
*Aphrophora alni* 95  
Aphrophoridae 95  
Apidae 180  
*Apis mellifera* 180  
*Apis* sp. 18  
Apocrita 178  
*Arachnocampa* sp.  
139  
arácnidos 16, 213  
Aradidae 87  
Arador de la sarna  
226  
*Aradus aterrimus* 87  
*Aradus betulae* 87  
Araneae 228  
Araneidae 229  
Araña acuática 229  
Araña acuática  
europea 229  
Araña de dorso rojo  
australiana 237  
Araña de tela de  
embudo de  
Sidney 230  
Araña tejedora  
espinosa 229  
arañas 228  
arañas cangrejo 237  
arañas cangrejo de  
seis ojos 235  
arañas de la hierba  
228  
arañas enanas 232  
arañas escupidoras  
235  
arañas  
merodeadoras 230  
arañas pardas 235  
arañas saltadoras  
234  
Archaeognatha 46  
*Archibaccon servillei*  
195  
*Arctia caja* 158  
Arctiidae 158  
*Argas persicus* 223  
Argasidae 223  
*Arge ciliaris* 203  
*Arge pagana* 203  
Argidae 203  
árgidos 203  
*Argyroneta aquatica*  
229  
Argyronetidae 229  
*Aridius bifasciatus*  
122  
armadillídeos 212  
Armadillidiidae 212  
*Armadillidium album*  
212  
arqueognatos 46  
arqueognatos  
saltadores 46  
artrópodos 10, 36  
ascaláfidos 105  
Ascalaphidae 105  
Asilidae 142  
asílidos 142  
Asnillo 130  
*Atrax robustus* 230  
*Atta laevigata* 185  
*Atta* sp. 184  
*Attacus atlas* 168  
*Attacus* sp. 168  
*Aulacocyclus parryi*  
126  
*Aulacocyclus* sp. 126  
Aurora 177  
avisas cazadoras de  
arañas 188

- avisas colliastadas  
205  
avisas cuco 182  
avisas de la arena  
192  
avisas de la madera  
205  
avisas de las agallas  
196  
avisas de las  
higueras 194  
avisas joya 182  
avisas sociales 193  
Avispón 193

## B

- Baetidae 48  
*Baetis rhodani* 48  
*Balsana subfasciata*  
95  
barqueros 88  
*Bathyaulax* sp. 195  
*Batrissodes delaporti*  
127  
beatas 137  
Belleza de  
Camberwell 174  
Belostomatidae 87  
*Bemisia tabaci* 99  
Bethylidae 182  
*Bethylus* sp. 182  
betílidos 182  
*Bibio marci* 136  
Bibionidae 136  
bibiónidos 136  
Bittacidae 133  
Blaberidae 74  
Blanca de la col 177  
Blanquita de la col  
177  
*Blaps mucronata* 131  
*Blastophaga psenes*  
194  
blatélidos 76  
blatodeos 74  
*Blatta orientalis* 75  
*Blattella germanica*  
76  
Blattellidae 76  
Blattidae 75  
Blattodea 74  
*Blepharotes*  
*splendissimus*  
142  
bombílicos 159  
bombílicos 142  
*Bombus lucorum* 181  
*Bombus monticola*  
181  
*Bombus terrestris* 181  
Bombycidae 159  
Bombyliidae 142  
*Bombylius discolor*  
142  
*Bombyx mori* 159  
Boreidae 134  
boreidos 134  
*Boreus brumalis* 134  
Bostrichidae 110  
*Bostrichus capucinus*  
110  
bostríquidos 110  
Bothriuridae 213  
botriúridos 213  
*Brachycerus*  
*fascicularis* 117  
*Brachypelma emilia*  
236  
*Brachytripes* sp. 61  
Braconidae 195  
braconídeos 195  
Brahmaea de Gray  
159  
*Brahmaea wallichii*  
159  
Brahmeidae 159  
braquiceros 136  
*Brenthus* sp. 110  
Brentidae 110  
Buprestidae 111  
buprestídeos 111  
Buthidae 213  
*Buthus occitanus* 213  
bútidos 213

## C

- Cachorro 128  
*Cacopsylla pyricola*  
100  
Caeciliidae 81  
*Caecilius flavidus*  
81  
Caelifera 60  
calcídidos 196  
*Calispidea*  
*regalis* 115  
*Callicorixa*  
*wollastoni* 88  
*Calliphara* sp.  
94  
*Calliphora*  
*vicina*  
143  
*Calliphora vomitoria*  
143  
Calliphoridae  
142  
*Callosamia*  
*promethea* 168  
calopterígidos  
51  
Calopterygidae 51  
*Calopteryx virgo* 51  
*Calpodes ethlius* 162  
*Calyptra eustrigata*  
165  
*Campodea fragilis*  
211  
Campodeidae 211  
campodeidos 211  
Cantárida 124  
Cantharidae 111  
*Cantharis lateralis*  
111  
*Capnia bifrons* 56  
cápnidos 56  
Capniidae 56  
Cápsido verde  
común 90  
Carabidae 112  
carábidos 112  
carcinofóridos 69  
*Carcinophora* sp. 69  
Carcinophoridae 69  
*Carcinops pucilo* 121  
Carcoma de los  
muebles 109  
carcomas 109  
cardadores 242  
*Castnia licus* 159  
cástridos 159  
Castniidae 159  
*Cecidomyia* sp. 136  
Cecidomyiidae 136  
ceclídeos 81



- Cedispilla simplex*  
135  
céfidos 203  
Celyphidae 144  
cenagrionídeos 52  
*Centraspis* sp. 93  
*Centromachetes*  
*pococki* 213  
Cephidae 203  
*Cephus* sp. 203  
Cerambycidae 113  
*Ceratitis capitata* 155  
*Ceratophyllus gallinae*  
135  
*Ceratophyus*  
*hoffmannseggii* 120  
Ceratopogonidae  
137  
*Ceratopselen*  
*megacephalus* 194  
*Cerceris arenaria* 192  
Cercopidae 95  
cercópodos 95  
*Cercopis vulnerata* 95  
*Cerococcus quercus*  
100  
*Cerura vinula* 166  
cetónias 114  
Cetoniidae 114  
*Chactas gestroi* 214  
Chactidae 214  
cháctidos 214  
*Chaemaecelyphus* sp.  
144



- Chalcididae 196  
*Chalcis sisipes* 196  
*Chalcosoma atlas* 129  
*Chalicodoma monticola* 186  
*Chauliodes* sp. 103  
*Chelifer cancroides* 215  
Cheliferidae 215  
*Chelognus scapularis* 183  
Chernetidae 215  
*Chernetus* 215  
*Chasognathus granti* 123  
*Chilo phragmitella* 167  
Chilopoda 240  
Chinche clueta 85  
Chinche de bosque 92  
Chinche roja gigante 92  
Chinche verde de las verduras 92  
chinchas  
acantosomátidas 85  
chinchas acuáticas gigantes 87  
chinchas asesinas 93  
chinchas, cigarras y afines 85  
chinchas de encaje 94  
chinchas de fuego 92  
chinchas de la corteza 87  
chinchas de las calabazas 88  
chinchas de las camas 88  
chinchas de las flores 86  
chinchas de las plantas 90  
chinchas de ribazo 94  
chinchas escudo 92  
chinchas hediondas 92  
chinchas planas 87  
chinchas rojas 92
- chinchas sapo 89  
Chironomidae 137  
*Chironomus riparius* 137  
*Chironomus* sp. 137  
*Chlorion lobatum* 192  
Chloropidae 144  
*Choeradodis stali* 73  
*Chorotypus gallinaceus* 64  
Chrysidae 182  
*Chrysiridia riphearia* 172  
*Chrysocroa chinensis* 111  
Chrysomelidae 115  
*Chrysopa* sp. 106  
Chrysopidae 106  
Chthoniidae 216  
*Chthonius* sp. 216  
Cicadélidos 96  
Cicadellidae 96  
Cicadidae 96  
ciempiés 240  
ciempiés de las casas 241  
ciervos volantes 123  
cigarras 96  
cigarrillas saltadoras 96  
*Cimbex femoratus* 204  
Cimbridae 204  
cimbrícos 204  
*Cimex lectularius* 88  
Cimicidae 88  
cñifes enanos 137  
*Cleptis rurinana* 171  
*Cleptes* sp. 182  
Cleridae 116  
cléridos 116  
*Climaciella* sp. 106  
*Clitodoca fenestralis* 150  
*Cloeon dipterum* 48  
clorópodos 144  
*Clothoda urichi* 77  
Clothodidae 77  
clotódidos 77  
*Coccinella septempunctata* 22, 116  
Coccinellidae 116  
Coccoidea 100  
Cochinilla harinosa de los cítricos 100
- cochinillas 100  
cochinillas de la humedad 212  
*Coenagrion puella* 52  
Coenagrionidae 52  
Colémbolo acuático 209  
colémbolos 207  
colémbolos ciegos 208  
colémbolos globulares 209  
Coleoptera 109  
Colias anaranjada 177  
*Colias eurytheme* 177  
Collembola 207  
*Colletes daviesanus* 183  
Colletidae 183  
comportamiento de los artrópodos 28  
Conopidae 144  
conópodos 144  
*Conops* sp. 144  
*Copidosoma koehleri* 197  
*Copidosoma* sp. 197  
*Coprophaneus lancifer* 129  
*Cordulegaster boltonii* 53  
Cordulegasteridae 53  
*Cordulia aenea* 54  
Corduliidae 54  
cordúlidos 54  
Coreidae 88  
coridálidos 103  
*Corixa punctata* 88  
Corixidae 88  
cortejo en los artrópodos 28  
*Corticaria impressa* 122  
Corydalidae 103  
cósidos 160  
Cosmetidae 221  
cosmédidos 221  
Cossidae 160  
*Cossus cossus* 160  
costumbres alimentarias en artrópodos 26  
*Cotesta glomeratus* 197
- Crataerina pallida* 147  
*Creobroter* sp. 72  
crisídidos 182  
crisomélidos 115  
crisopas 106  
crustáceos 18, 212  
Cryptocercidae 76  
*Cryptocercus punctulatus* 76  
*Cryptocercus* sp. 76  
Ctenidae 230  
*Ctenophora ornata* 140  
*Ctenus* sp. 230  
ctoníidos 216  
Cucaracha alemana 76  
Cucaracha americana 75  
Cucaracha arlequín 75  
Cucaracha de bosque americana 76  
Cucaracha negra 75  
Cucaracha silbadora de Madagascar 74  
cucarachas 74  
cucarachas comunes 75  
cucarachas de bosque 76  
cucarachas vivíparas 74  
cuidados maternos en artrópodos 29  
*Culex* sp. 138  
Culicidae 138  
Culicoides *impunctatus* 137  
Curculionidae 117  
Cyclorrhapha 136  
Cynipidae 196  
*Cynomia mortuorum* 143  
*Cyrtodiopsis dalmani* 144  
*Cyrtotrachelus* sp. 117

## D

- Dactylochelifer* sp. 215  
*Dactylopius tomentosus* 100

- Damalania oris* 84  
*Danaus plexippus* 175  
*Datana ministra* 166  
*Deinacrida rugosa* 62  
*Deraeocoris ruber* 90  
*Derbe longitudinalis* 97  
Derbidae 97  
dérbidos 97  
*Derephysia foliacea* 94  
dermanísidos 224  
Dermatophoridae 224  
*Dermanyssus gallinae* 224  
Dermaptera 69  
*Dermestes lardarius* 118  
Dermestidae 118  
derméstidos 118  
*Deroplatys desiccata* 73  
*Diactor* sp. 88  
*Dicronorhina derbyana* 114  
*Diestrammena marmorata* 62  
*Dinocras cephalotes* 57  
*Dinoponera grandis* 184  
*Dinoponera* sp. 184  
Diopsidae 144  
Diplopoda 242  
Diplura 211  
Dipluridae 230  
diplúridos 230  
Diptera 136  
dípteros 136  
*Discocyrtus* sp. 221  
ditídidos 230  
ditíscidos 118  
*Dolerus triplicatus* 206  
Dolichopodidae 145  
*Dolomedes* sp. 234  
*Dorylus nigricans* 185  
Dorsales 173  
*Drepana arcuata* 160  
Drepana arqueada 160  
Drepanidae 160  
drepánidos 160  
driídidos 183  
drosófilidos 146
- Drosophila melanogaster* 146  
*Drosophila* sp. 146  
Drosophilidae 146  
Dryinidae 183  
*Dysdera crocata* 230  
*Dysdercus* sp. 92  
Dysderidae 230  
Dytiscidae 118  
*Dytiscus marginalis* 118
- E  
*Ecdyonurus dispar* 50  
Ectopsocidae 81  
ectopsócidos 81  
*Ectopsocus briggsi* 81  
*Editha magnifica* 192  
efemeras 48  
efemeras pequeñas 48  
efemerélidos 49  
efeméridos 49  
efemerópteros 48  
eilemas 158  
*Elasmotherus interstinctus* 85  
*Elasmucha grisea* 85  
Elateridae 119  
elatéridos 119  
Embiidae 77  
embíidos 77  
embiópteros 77  
Embioptera 77  
Empididae 146  
empídidos 146  
*Empis* sp. 146  
*Empusa* sp. 71  
Empusidae 71  
empúsidos 71  
*Emus hirtus* 130  
encírtidos 197  
Encyrtidae 197  
*Endotricha flammealis* 167  
*Enhydra* sp. 120  
*Enicmus transversus* 122  
Ensífera 60  
entomobríidos 207  
*Entomobrya* sp. 207  
Entomobryidae 207  
colotrípidos 101  
Eosentomidae 210  
eosentómidos 210
- Eosentomon delicatum* 210  
*Eosentomon* sp. 210  
*Ephemerella danica* 49  
*Ephemerella* sp. 49  
Ephemerellidae 48  
Ephemeridae 49  
Ephemeroptera 48  
*Epicoma melanostica* 166  
*Epitidia* sp. 135  
*Epuraea* sp. 125  
*Eremobates* sp. 217  
Eremobatidae 217  
eremobátidos 217  
Eresidae 231  
erésidos 231  
*Eresus cinnaberinus* 231  
Erotylidae 119  
Escarabajo bandeja de pastel 131  
Escarabajo de la patata 115  
Escarabajo de los museos 118  
Escarabajo del reloj de la muerte 109  
Escarabajo del tocino 118  
Escarabajo minotauro 120  
Escarabajo molinero 131  
Escarabajo melolontha 128  
Escarabajo solsticial 128  
Escarabajo violín 112  
escarabajos 109  
escarabajos coraceros 111  
escarabajos cunciformes 127  
escarabajos enterradores y afines 130  
escarabajos gigantes de los hongos 119  
escarabajos longicornes 113  
escarabajos peloteros 128  
escarabeidos 128  
esceliónidos 201
- escólidos 190  
escolopéndridos 241  
Escorpión acuático 91  
escorpiones 213  
escorpiónidos 214  
escuteléridos 94  
escutigerélidos 239  
escutigéridos 241  
esfécidos 192  
Esfinge de la calavera 171  
Esfinge verde 171  
esfinges 171  
ésnidos 53  
Espectro de Macleay 67  
espirostréptidos 243  
estafilínidos 130  
Estafilino oloroso 130  
*Estigmene acrea* 158  
estilópodos 132  
estratiómidos 152  
estrepisípteros 132  
Estro del buque 149  
estros 149  
*Euchloron megaera* 171  
*Euglossa asarophora* 180  
*Euglossa intersepta* 180  
*Euglossa* sp. 180  
eulófidos 197  
Eulophidae 197  
Eumastacidae 64  
eumastácidos 64  
*Eumolpus* sp. 115  
*Euphrys* sp. 234  
*Euproctis chrysorrhoea* 164  
euritómidos 198  
*Eurycantha calcarata* 67  
*Eurydema dominulus* 92  
*Eurytoma brunnicentris* 198  
Eurytomidae 198  
*Euschemon rafflesia* 162  
*Eutrombidium* sp. 225  
*Exallonyx longicornis* 200



*Extatosoma tiaratum*  
67

## F

falángidos 222  
Falsa lagarta  
americana 163  
filopotámidos 157  
fócidos 233  
*Forficula auricularia*  
70  
*Forficula* sp. 70  
Forficulidae 70  
fóridos 150  
*Formica rufa* 185  
Formicidae 184  
*Formosia moneta* 155  
frigáneas 156  
Friganeidos 157  
frínidos 220  
*Fulgura laternaria* 97  
Fulgoridae 97  
fulgóridos 97

## G

*Galeodes arabs* 218  
*Galeodes citrinus* 182  
Galeodidae 218  
galeódidos 218  
Garapito 91  
*Gardena*  
*melanarthrum* 93  
Garapata estrella  
solitaria 224  
*Gasterophilus*  
*intestinalis* 147  
gasterúptidos 198  
Gasterúptidae 198  
*Gasteruptus* sp. 198  
"Gavilán" de las  
tarántulas 188  
Gelastocoridae 89  
geofilidos 240

*Geometra*  
*papilionaria* 161  
Geometridae 161  
geométridos 161  
Geophilida 240  
Geophilidae 240  
*Geophilus* sp. 240  
Geotrupidae 120  
geotrupídeos 120  
Gerridae 89  
*Gerris* sp. 89  
girínidos o  
escribanos de  
agua 120  
Gitana 158  
Glomerida 242  
Glomeridae 242  
gloméridos 242  
*Glomeris marginata*  
242  
*Glossina morsitans*  
147  
Glossinidae 147  
Gomphidae 55  
*Gomphus*  
*vulgatissimus* 55  
*Gonatium* sp. 232  
*Gonatopus sepioides*  
183  
gónfidos 55  
goniléptidos 221  
Gonyleptidae 221  
gorgojos 117  
"gorgojos" de los  
hongos 110  
"gorgojos"  
primitivos 110  
Gran escarabajo  
acuático plateado  
121  
Gran esmeralda 161  
*Graphidostreptus*  
*gigas* 243  
*Graphocephala*  
*coccinea* 96

grilloblátidos 59  
grillos de las cuevas  
62  
grillos enrolladores  
de hojas 60  
grillos reales 62  
grillos topo 61  
grillos verdaderos 61  
grillos y saltamontes  
60  
*Gromphadorhina*  
*portentosa* 74  
Gryllacrididae 60  
*Gryllacris* sp. 60  
Gryllidae 61  
*Grylloblatta*  
*campodeiformis* 59  
*Grylloblatta* sp. 59  
Grylloblattidae 59  
Grylloblattodea 59  
*Gryllotalpa*  
*gryllotalpa* 61  
Gryllotalpidae 61  
*Gryllus bimaculata*  
61  
*Gynopogon* sp. 95  
Gyrinidae 120

## H

hábitats de los  
artrópodos 32  
*Haemolaelaps*  
*glasgowi* 225  
Halictidae 186  
halictidos 186  
*Halictus quadricinctus*  
186  
Harpía 166  
Harpobittacus  
australis 133  
*Hartigia linearis* 203  
*Hedriodiscus pulcher*  
152  
*Helaeus subterraneus*  
131  
*Heliconius erato* 174  
*Heliothis armigera*  
165  
*Hemikyptha*  
*marginata* 98  
*Hemipepsis* sp. 188  
Hemiptera 85  
hemípteros 85  
Hepialidae 161

hepiálidos 161  
*Hepialus humuli* 161  
Heptageniidae 50  
heptagénidos 50  
hércules gigantes  
128  
Hespérido brasileño  
162  
Hespérido regente  
162  
hespéridos 162  
Hesperiidae 162  
*Heteropoda* sp. 231  
*Heteropoda venatoria*  
231  
Heteropodidae 231  
heterópodos 231  
hexápodos no  
insectos 207  
hexápodos no  
insectos,  
definición 13  
*Hexomyza* sp. 141  
hidrofilidos 121  
hidrométridos 89  
hidropsíquidos 156  
hidroptílicos 156  
hipobóscidos 147  
Hippoboscidae 147  
Histeridae 121  
histéridos 121  
*Hodotermes* sp. 78  
Hodotermitidae 78  
*Holjapyx*  
*diversiunguis* 211  
*Hololepta* sp. 121  
*Holorusia* sp. 140  
Hormiga de fuego  
184  
Hormiga tejedora  
184  
hormigas 31, 184  
hormigas  
aterciopeladas 187  
hormigas bulldog  
australianas 184  
hormigas cortadoras  
de hojas 184, 185  
hormigas león 107  
*Hyalogrillacris*  
*subdebilis* 60  
*Hyalymenus* sp. 86  
*Hydrometra*  
*stagnorum* 89  
Hydrometridae 89  
*Hydroporla crosbyi* 58

Hydrophilidae 121  
*Hydrophilus piceus*  
121  
*Hydropsyche*  
*contubernalis* 156  
Hydropsychidae 156  
*Hydroptila* sp. 156  
Hydroptilidae 156  
*Hylaeoides concinna*  
183  
Hymenopodidae 72  
Hymenoptera 178  
*Hymenopus coronatus*  
72  
*Hypoderma bovis* 149  
Hystrichopsyllidae  
135

## I

Ícaro 173  
Ichneumonidae 199  
icneumónidos 199  
*Icteria westermanni*  
155  
*Ilyocoris cimicoides* 90  
incurvários 163  
Incurvariidae 163  
Inocellidae 104  
Insecto del fuego 47  
Insecto palo  
acuático 91  
insectos 12, 35, 36  
insectos hoja 68  
insectos palo 66  
isópodos 212  
Isoptera 78  
*Isotoma viridis* 207  
Isotomidae 207  
*Iumnos ruckeri* 114  
Ixodidae 224

## J

japígidos 211  
Japygidae 211  
*Joppa antennata* 199  
Julida 242  
Julidae 242  
*Julodis klugii* 111  
*Julus* sp. 242

## K

*Kheper aegyptiorum*  
128

## L

*Labidura riparia* 70  
Labiduridae 70  
labidúridos 70  
Ladilla del gorila  
84  
Ladilla humana 84  
ladillas 84  
Laelapidae 225  
Lagarta 164  
*Lamprocyphus*  
*augustus* 117  
*Lamproselas* sp. 122  
Lampyridae 122  
Langosta africana  
del desierto 64  
langostas de  
matorral 63  
*Lasia* sp. 141  
Lasiocampidae 163  
lasiocámpidos 163  
*Lasius brunneus* 127  
Lathrididae 122  
latridídeos 122  
*Latrodectus mactans*  
237  
*Ledra aurita* 96  
Leiobunidae 222  
leiobúnidos 222  
*Leiobunum rotundum*  
222  
lelápidos 225  
Lepidoptera 158  
Lepismatidae 47  
lepismátidos 47  
*Leptinotarsa*  
*decemlineata* 115  
leptoflébidos 50  
*Leptophlebia*  
*vespertina* 50  
Leptophlebiidae 50  
*Leptophyes*  
*punctatissima* 63  
*Lestes sponsa* 52  
Lestidae 52  
léstidos 52  
*Lethocerus grandis*  
87  
*Leuctra* sp. 56  
Leuctridae 56  
*Libelluloides coxajus*  
105  
*Libellula depressa* 55  
Libellulidae 55  
Libélulas 51

libelúlidos 55  
licénidos 173  
lícidos 124  
licósidos 232  
*Ligyra venus* 142  
Limacodidae 163  
limacódidos 163  
limántridos 164  
limnéfilidos 157  
Limnephilidae 157  
*Limnephilus lunatus*  
157  
Linyphiidae 232  
Liposcelidae 82  
liposcelídeos 82  
*Liposcelis* sp. 82  
*Liposcelis terricolis* 82  
Lithobiida 240  
Lithobiidae 240  
*Lithobius forficatus*  
240  
*Lithobius variegatus*  
240  
litobíidos 240  
Loba 175  
*Loboptera decipiens*  
76  
*Lohita grandis* 92  
*Loxosceles rufescens*  
235  
Lucanidae 123  
luciérnagas 122  
*Lucilia sericata* 143  
*Lycania phlaea* 173  
Lycanidae 173  
Lycidae 124  
*Lycosa* sp. 236  
Lycosidae 232  
*Lycus* sp. 124  
*Lygocoris pabulinus*  
90  
*Lymantria dispar* 164  
Lymantridae 164  
*Lytta vesicatoria* 124

## M

Machilidae 46  
*Macrocerus stigma* 139  
*Macromeris violaceus*  
189  
*Macrosiphum*  
*albifrons* 99  
*Macrotermes* sp. 79  
*Malacosoma*  
*americanum* 163  
*Maniola jurtina* 175  
Mantidae 73  
mántidos 71  
Mantis flor 72  
Mantis religiosas 71  
Mantis religiosas  
comunes 26, 73  
Mantispididae 106  
mantispídeos 106  
Manto bicolor 173  
Mantodea 71  
*Margarodes* sp. 100  
Mariposa de cola  
dorada 164  
Mariposa de la seda  
159  
Mariposa luna  
americana 168  
Mariposa prometea  
168  
Mariposa silla de  
montar de  
Norteamérica 163  
Mariposa vampiro  
165  
Mariposa viejecita  
164  
mariposas 158  
mariposas armiño  
158  
mariposas diurnas  
158  
mariposas  
emperador 168  
mariposas luna 168  
mariposas nocturnas  
158  
Mariquita de siete  
puntos 116  
Mariquita ocelada  
116  
mariquitas 116  
*Mecocerus gazella* 110  
Mecoptera 133  
*Megacephala australis*  
112  
*Megacephala* sp. 112  
Megachilidae 186  
*Megaloblasta*  
*longipennis* 76  
*Megaloprepus*  
*coerulatus* 53  
Megaloptera 103  
megalópteros 103  
*Megaponera foetens*  
184





- megaquílidos 186  
*Megastigmus dorsalis* 202  
*Melecta luctuosa* 179  
*Meligethes planiusculus* 125  
Meloidea 124  
meloidos 124  
*Melolontha melolontha* 128  
Membracidae 98  
membrácidos 98  
*Menacanthus stramineus* 83  
*Menopon gallinae* 83  
Menoponidae 83  
*Meromyza pratorum* 144  
*Mesotopus tarandus* 123  
*Metasolpuga picta* 218  
*Metoecus paradoxus* 127  
Metrioptera  
*brachyptera* 63  
*Micrathena gracilis* 229  
microtrombídidos 225  
Microtrombidiidae 225  
mídidos 148  
migración de los artrópodos 30  
milpiés 242  
milpiés de espalda plana 243  
mimáridos 200  
Minadora gigante de la caña de azúcar 159  
miriápodos 238  
miriápodos, definición 19  
Miridae 90  
*Misumena vatia* 237  
Monarca 175  
mordélidos 125  
*Mordella octopunctata* 125  
Mordellidae 125  
*Mormolyce phyllodes* 112  
*Morpho menelaus* 175
- Mosca amarilla del estiércol 151  
“Mosca” de España 124  
Mosca de la zanahoria 150  
Mosca doméstica 148  
Mosca mediterránea de las frutas 155  
Moscarda verde de las ovejas 143  
moscardas azules 143  
moscardas de la carne 151  
moscardones 143  
moscas 136  
moscas acorazadas 152  
moscas aguja 56  
moscas bailarinas 146  
moscas cernidoras 153  
moscas de cabeza pequeña 141  
moscas de la arena 139  
moscas de la madera 149  
moscas de las frutas 146  
“moscas de las piedras” 56  
“moscas de las piedras” gigantes 58  
moscas de los murciélagos 149  
moscas de ojos pedunculados 144  
moscas del estiércol 151  
moscas del vinagre 146  
moscas escarabajo 144  
“moscas” escorpión 133  
“moscas” escorpión comunes 134  
moscas negras 140  
moscas patilargas 145  
moscas polilla 139
- “moscas” serpiente 104  
moscas tse-tse 147  
moscas zumbadoras 149  
Mosquita blanca de los invernaderos 99  
mosquitas blancas 99  
mosquitos 136  
mosquitos de las agallas 136  
mosquitos de las setas 139  
mosquitos verdaderos 138  
*Motyxia* sp. 243  
*Musca domestica* 148  
Muscidae 148  
múscidos 148  
mutílidos 187  
*Mutilla europaea* 187  
Mutillidae 187  
Mycetophilidae 139  
*Mydas heros* 148  
Mydidae 148  
*Mylabris* sp. 124  
Mymaridae 200  
*Myrmecia* sp. 184  
Myrmeleontidae 107

## N

- Naucoridae 90  
naucóridos 90  
*Nauphoeta cinerea* 74  
*Neanura muscorum* 208  
Neanuridae 208  
neanúridos 208  
nematóceros 136  
*Nemophora cupriacella* 163  
*Nemophora scabiosa* 163  
*Nemopoda nitidula* 152  
*Nemoptera sinuata* 108  
Nemopteridae 108  
nemoptéridos 108  
*Nemoura cambrica* 57  
Nemouridae 57  
nemúridos 57

- neobísidos 216  
Neobisiidae 216  
*Neobisium maritimum* 216  
*Neoperla clymene* 57  
*Neostylopyga rhombifolia* 75  
*Neotrombicula autumnalis* 227  
*Nepa cinerea* 91  
*Nepa* sp. 91  
*Nephila* sp. 229  
Nepidae 91  
népidos 91  
*Nerthra grandicollis* 89  
Neuroptera 105  
neurópteros 105  
*Nesara viridula* 92  
*Nicrophorus* sp. 130  
ninfálidos 174  
Nitidulidae 125  
nitidúlidos 125  
Noctuidae 165  
noctuidos 165  
*Nothochrysa capitata* 106  
Notodontidae 166  
notodóntidos 166  
*Notonecta glauca* 91  
Notonectidae 91  
notonéctidos 91  
Numerada 174  
*Nycteria kolenatii* 149  
Nycteriidae 149  
Nymphalidae 174  
*Nymphalis antiopa* 174

## O

- Odonata 51  
odonatos 51  
Oecophyla smaragdina 184  
Oestridae 149  
Ommatoptera pictifolia 63  
Onychiuridae 208  
*Onychiurus* sp. 208  
*Onymacris candidipennis* 131  
Oonopidae 233  
oonópidos 233

- Oonops domesticus* 233  
opiliones 221  
*Orgyia antiqua* 164  
*Ornithoptera priamus* 176  
*Ornithoptera* sp. 176  
Ornitóptera de Priamo o de Cairns 176  
Orthoptera 60  
Orthorrhapha 136  
ortópteros 60  
orugas 26  
*Orygia luctuosa* 152  
osmílidos 108  
Osmylidae 108  
*Osmylus fulvicephalus* 108
- P  
*Pachnoda sinuata* 114  
*Pachylostica viola* 204  
*Pachyrhynchus* sp. 117  
*Paederus* sp. 130  
*Pagidolaphria flammpennis* 142  
Pájaro luna 166  
*Palpares libelluloides* 107  
Pamphilidae 204  
*Pandinus imperator* 214  
panfílidos 204  
*Panorpa lugubris* 134  
*Panorpa nuptialis* 134  
Panorpidae 134  
panórpidos 134  
Pantophthalmidae 149  
*Pantophthalmus bellardii* 149  
*Papilio glaucus* 176  
*Papilio tigre* 176  
Papiionidae 176  
papiliónidos 176  
*Paracollyria* sp. 199  
*Paradejeania rutiloides* 155  
Parasitidae 225  
parasítidos 225

- Parasitus* sp. 225  
*Pardosa amentata* 232  
*Parnopes carnea* 182  
pasálidos 126  
Passalidae 126  
patinadores 89  
Pauropoda 238  
Pauropodidae 238  
pauropódidos 238  
paurópodos 238  
*Pauropus* sp. 238  
pavones de noche 168  
pececillos de plata 47  
Pediculidae 83  
*Pediculus humanus capitis* 83  
*Pediculus humanus corporis* 83  
*Pediculus schaefferi* 83  
*Pentatoma rufipes* 92  
Pentatomidae 92  
*Pepsis heros* 188  
*Perga dorsalis* 204  
Pergidae 204  
pérgidos 204  
*Pericoma fuliginosa* 139  
*Periplaneta americana* 75  
Perlidae 57  
pérlidos 57  
Perlodidae 58  
perlódidos 58  
*Petrobius maritimus* 46  
*Petrobius* sp. 46  
*Phalacrognathus mulleri* 123  
Phalangiidae 222  
*Phalangium opilio* 222  
*Phalera bucephala* 166  
*Phaneus demon* 128  
*Pharnacia* sp. 66  
*Phasia hemiptera* 155  
Phasmatidae 66  
Phasmatodea 66  
Philopotamidae 157  
*Philopotamus montanus* 157  
Phlaeothripidae 102  
Pholcidae 233

- Pholcus phalangioides* 233  
*Pholeogryllus geertsi* 62  
Phoridae 150  
*Phosphorus jansoni* 113  
*Phricetus quinquepartitus* 97  
*Phryganea grandis* 158  
Phryganeidae 157  
Phryniidae 220  
*Phrynus asperitipes* 220  
*Phrynus* sp. 220  
Phtiraptera 83  
Phtiridae 84  
*Phtirus gorillae* 84  
*Phtirus pubis* 84  
Phylliidae 68  
*Phyllium bioculata* 68  
*Phyllium scythe* 68  
*Phyllium* sp. 68  
*Phymateus viridipes* 65  
Pieridae 177  
piéridos 177  
*Pieris brassicae* 177  
*Pieris rapae* 177  
Piojo de la cabeza 83  
Piojo del cuerpo de las gallinas 83  
Piojo del perro 84  
piojos 83  
piojos chupadores de los mamíferos 84  
piojos de las aves 83  
piojos humanos 83  
pirálidos 167  
pirgómorfidos 65  
pirocóridos 127  
Pisauridae 234  
pisáuridos 234  
*Pithanus maerkeli* 90  
*Planococcus citri* 100  
platistómidos 150  
*Platymis biguttata* 93  
Platystomidae 150  
*Platyura marginata* 139
- Plecoptera 56  
plecópteros 56  
*Plusiotis resplendens* 128  
*Podura aquatica* 209  
Poduridae 209  
*Poecilobothrus nobilitatus* 145  
*Poecilotheria regalis* 236  
polidésmidos 243  
“Polilla” gigante 168  
Polydesmida 243  
Polydesmidae 243  
*Polydesmus* sp. 243  
*Polyommatus icarus* 173  
Pompilidae 188  
pompílidos 188  
*Pompilus* sp. 188  
porceliónidos 212  
*Porcellio scaber* 212  
Porcellionidae 212  
*Prionemys* sp. 189  
*Proctotrupes gravidator* 200  
Proctotrupidae 200  
proctotrúpidos 200  
Protura 210  
proturos 210  
pseláfidos 127  
Pselaphidae 127  
*Pseudocrebota* sp. 72  
pseudoscorpiones 215  
pseudostigmátidos 51, 53  
Pseudoscorpiones 215  
Pseudostigmatidae 53  
*Psila rosae* 150  
Psilidae 150  
Psílido de los perales 100  
psílidos 100  
*Psithyrus* sp. 181  
Psocidae 82  
psócidos 82  
*Psococercus gibbosa* 82  
Psocoptera 81  
psocópteros 81  
Psychodidae 139  
Psyllidae 99, 100



Pteromalidae 201  
pteromálidos 201  
*Pteromalus* sp. 201  
*Pteronarcella badia* 58  
Pteronarcyidae 58  
*Pteronarcy*  
*californica* 58  
*Ptilinus pectinicornis* 109  
*Ptinomorphus*  
*imperialis* 109  
Pulga de la alfalfa 209  
Pulga del conejo 135  
Pulga europea de las gallinas 135  
pulgas 135  
pulgas comunes 135  
pulgas de los roedores 135  
Pulgón americano del altramuze 99  
pulgonos comunes 99  
Pulicidae 135  
*Pycna repanda* 96  
*Pycnoscelus*  
*surinamensis* 74  
*Pygostolus sticticus* 195  
Pyrilidae 167  
*Pyrgomorpha* sp. 65  
Pyrgomorphidae 65  
*Pyrochroa* sp. 127  
Pyrochroidae 127  
Pyrrhocoridae 92

**Q**  
queliféridos 215  
quernétidos 215  
quironómidos 137

**R**  
*Ranatra linearis* 91  
*Ranatra* sp. 91  
Raphidiidae 104  
Raphidioptera 104  
Raphidophoridae 62  
Reduviidae 93  
*Reticulitermes lucifugus* 78

reznos 147  
*Rheumaptera hastata* 161  
*Rhinocoris alluaudi* 93  
Rhinothymidae 78  
Rhipiphoridae 127  
*Rhyssa persuasoria* 199  
*Rybaxis longicornis* 127

**S**  
*Sagra* sp. 115  
*Saissetia nigra* 100  
Saldidae 94  
*Saldula* sp. 94  
saltamontes 64  
saltamontes de matorral 63  
saltamontes de tierra 65  
saltamontes longicornios 63  
Saltamontes verde punteado 63  
Salticidae 234  
*Sarcophaga melanura* 151  
Sarcophagidae 151  
*Sarcoptes scabiei* 226  
Sarcoptidae 226  
*Sathrophyllia rugosa* 63  
Saturnidae 168  
satúrnidos 168  
*Scaphidomorphus* sp. 119  
Scarabeidae 128  
*Scarabeus cateratus* 129  
*Scathophaga* sp. 151  
*Scathophaga stercoraria* 151  
Scathophagidae 151  
Scelionidae 201  
*Scellus notata* 145  
*Schistocerca gregaria* 64  
*Scolia hyalina* 191  
*Scolia peregrina* 191  
*Scolia procer* 190  
*Scolia variegata* 190  
Scoliidae 190

*Scolopendra cingulata* 241  
*Scolopendra gigantea* 241  
*Scolopendra* sp. 241  
Scolopendrida 241  
Scolopendridae 241  
Scorpiones 213  
Scorpionidae 214  
Scutelleridae 94  
*Scutigera coleoptrata* 241  
*Scutigera* sp. 241  
*Scutigerella immaculata* 239  
Scutigerellidae 239  
Scutigerida 241  
Scutigeridae 241  
*Scytodes* sp. 235  
*Scytodes thoracica* 235  
Scytodidae 235  
segadores 221  
*Segestria* sp. 230  
*Semiotus angulatus* 119  
sensorial, sistema (en los artrópodos) 24  
Sepsidae 152  
sépsidos 152  
*Sericomyia silentis* 153  
*Sesia apiformis* 170  
Sesia del álamo y del chopo 170  
Sesia del peral 170  
sesias 170  
Sesiidae 170  
Sialidae 103  
sialidos 103  
*Sialis* sp. 103  
*Sibine stimulea* 163  
Sicariidae 235  
*Silpha americana* 130  
Silphidae 130  
Simuliidae 140  
simúlidos 140  
*Simulium* sp. 140  
sínfilos 239  
Siphonaptera 135  
*Sirex noctilio* 205  
sirfidos 153  
Sirice gigante 205  
Siricidae 205  
sirfidos 205

sirfidos 108  
*Sisyra fuscata* 108  
Sisyridae 108  
Sminthuridae 209  
*Sminthuroides aquaticus* 209  
*Sminthurus viridis* 209  
sociales, insectos 30  
*Solenopsis invicta* 184  
Solífugas 217  
solífugos 217  
Solpugidae 218  
solpúgidos 218  
*Sphaerophthalma melancholica* 187  
Sphecidae 192  
Sphingidae 171  
*Spilopsyllus cuniculi* 135  
Spirostreptida 243  
Spirostreptidae 243  
*Spirostreptus* sp. 243  
*Spodoptera exigua* 165  
Staphylinidae 130  
*Staphyllinus olens* 130  
Stenopelmaticidae 62  
*Sternotomis bohemanni* 113  
*Stilbum splendidum* 182  
Stratiomyidae 152  
Strepsiptera 132  
Stylopidae 132  
*Stylops* sp. 132  
*Sycophila biguttata* 198  
*Sycoscapter* sp. 194  
Symphila 239  
Symphita 178  
*Synanthedon exitiosa* 170  
Syrphidae 153  
*Syrphus ribesii* 153  
*Systropus* sp. 142

**T**  
Tabanidae 154  
tábanos 154  
*Tabanus atratus* 154  
*Tabanus* sp. 154  
*Tabanus sudeticus* 154

Tachinidae 155  
Taladro amarillo de los frutales 160  
Taladro rojo de los troncos 160  
taquínidos 155  
tarántula mexicana de patas rojas 236  
tarántulas 236  
tefrítidos 155  
*Tegenaria gigantea* 228  
tejedores 77  
telarañas, telas de araña 17  
telifónidos 219  
*Tenebrio molitor* 131  
Tenebrionidae 131  
tenebriónidos 131  
Tenthredinidae 206  
*Tenthredo*  
*scrophulariae* 206  
*Tenthredo* sp. 206  
tentredinidos 206  
Tephritidae 155  
terfidos 237  
termes 31, 78  
termes cosechadores 78  
termes subterráneos 78  
termitas 78  
Termitidae 79  
termítidos 79  
Termopsidae 79  
Termópodos 79  
*Tetracanthagyna plagiata* 53  
tetraníquidos 226  
Tetranychidae 226  
*Tetranychus* sp. 226  
*Tetrastichus galactopus* 197  
Tetrigidae 65  
*Tetrix subulata* 65  
Tettigonidae 63  
*Thasus acutangulus* 88  
*Thecla betulae* 173  
*Thecla coronata* 173  
Thelyphonidae 219  
*Thelyphonus* sp. 219  
Theraphosidae 236  
Theridiidae 237  
*Thermobia domestica* 47  
Thomisidae 237

Thripidae 102  
*Thrips fuscipennis* 102  
*Thrips simplex* 102  
*Thynnus ventralis* 193  
*Thysania agrippina* 168  
Thysanoptera 101  
Thysanura 47  
*Tibellus oblongus* 237  
tifidos 193  
Tijereta común 70  
tijeretas 69  
tijeretas comunes 70  
Tingidae 94  
*Tingis cardui* 94  
Tiphidae 193  
Tipulidae 140  
tipúlidos 140  
*Titanolabis colosse* 69  
*Titanolabis* sp. 69  
*Tomatares citrinus* 107  
*Tomoxia bucephalla* 125  
Topacio 173  
Topacio azul de Hewitson 173  
torfidos 202  
Tortricidae 171  
tortrícidos 171  
Torymidae 202  
*Torymus* sp. 202  
*Tremex columba* 205  
*Trialeurodes vaporariorum* 99  
Trichodectidae 84  
*Trichodes crabroniformis* 116  
*Trichogramma semblidis* 202  
Trichogrammatidae 202  
Trichoptera 156  
tricogramátidos 202  
*Trimorus pedestre* 201  
*Trimerizitermes geminatus* 79

trips 101  
trips comunes 102  
trips de cola en tubo 102  
trips del gladiolo 102  
trips depredadores 101  
Trombiculidae 227  
trombicúlidos 227  
Trombididae 227  
*Trombidium* sp. 227  
*Typhoeus typhoeus* 120

**U**  
*Umbonia* sp. 98  
uránidos 172  
Uraniidae 172  
*Urbanus proteus* 162  
*Urocerus gigas* 205  
uropigios 219  
Uropygi 219

**V**  
*Vanessa atalanta* 174  
*Varroa persicus* 227  
Varroidae 227  
*Vespa crabro* 193  
Vespididae 193  
véspidos 193  
*Vespula germanica* 193  
*Vespula* sp. 127  
*Vespula vulgaris* 193  
*Vitessa suradeva* 167  
Viuda negra 237

Viuda negra americana 237  
*Volucella zonaria* 153  
*Vonones sayi* 221

**W**  
*Wiedemannia stagnalis* 146

**X**  
*Xanthopastis timais* 165  
*Xanthostigma xanthostigma* 104  
*Xestobium rufovillosum* 109  
*Xixuthrus heros* 113

**Z**  
zapateros 89  
*Zeuzera pyrina* 160  
Zigena común 172  
Zigena de seis manchas 172  
Zygopteros 51-53  
*Zonarius* sp. 119  
*Zootermopsis angusticollis* 79  
zorápteros 80  
Zorotypidae 80  
*Zorotypus hubbardi* 80  
*Zorotypus* sp. 80  
*Zygaena filipendulae* 172  
Zygaenidae 172





## AGRADECIMIENTOS

EL AUTOR agradece a Darren Mann la aportación de sus amplios conocimientos sobre insectos. Otros colegas de la Oxford University of Natural History han solucionado numerosas dudas y me han ayudado, especialmente: Dr. John Ismay, Dr. Adrian Pont, Sr. Christopher O'Toole, Prof. Steve Simpson, Dr. Derek Siveter, Prof. David Spencer-Smith, Dr. Matthew Wills, Dr. Kwang-sun Cho y Dorothy Newman. También estoy agradecido a: Dr. John Noyes, Dr. Malcolm Scoble y Dr. Zhi-Quang Zhang del Natural History Museum de Londres, Peter Smithers de la University of Plymouth, Dr. John Deeming de los National Museums and Galleries de Gales, Dr. Eugene Marais y Dr. Eryn Griffin del National Museum de Namibia, Dr. Frank Rodovsky de la Oregon State University y Dr. Barry O'Connor de la University of Michigan. Muchas gracias a Lois.

DORLING KINDERSLEY agradece a Richard Hammond y Sean O'Connor su inestimable colaboración editorial. Gracias también a Peter Cross, Steve Knowlden y Elaine Hewson por su experto diseño.

STUDIO CACTUS agradece a Sharon Moore, Ann Thompson y Amelia Freeman su colaboración en el diseño, y a Polly Boyd, Nicola Hodgson, Irene Lyford, Amanda Hess, Christine Davis y Jane Baldock su colaboración editorial. Gracias también a Melanie Brown.

PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES  
(ar, arriba; ab, abajo; c, centro; i, izquierda;  
d, derecha)

Todas las fotografías son de Steve Gorton, excepto: Ardea London Ltd: D. Avon 56abd; BBC Natural History Unit: Geoff Dore 222abd; Premaphotos 230ard; Dr. Alison Blackwell: 137ard; Prof. Mike Claridge: 14ard, 200ard; Bruce Coleman Ltd: Erwin y Peggy Bauer 30abd; Jane Burton 8abd; M.P.L. Fogden 17cab; Jeff Foott Productions 209ard; Andy Price 31abi; Dr. Frieder Sauer 27abi; Alan Stillwell 218ci; Jan Taylor 17cd; Kim Taylor 28cd, 146ard; Holt Studios International: Nigel Catlin 39abi, 78abd, 82ard, 102ab, 102cd, 211cd; Peter Wilson 41ard, 61abd, 157ard; Frank Lane Picture Agency: Dick Jones 216abd; E&D Hosking 218ard; Larry West 39cd, 134ard; George McGavin: 25abc, 32abc, 33c, 33arc, 33ari, 35c, 35i, 35ard, 39ab; The Natural History

Museum, Londres: 10cd, 19ab, 238cd; Natural History Photographic Agency: Anthony Bannister 7d, 77abd, 78cd, 88ard, 194abi; G.I. Bernard 99ard; N.A. Callow 94abd; N.R. Coulton 235ard; George Gainsborough 77cd; Martin Harvey 241abd; Daniel Heuclin 38c, 83abd; Melvin Gray 48abd, 50abd, 50ard, 156cd; Pierre Petit 241cd; Steve Robinson 34ab, 124cd; Natural Science Photos: M. Chinery 38abd, 79ci; PH&SL Ward 157abd; S. Bharaj 39ard, 82abd; Nature Photographers: N.A. Callow 81cd; Paul Sterry 14ard, 38abi, 46abi; Oxford Scientific Films: G. Bernard 102ard, 115abi, 223cd, 229abd; Clive Bromhall 222ard; Scott Camazine 30i; J.A.L. Cooke 13abd, 37abi, 207cd, 208ab, 209abd, 216ard, 226abd, 232ard; John Cooke 240cd; Michael Fogden 218abd; Peter O'Toole 183c; London Scientific Films 84ab, 224ard, 226ard, 227ard; Alistair MacEwan 234ard; Colin Milkins 242cd; James Robinson 154ard; Tim Shepherd 138abi; Donald Specker 79abd; Sinclair Stammers 47abd; TC Nature 59abi; Planet Earth Pictures: Robert Canis 232abd; Philip Chapman 215abd; Richard Coomber 17abd; Geoff du Feu 48abi; Brian Kenney 217cd, 231ab; Ken Lucas 220cd; Steve Hopkin 49abd, 138abd; Premaphotos Wildlife: Ken Preston Mafham 106abd, 194ard, 197abd, 198ci, 202abd, 221abd, 227cd, 243abd; Rod Preston Mafham 104abd, 233ard, 235abd; Jean Yves Rasplus: 19abi, 36cd, 100abd, 101cd, 194cd, 194ard, 197ard, 239abd; Science Photo Library: Eye of Science 84ar; Vaughan Fleming 99abd; Still Pictures: Holgersson-UNEP 17car; Studio Cactus: 35d.

Dibujos de Karen Hiscock, excepto: John Egan 210abi, 238ab.

Diseño de la cubierta de Nicola Powling.  
Dibujos de las guardas de David Ashby.

